

*image
not
available*



4670

Med. 514.

Medicina. Scripta varia
ad methodolog. & propædæut.
pertin. 60.

MEDICUS OFFICIOSUS
PRAXI RATIONALI ME-
THODICA APHORISTICA CUM
SELECTIS REMEDIORUM
FORMULIS INSTRUCTUS.

ET

Publica Disputatione propositus.

IN UNIVERSITATE OENI-
PONTANA.

P R Æ S I D E.

FERDINANDO CA-
ROLO WEINHART.

In Thierburg & Volantsegg Philo-
sophiæ ac Medicinæ Doctore, ejusque
Practiciæ & Aphorismorum Profes. Ordin.
DEFENDENTE.

ORNATISSIMO ET DOCTISSIMO,

DOMINO IOANNE FERDI-
NANDO RAMPICHLER,

Carintho Clagenfurtenfi A. A. L. L. &
Philosophiæ Magistro & Medicinæ studioso.

Anno 1703. Mense



O E N I P O N T I,

Typis Hæredum Jacobi Christophori Wagner,

EXCELLENTISSIMO

A C

ILLUSTRISSIMO,

DOMINO, DOMINO

**IOANNI FRI-
DERICO S. R. J.**


Comiti ab Urfinis & Rosenberg.

**Lib. BARONI in Lerchenau & Graf-
fenstain , Domino in Sonnegg, Stein,
Feursperg , Reutshach , Welzenegg ,
Greiffenburg , Rosseck & Rottenstain
&c. &c. Carinthiæ supremo Hæredi-
tario Præfecto , ejusdémque Archidu-
catùs Carinthiæ deputatorum Præsidi
ac Burggravio, Sacræ Cæsareæ Majesta-
tis actuali Consiliario intimo ac
Camerario &c. &c.**

Domino Domino suo Gratióssimo.



EX-




EXCELLENTISSIME

E T

ILLUSTRISIME.

DOMINE, DOMINE

C O M E S.

uod sol inter fide-
ra, cor inter Machinæ
corporeæ membra, au-
rum inter metalla, hoc inter
vegetabilia est *Rosa* herbarum
princeps ac Regina. Hæc non
tam ornat, quàm sanat. Non
enim gratissimâ solùm purpurâ
rubescit hortorum unicum de-
cus ac honor, verùm etiam
fra-

fragranti ac præstantissima virtute sua spiritus vitales recreat, sopitos excitat, deficientes restaurat, ac flammulam vitalem penè jam Ecclipsantem pristinae luci ac vigori restituit, ut adeo non mirum, quod in odorem suavitatis suæ me traxerit, ut primitias meas Medicas sub nullo alio, quàm *Rosa* Patrocinio defendendas susciperem. *Rosa* hæc illa est, quæ in gentilitio tuo campo vernat, Excellentissimè & Illustrissime Dom. Domine Comes, *Rosa* planè *centifolia*, quæ majorum tuorum constanti in Deum ac Cæsarem fide, ferventi Justitiæ zelo

lo ad DEI Gloriam. Populique
salutem , solertissimâ in regen-
do sapientia , invictâ in debel-
landis gloriôsè Ottomannis for-
titudine , ac patria ab hostium
insultibus vindicata , liberalita-
te in sustentatis tot egenis , in
fundatis stipendiis , erectis ædifi-
ciis Ecclesiasticis , ac præcipuè
Lauretano , aliisque centenis
Heroicarum virtutum præroga-
tivis decora , & *odora* est , nam
& Rosæ recisæ vel etiam decer-
ptæ redolent , unde non mirum,
quod Illustrissima tua pro sapia
primis semper honoribus &
muneribus in utraque Austria &
Carinthiæ Archiducatu , clavi-
bus etiam & velleribus aureis ab

Imperatoribus meritissimè exornata fuerit, siquidem Illustrissima hæc tua familia numerat, generis sui Heroes sago togæque celeberrimos, quorum consiliis, manúque, industria, solertia, scientia, sapientiâ nihil non magnum gestum. à *Rosis* jam mortis falce decerptis ad recenter fragrantem & florescentem devenio ad tenempe Excellentissime ac Illustrissime Domine Domine Comes, qui præclarissimis naturæ dotibus exornatus virtutum Omnigenarum gratissimum quaqueversum spargis odorem. Floret enim in te summa in Deum Religio, Pietas in DEI Matrem & Virginem
Co-

Comis in omnes æquitas, in subditos lenitas & amor, in facinorosos austeritas, in deliberando acies, in exequendo velocitas, in consulendo maturitas, in periculis vigilantia, in prosperis moderatio, in adversis constantia & tranquillitas, sed plura virtutum tuarum decora sub *Rosa*, quia *Rosea* vultus tui modestia ac verecundia id mihi prohibet, quod fama posthuma melius scribet, dicetque. Verum non tam flores quàm fanas *Rosa Rosenbergina*. Postquam enim patria post defunctum genitorem tuum languescere ac deliquium Pati cæpit, statim ad tuum in Regnum ingressum consiliis, opibus

ac Pientissimo animi affectu
provinciae tibi concreditae sub-
ditisque prospicere ac consulere
voluisti eo beneficandi studio &
alacritate, ut beneficia non da-
re, sed accipere videreris, ut non
tam Patronus, quam Patriae
pater nuncupareris. Hæc effe-
cit tua magnanimitas & libera-
litas, quæ sunt vera generosissi-
mi & Nobilissimi sanguinis tui
à majoribus transcripta linea-
menta non tam hæreditaria,
quam tibi propria & genuina.
Ne ergo mireris Patrone gratio-
sissime tuo Nomini ac auspiciis
has Theses à me consecratas esse
benignitas tua, quæ levissima
audiret, si non tuam, quæ

quæque obsequiorum genera
gratiosissimè dignaris , & cujus
etiam jam Frater meus prorsus
insignia accepit argumenta , au-
daciam meam obfirmavit adeo,
ut, ubi Theoricis laboribus nunc
per functus sum , ad praxim me
accingam non alio tamen in ter-
ris , quàm *Rosa* Patrocinio. Fa-
ciat Deus ter optimus maximus
etiam meis itentidem votis ex-
oratus , ut in annos plurimos
incolumitate potiaris optatissi-
ma , subditi autem tui ac clien-
tes , quos inter ego hodiè me
infimum ad omnes nuntus para-
tissimum sisto , quàm diutissi-
mè fruantur , ac tandem *Rosa*

)(5

hæc

hæc nunquam marcescat, sed
fero ad Elyfios hortos translata
sibi vireat, & floreat in perpetuas
æternitates.

Ita Precor


*Excellentissima ac Illustrissima
Dominationis vestra.*

Infimus

**JOANNES FERDINANDUS
RAMPICHLER,**

AP.

APPROBATIO THEOLOGICA

fficiosus hic Medicus tantæ est Excellentiæ , ut Methodò , & doctrinæ claritate publicam omnino lucem mereatur : præsertim cùm nihil orthodoxæ fidei , aut bonis moribus contrarium contineat , sed aphorismos & arcana medica debitum cum modestiâ ita proponat , ut, dum prodesse quærit corpori , animo nihil interim periculi, sed multum potius honestæ afferat delectationis tam eruditâ lectione hauriendæ ; præbendo simul doctissimo Domino Defendenti occasionem acceptam ab authore præclaram medicam doctrinam fortiter & gloriose propugnandi. Ita censeo

GEORGIUS TONAUER S. J.
SS. Theol. Doct. & Profect.
Ord. p. r. Decan.

Approbatio Medica.

VT sedulus virtutum secta-
tor, vitiorumque extirpa-
tor Medicus, in morborum
debellatione pariter ac sanitatis
conservatione, Officio suo ritè de-
fungatur, hunc sub Medici Offi-
ciosi titulo Tractatum accipiat du-
ctorem comitemque fidelissimum.
Venerabitur certe ejus Autorem,
Prænobilem & Magnificum Incl.
Facultatis Medicæ Seniore, ut-
pote plurimis, quibus charo Eru-
ditorum orbi innotuit, scriptis
clarissimum. Quæ uti multis jam-
dudum prælucent, ita præsentem
Tractatum veris innixum princi-
piis, scientiâ firmâ, fidâque rerum
experientiâ roboratum, judicio ex
in solido, accuratâ methodo, & gra-
ta concinnitate compositum, cen-
seo

seo dignissimum , qui non solum
doctissimo & ornatissimo Domino
Defendenti per publicum disputa-
tionis certamen laudi, sed & cun-
ctis per impressionis lucem saluti
cedat certissima,

THEOD. FRID. STATLENDER
Med. D. & Prof. Ord. ac
Phys. Oenip.



Præfatio.



Cravus propemodum effluxit annus, quo publicam in lucem edidi Enchiridion novum continens systema seu nucleum universæ Medicinæ practicæ, quod præter meritum apud Philiatros gratiam invenit, ut exemplaria ejus jam passim hinc inde distracta ad huc avidè à me expetantur. Cùm verò in prædictis Thesibus nonnulli desiderarent remediorum formulas, quo ad dosim expressas (quod à me tunc omissum, ne Enchyridion in librum excresceret, cùm artis Medicæ summa perfectio sit concinnata & debita formularum compositio, ac plurimum difficile sit, semper ex tempore Medicamentum gratum, ac debitè compositum & aptum præscribere præsertim Neo practicis & qui in praxi Medica non diu & multùm exercitati fuerunt, vel memoriam minùs firmam ac felicem obtinuerunt, ideo, ut & his satisfaciam, ac cunctis me officiosum exhibeam, præsentibus his Thesibus selectas remediorum formulas proponere volui non quidem dubias & incertas, sed diuturnâ experientiâ & longo usu veluti Canonizatas, quas tum propria viginti septem annorum tum peritissimorum Classicorû & in arte Medica consummatorum Authorum praxis suppeditavit. Inter vivos honoris ac filialis gratitudinis ergo nomino Colendissimum Dom. Parentem meum *Paulum* olim Serenissimi Archiducis Ferdinandi Caroli &c. &c. Archiatrum, nunc excelsorum,
Dica


Dicafteriorum Physicum , quem Deus post 80^o aetatis annum feliciter ac sanè modò consummatum ulteriùs sospitem & incolumem quàm diutissimè conservet , inter defunctos D. Patrum meum *Casparum Weinbart* olim Serenissimi Archiducis Sigismundi Francisci. &c. &c. Personæ Medicum : hinc pariter excellorum Dicafteriorum Physicum post 68. aetatis annum è vivis ereptum. Item Avum meum *Paulum* quoque nomine olim Marchionis Burgaviensis , hinc Serenissimæ Archiducissæ Claudiae , ac Serenissimorum Principum Ferdinandi Caroli, Sigismundi Francisci, Claræ Isabellæ & Leopoldinæ Protomedicum post. 75. aetatis annum piissimè in D. defunctum , tandem etiam avum meum Maternæ lineæ *Gerardum Schlairmacher* olim Serenissimi Archiducis Leopoldi ac Claudiae Aulae Medicum post 64. circiter aetatis annum è vita decedentem. Ne autem prædicta remedia Empyricè & promiscue in usum trahantur , addidi cautelas ac generalem & aphoristicam Methodum , quâ cuncta remediorum genera ex fonte chyrurgico, Pharmaceutico & diætetico derivata decenter , & juxta normam artis pro circumstantiarum varietate pro morborum depulsione usurpari possint. Non enim hîc exspectare oportet arcana & secreta (Nomina apud Medicos rationales , quibus apertæ & candidæ musarum Iannæ exosa & incognita) sed vulgaria , & in praxi trita , quæ tamen , si debitè ac Methodicè applicaveris , & morbum cognoveris , in quibus duobus verum Medicinæ arcanum continetur .
ab

abundè sufficient ad morbos quoscunque des-
pellendos. Præmisi tandem in Principio Genera-
lia quædam ad Medici Officium spectantia , quæ
passim in libris Medicis haud obvia , à me tamen
tum per experientiâ tum per frequentem lectio-
nem in proprium usum conscripta & annotata ,
quæque singulariter virtutem , scientiam & pru-
dentiam Medici , in quibus perfectio artis confi-
sit, respiciunt, ut ad illam pro viribus aspirarem,
ac in statu meo me perficerem, cum autem ab ea-
dem quàm longissimè me adhuc abesse ingenuè
fateri necesse habeam , aliis interim conatum
hunc meum communicare volui , ut saltem.

*Fungar vice cotis. acutum ,
Reddere quæ ferrum solet excors ipsa
secandi.*

Cedat qualiscunque hæc mea industria ad DEI
solius Gloriam , Medicæ Iuventutis utilitatem,
ac Proximi ægrotantis unicam salutem.





C A P U T . I.

D E

Officio Medici in genere,

S . I.

De Religione & Virtutibus Medici

I.



Um teste *Ecclesiast. c. 38. à Deo omnis medela*, & Medicus quidem agrum curet, sed Deus sanat: sit etiam Medicina peculiare Paracleti donum teste Divo Paulo ad *Corinth. c. 12. alij quidem per spiritum datur sermo sapientia: alij autem sermo scientia secundum eundem spiritum: aliter fides in eodem spiritu: alij gratia sanitarum in eodem spiritu &c.* Medicus in primis divini Numinis cultor sit per veram & orthodoxam Religionem catholicam.

I I.

U Nica eius cynosura sit gloria Dei, ac salus proximi, lemma & suprema lex sit; Deum tolerare, neminem ledere ac omnibus velle prodesse. Provinciam suam Medicus à divina providentia per legitimam vocationem humeris suis impositam attentâ sollicitudine, ac sollicitâ attentione administret, ac divinum spectando obsequium salutis

A

lutis

lutis ac perfectionis suæ centrum in officii ac muneris sui partibus ad divinæ voluntatis amissim purâ intentione peractis collocet, cogitans se redditurum aliquando deluper severissimam rationem in magno totius orbis conventu ac sabbatho sempiterno.

III.

Veneretur, ac imitetur Medicus pro Viribus S. S. Cælitates Medicos, & quidem mense Januario die XXXI. S. *Cyrum Alexandrinum*. Februatio die XXV. S. *Cæsareum* B. Gregorij Nazianzeni fratrem. XXVIII. S. *Dyonisium Diaconum*. Martio die X. S. *Codratum Corinthium*. XV. S. *Ioachimium Iapponensem*. Aprili die XIII. S. *Papilum Diaconum*. Maio die III. S. *Iuſenalem*. VI. S. *Ioannem Damascenum*. Junio II. S. *Alexandrum Martyrem*. XIX. S. *Vrſcinum*. XXVI. S. *Samsonem Presbyterum*. Julio XV. S. *Antiochum*. XVII. S. *Pantaleonem*. Augusto die XVI. S. *Diomedem*. XX. S. S. *Leontium & Carpophorum*. XXII. S. *Philippum Benitium Florentinum*. XXV. S. *Genadium*. Septembri die XXVI. SS. *Cosmam & Damianum*. Octobri die XVIII. S. *Lucam Evangelistam*. XXX. S. *Zenobium*. Novembri die II. S. *Theodotum*. IX. S. *Orestem*. Decembri die VI. S. *Æmilianum &c.*

IV.

Loquendo de virtutibus cardinalibus ac imprimis de *temperantia*, Medicus sit *castus* præsertim gynæcæi, sequiorisque sexûs curam gerens, hinc apud Lacedæmonios Æsculapij simulachrum ex agno casto fuit. 1. Sit *sobrius*, ut ad invisendos ægros, eisque opem ferendam quacunque diei ac noctis horâ promptus, paratus, ac sui juris sit. 3. *Taciturnus*, nè vel occulta artis mysteria vel secretiora ægrorum mala aut alia extra limen minimè evulganda plenis buccis ubique effutiat, hinc Medicina *muta* dicitur, ac Ægyptij in *Isidis & Serapidis* templis præsidum Deorum Medicinæ apud ipsos *Harpocratem*

Pocratem silentij Deum labia digito comprimentem adorant. 4. Sit *modestus* ac moribus honestis elegans; cui pietas curæ, dilectio cordi, compassionis sensus carus, ac præcipuè *Mansuetudo* familiaris, ac humanus affectus suavis sit; hinc in Delo simulachro Apollinis charites additæ sunt citharam, tibus & fistulam manibus tenentes, non tantum ad Musices & carminis inventionem denotandam, verum etiam, quod deceat, Medicum esse humanum, gratiosum & affabilem.

V.

Loquendo de *fortitudine* Medicus. 1. Sit *fortis* ac intrepidus ad labores quoscunque tolerandos utpote ægrotantium salutis totus mancipatus. 2. Sit *fortis* ad momorum calumnias, ad artis olorum & contemptorum scommata, sarcasmos, ac commentitias cavillationes, aliæque Medicum ferientia ab infirmis, adstantibus aut alijs subinde Prolata æquo animo ferenda: gnarus celare cordis æstus, invitumque multa dissimulare. 3. *Fortis* & cordatus in debellandis morbis, ut non agat vel nimis tumide, vel nimis timide, ut nec temere audeat, nec inconsulte timeat: ut ingruentes difficultates ac periculorum & impedimentorum Iliadem generose vincat. 4. *Fortis* tandem, ut sit communis Utilitatis amator, privata oblitus, Patientes vel sæpius impatientes visitando patiens, adversus mollia durus, in arduis fidens, in gerendis magnanimus, in gestis modestus, in adversis constans, in secundis temperatus, ac in omnibus invictus.

VI.

Loquendo de *iustitia*, Medicus, quoque æquitatis fidissimus sit custos suum cuique tribuens, sitque. 1. Erga omnes comis, cunctis officiosus, nulli onerosus, affinis facilis, socijs amabilis, reliquis urbanus, languentibus placidus, ad similes familiaris. 2. Sit devotus ad Deum, benignus in proximum, liberalis in


egenos, promptus ad concordiam, sobrius ad mundum.
3. Sit Domini servus, proximi socius, ac mundi Dominus superiora habens ad gaudium, æqualia ad contortium, inferiora ad servitium. 4. Laudet bonos, malos toleret, minori indulgeat, majori cedat, studeat omnibus prodesse: nocere nulli.

VII.

Loquendo tandem de *prudencia Galen. l. 8. meth. med. c. 9.* Medicum naturâ prudentem desiderat. Cum autem à peritissimis sophiæ cultoribus duplex statuatur prudentia, quarum una ad vitam juxta virtutum ac rationis normam legitimè instituendam: altera verò ad artis præcepta prudenter, ac debito modo, loci, temporis ac Personarum circumstantijs, singulisque eventibus ritè accommodanda habilem ac idoneum reddit, utraque planè in medico Practico quàm maximè expetitur: prima, quia Virtutum ceterarum dux, princeps, moderatrix ac architecta & quia quasi complexus omnis perfectionis ac compendium omnis felicitatis: altera, quia hâc duce & lucè utendum in difficili planè Microcosmî imperio, ne ceteroquin per vias tot occasionum variarum præcipitiis infestas, tot difficultatum sentibus obductas, tot arduarum quæstionum gurgitibus intercisas, tot millenarum circumstantiarum labyrinthis implicatas frequentius laborare, hærete, cespitare ac labi necesse habeat Medicus, unde haud immeritò apud Syros mos obtinuit, ut Apollo pingeretur barbatus ad innuendam nempe prudentiam, quæ in Medico requiritur, ac ætatis decursu inprimis possideretur, in quem finem etiam veneranda antiquitas simulachro Apollinis serpentem addidit pro symbolo nimiram prudentiæ.

VIII.

Præter vitia Virtutibus supradictis opposita Medicus inprimis vitare studeat *invidiam* cavendo, ne alterius ingenium, doctrinam, eruditionem, praxim uberioriorem,



riorem, feliciores inibi successus, frequentius auditorium, favorem civium, superiorum gratiam, fiduciam ægrotum, honores ac existimationem canino dente rodant: de libris ac thesibus sinistrè ac frivole iudicet, collegæ sui votum præ livore sugillet, remedii formulam prudenter & ex lege artis præscriptam calumniosè improbet: cum morbum non intellexisse: in causa hallucinatum, nec legitimâ usum fuisse curandi methodo ægris & adstantibus clanculariè & nefandè instillet: sicque famam, eius virulentâ detractione laceret. Item ne arcana sua earumque singularem chyrotechniam invidiosè celet.

IX.

Vltet insuper *Avaritiam* cavendo, ne non tam Medæ, id est, artis medicæ gratiâ, quàm propter vellus aureum vela faciat, ne Vulturis instar lucris ac rapinæ inhiantis ægros continuis suis peritionibus, exactionibus & pactis ab insigni vel sorditie, vel plutophilia profectis fatiget ac exhauriat: ne lucri cupidine in extremam turpitudinem adactus largiora præmia ac stipendia sperans morbos ægrotantium protrahat, vel morbum levem ita periculosum exaggeret, extendat ac amplificet, ut sub facie auxiliandi, praxim depilandi, loculosque emungendi exerceat: ne experiëntiolas aliquas nullis forsan rationibus innixas, vel secreta operativa & imaginaria empyrico supercilio ac hyperbolico preconio decantans per quàm studiosè velet, celet ac custodiat, ut ægri etiam dato copioso auro ab eo talia remedia velut ex captivitate redimere necesse habeant: ne cum Pharmacopæis concors partiatur lucrum levissimo in morbo pretiosissima præscribens medicamenta: ne tandem auri fulgore excæcatus eo protervitat, perulantiæ ac perversitatis perveniat, ut Venena propinet, abortum procuret, sterilitatem inducat, falsimonium fide jurata probet, aliaque christiano Medico indigna & scelestâ committat.

X.

TAndem detestetur Medicus *superbiam* cavendo, ne eo deveniat arrogantia, ut alios suos collegas tanquam volitantes umbras ex alto despiciat, ac se solum ceterorum exemplum, artis Hippocraticæ cannonem & archetypum vanâ ostentatione arbitretur, ne aliorum curationes vel consultationes reprehendendo, gloriam acrix & altercationibus unicam sibi laudem ac pompam comparare studeat: ne remedia levis licet pretii, nec adeo difficilis compositionis pro secretis singulari studio, diuturnis laboribus, vigiliis ac sudoribus, maximisque sumptibus comparatis jactet, vendat, sicque popularem plausum ac fumum capret: ne flatulento superbie halitu distentus omnia celet, & non nisi arcana arcanissima crepet, ne plurimarum felicissimarum & inauditarum curationum à se factarum proprius ac vanus sit buccinator: ne tandem se uberioribus naturæ animi, fortunæque muneribus præcellere, veram Pallidis artem agere, neque censore, neque alterius ope indigere falsò sibi persuadeat: sicq; nimium sibi fidens etiam in gravioribus periculis alios sibi adiungi non modo non postulet, verum etiam oblatos repudiet.

S. II.

De scientijs ac Disciplinis Medico necessarijs.

I.

Lingua *Latina*, quæ fidissima scientiarum interpres, basis ac radix, Medicus nec sine magna turpitudine, nec sine artis dispendio carere potest, cui, si comitem addiderit *græcam* ut saluberrimas doctrinæ Medicæ undas ex *Hippoc. Galen. Ætio, Paulo, Alexandro, Ægineta, Oribasio, Dioscoride &c.* aliisque velut ex originariis fontibus haurire, gustare, ac vim vocis, dictionis nucleum, latentemque energiam melius percipere

cupere valeat, imitabitur ingeniosissimum illum virum;
qui Romam & Græciam diffidentes; manus tamen invicem jungentes pinxit addito lemmate, *conspirant amici*.

II.

AD *Poësim* non quidem lascivam illam turpium morum Illicem, quæ venenum melle conditum lectitantibus nefandè instillat, sed castam & eruditam Medico subinde divertere licebit horis præcipuè succisivis, eamque non quidem ut civem, sed peregrinam tractare tum ut animi laxandi causâ delectabile eius Viretum peragrando moralium flores & fructus carpat: tum, ut apud ægros atque etiam in Regum, principum, Magistrumque symposiis, ac sapientiorum quorumque congressu: quin & in deserto sacrorum, moralium, protanorumque & philosophantium sermone, sententias eius magna cum laude, ac præsigni & efficaci ad bonam frugem exhortatione vel honesta delectatione proferre possit: tum ut eloquentiam suam, quæ *Marco Tullio* teste absque Poësi sicca & imperfecta est, uberrimis Poëtarum fontibus irrigare, sermonemque suum sententiis verbisque Poëticis non quidem affatim & ad nauseam, sed cœdimenti loco tantum apposis ac in tempore prolatis quasi luminibus ac stellulis illustrare possit.

III.

Eloquentia eruditione munita non tam decora & elegans est in Medico, quam etiam suo modo necessaria tum in Cathedris ad artis decorem ostentandum: ad opes eius amplissimas in mediam lucem proferendas, & salutem ac sanitatem ægrotantium promovendam: tum in consultationibus publicis ineundis ad mentis concepta ornatè proferenda, ad sententiam suam argumentis acerrimis & exquisitis rationibus stabilendam, ac adversarios erroneâ ac falsa hypothese innixos de Ponte deliciendos, tum ad ægros Medicis haud in paucis contradicentes persuadendos: ad *Pœnitentiam* contuma-

ces proposito dextrâ cum facundiâ prognostico de morbi periculo ad eam disponendos, ad ægros mæstos consolandos, timentes erigendos, diffidentes excitandos, Iratos placandos, furentesque coercendos.

I V.

Philosophia Medicinæ soror germana & uterina est, faciem ei præferens. Sine hac Medicina est potius cadaver quoddam ex angue, quàm corpus vivens, est ramus divulsus ab arbore, hinc medicina rationalis dicitur a ratione nempe & dialectica, ac medici Physici ob Philosophiam denominantur, tùm Medicinæ principia sint intimiora Philosophiæ arcana, eaque aliud non sit, quàm particularis quædam Philosophia ac specialis & experimentalis Physica causas & affectiones corporum naturalium in specie exponens, easque ratione & experientiâ examinans. Sine Philosophia enervis est omnis doctrina Medica, omnis disquisitio à veritate recedit, oriuntur monstrosa opinionum portentia, novitarum quisquiliæ & palæ, ac sententiæ vigilantium somniis haud absimiles, i descriptiones sunt mutilæ & truncatæ aut omnino nullæ, axiomata vix probabilia, propositiones obscuræ, probationes difficiles vel erroneæ, ordo confusus, ac methodus curativa innumeris penè errorum laqueis irretita. Cùm enim curatio fundetur vel in *indicatione*, quæ aliud non est, quàm syllogismus seu unius ex altero per rationem illatio, vel in *experientia* aut *analogismo*, quorum primum suppeditat modum argumentandi ab inductione: alterum ab exemplo, clarè elucescit, quòd ille meliùs noverit curare, qui meliùs noverit Philosophari, hinc necessariò oportet esse, ut Medicus sit vel Philosophus vel stultus, cùm tertium, si detur, crassi bubulci vel asini genus sit.

V.

Astralogiam etiam Medico convenire, nullus est, qui ambigit, nisi cui auriculas ignorantia & pertinacia

tom-

commodavit cornua, nemo enim inficiari potest jucundum illud & fecundum cælicum inferioribus conivgium ac commercium, virésque ac influxus luminarium in Vegetabilia, mineralia: immò & ipsum hominem, quod testantur melancholici, maniaci, Epileptici, alięque circa constellationes graviotes luminarium & lunę imprimis, quę non immeritò astrorum omnium speculum & infundibulum appellatur, peiùs habentes. Videmus etiam paulò plenius radiante Dianã humidiorum morborum sævitiem exasperari, ac inpeiùs ruerē paralyfes, apoplexias, lethargos, hydropes & sex centā alia symptomata. Idem testantur epimenia ad eadē lunę Phases recurrentia, dies Critici, Vulnēra luminariis conjunctis vel oppositis inflicta difficilius tardiusque coalescentia, pericula ex V.S. in violentis aspectibus celebrata, Dysenterię, febres malignę, pestilentiales, aliąque mala epidēmica, quorum ex astris origines non maximus tantum Hippocrates, sed & complures alii tradidere: immò etiam ex astrorum securutis aspectibus pręvisos prodiderunt.

VI.

Botannices & Anatomia maximè peritus sit medicus: illius non tam ad decorem, ut remediorum suorum actualem habeat notitiā, quā ad necessitatem provīsandis Pharmacopoliis: huius, cū sit oculus Medicinę in cimeriis difficultatum prælucens tenebris, sit lumen, quo homo in homine quæritur & invenitur: sit fenestra illa, quam Momus in humano corpore desiderabat, ut abditi morborum, causarum, partiūque affectarum recessus patefierent: sit prima ac firmissima basis, super quam erigitur medendi methodus. Medicus sine Anatomia est cæcutiens, qui viam baculo examinans huc atque illuc miserabiliter cęspitat.

VII.

Chymia Medico uon minùs necessaria: non quidem illa

A 5

illa, quæ pro lapide omnia dilapidat, & ut aurum coquat, omnia decoquit, sed illa, quæ utpote fidissima rationalis Medicinæ ministra & socia tum ad utilitatem, tum ad splendorem ac amplitudinem Reipublicæ Medicæ multum confert, parando ac suppeditando lectissima omnis generis medicamenta sapore etiam, dosi exiguitate ac vi energetica commendatissima, quibus immanes morborum hydræ potentissimè expugnantur, quorum contumacia Galenicorum auxiliorum vim haud raro satis superbè eludit, hinc plures cum *Matthiol.* in epistola quadam audent dicere, neminem Medicum absolutum esse: immò nec mediocre quidem, qui in hac nobilissima scientia non sit exercitatus.

VIII.

Medico honorificum est, si partem Medicinæ *Chironianam* ita mente calleat, ut urgente necessitate etiam Ministrum & operatorem agere queat. Sicuti enim boni Imperatoris est, militis Gregarii partes sustinere, si necessitas instet, ita dedecori non erit Medico, si pro re nata, pro rei gravitate ac data occasione ministrum agat, cum submissio hæc & humilitas pro salute ægri in necessitatis angustiis constituti suscepta existimationis jacturam minimè inferat. Si verò adsint Ministri & artis peritiâ & manûs dexteritate insignes, præsidem agat Medicus, atque inter eos splendeat, ut dux inter milites, operationes eorum dirigendo, tradendo præcepta, rescindendo errores, ac cavendo, ne solennis hæc medicinæ pars abeat in carnificinam.

IX.

Medicum *Pharmacopæum* agere ac parare clysmata, facere potiones & quævis migmata, vel etiam caplasmata, unguenta aliâque levissima ægris porrigere, philatgyriam, lucrûmque sapit, ac medici famæ maculam haud levem inurit, cum sublimius atque excellentius medicorum munus sit, quàm ut ad manuales has ope-

operationes, vilésque mercaturas sese demittat, præsertim si adsint artis Pharmaceuticæ periti, qui Pharmaca decenter ac ritè paraverint ac dispensaverint, interim unum vel alterum sibi peculiare ac reservatum remedium, cujus usum & enchiresim illi solus novit, dispensare haud indecens erit præsertim si non lucrum, sed honorem, artis laudem & amicorum gratiam ancupari, eorúmque sanitati prospicere intendat. &

X.

Fallacissima est *praxis*, quæ valida non est theoriæ basi munita, nam solida priùs, exquisita & firmissima principia jacienda, antequam ad practicæ perfectionis culmen assurgatur, crassis semper ignorantia tenebris sepultus jacebit Theoreticorum face destitutus, exercitandus priùs Medicinæ Tyro in Theoriæ Palæstra, antequam Athleta Medicus in praxeos descendat arenam nec audeat ægritudinis monstrum aggredi ac devorare, nisi priùs dente meditationis seu studio Theoriæ detriverit principia, ac mentis in ore voluerit generalia Medicinæ dogmata. Utilius est priùs cum mortuis, hinc cum vivis tempus terere, præsertim etiam, cum singula ferè præcepta & recondita, quæ in praxi observantur, affluentius in Practicæ Medicinæ libris ac scriptis elutescant, quare animus priùs Theoriâ probè imbuendus, investiganda humani corporis elementa, principia, humores, temperamenta aliæque ejus proprietates & affectiones, perpendenda insignis affectuum varietas, numerusque penè infinitus, considerandus ægritudinum mos, motus, magnitudo atque eventus: ruminandæ causæ sæpiùs abditæ ac pervestigatu difficillimæ, utendum signis diagnosticis, ac generali medendi Methodo, quæ omnia non sicco pede & per transennam peragenda, sed pluribus annis solida & eximia horum aquirenda eruditio. Nam teste Hippoc. *Vita brevis, ars longa.*

XI.

Theoriâ propè instructus Medicus noverit, non satis esse confusam animo tenere medendi effigiem & generales de arte medica contemplationes & notiones habuisse, sed ad tecmarum & Particularia descendendum esse, cum non homini sed Calliæ vel Socrati Medicina fieri debeat: noverit etiam praxim à Theoria distare, quantum æra lupinis: in Practica occurrere sæpius aliquid, quod nec dici, nec scribi potest; omnes etiam penè morbos curari in Cathedra & libris: non omnes verò in lectis, in quibus ægri sæpius moriuntur. Experientiam igitur, quæ est anima & mater Medicinæ: iudex etiam & lapis lydius, ad cuius obrusam pleraque examinanda, sibi compareret Medicus ægrotantium lectulos indefessâ diligentia frequentando, juvenia & lædencia exactè considerando, cum Medicis practiceis & præcipuè senioribus conversando & consultando, Pharmacopolia adeundo, libros practicos ac præcipuè eorum observationes perlustrando.

I. III.

De Officio Medici in ægris assumendis & visitandis.

I.

Non decet medicum haud rogatum sua offerre officia, nam teste *Hippoc.* promptitudo & facilitas medendi effusè oblata ab ægris contemnitur, atque turpe est, imperium & potestatem in corpus ab ipsis ægris emendicare. Accedit contemptui non tam minor confidentia, quæ tamen haud modica est bonæ curationis circumstantia, quàm suspicio haud exigua vel quæsitæ lucri vel jactantiæ & nimis ambitionis. Præstat igitur in suæ dignitatis cultum, in debitam sui artisq;

me-

medicæ venerationem atque decorem propriâ virtute
meritisque inclarescere medicum, & vocatum assistere
ægotanti, quàm se ipsum obtrudere, ac mulierculas,
Pharmacopæos, chyrurgos, consanguineos, amicos,
aliósque ægrorum assistentes ad id conductos habere, ut
operam alicujus veluti buccinis undiqne deprædicent,
ac patientes per fas & nefas procurent.

II.

Sicuti *Rudolphus* Primus Imperator asseruit, melius
esse benè imperare, quàm Imperium ampliare, ita
melius est pauciores infirmos suo Regimini commis-
sos magna cum animi applicatione, diligentia, studio,
artisque Præceptis regere, quàm plurimis uno eodémq;
tempore non posse satisfacere: cum enim docente *Celso*
optimus ac maximè idoneus sit artifex, qui non diu ab
ægro recesserit, & qui ad omnes circumstantias sedulo
attenderit, cò que ritè percontatus fuerit, impossibile
erit, tot ægris decenter invigilare posse, & ferè non
obvium accommodare medicamentum sine ulla per-
contatione, cognitione causæ & cum discrimine.

III.

Æ Gros deploratos, & conclamatos solo prognostico
telinquendos, eorùmque curam minimè suscipien-
dam esse *Hippoc.* jubet l. de art, dum ait. *Medicina est*
vehementes morborum impetus retundere & eorum, qui
morbis victi sunt, curationem non aggredi, ne teste *Ga-*
len. fidiſſimo Hippocratis interprete infamientur apud
vulgus remedia, quæ multis fuisse salutis, quod tamen
intelligendum esse judico de illis tantùm morbis despe-
ratis & conclamatis, qui per se & revera tales sunt
nulla arte aut ope curabiles, vel ipsâ naturâ immedica-
biles ut v. g. cæcitas & surditas congenita, hæctica ma-
rasmodus, sphacelus, Phrysis consummata &c. non de his
qui plerumque saltem interimunt, & ex quibus aliquos
saltem

saltem ægros convaluisse observatum est, horum enim curatio generoso animo tentanda præmissio tamen in spe difficili prudenti prælagio, vel prædicto mortis periculo, cum melius sit anceps experiri remedium, quam nullum, ac Celso teste temeritas subinde restituit, quos ratio non sanat, & sicuti in bello sæpè longè violentius ex necessitate quàm virtute pugnatur, ita satius est aliquid cum periculo facere, quam spe adempta certo perire, præsertim cum etiam monstra in arte subinde contingant, & monente *Philone* auxilium divinum maxime plerumque adsit, cum deficit humanum.

IV.

IN medicam Potestatem haud recipiendos esse, qui confessionem Sacramentalem renuunt, jubet supremum Ecclesiæ caput *Innocent. III. in concil. Lateranensi. tit. 37. c. 15.* quod jussum repetit *Pius V. in sua bulla 8. Mart. 1566. in lucem edita.* cum *Medici*, inquit *ad infirmos in lecto iacentes vocati sunt, ipsos ante omnia moneant, ut confessori omnia Peccata sua iuxta ritum S. R. E. confiteantur, nec tertio die ulterius eos visitent nisi longius tempus confessor ob aliam causam infirmo concesserit.* quod eò intelligendum, ut Medicus teneatur ægrotantem periculi, vel per se vel per alium, prout necesse videbitur, admonere, cumque ad exomologesim sacrumque Viaticum suscipiendum adhortari minis etiam erga recusantem, quod deferere cum velit, adhibitis, cum autem nihilominus renuentem omnino non invisere, sed ex toto deferere non suadent *Sanchez. Villalob. Barbof. Sylvest. Dian.* aliique ab eodem citati, cum Medicus divinæ Pietatis æmulus, tentatis omnibus, quæ ipsi præcepta sunt, & quantum ex se est, pietatis opus ulterius prosequi, adhibitisque Præsidij, ut forsan æger adhuc respiscat, vitam prolongare possit, præsertim etiam, si metuendum, ægrum à Medico ex toto dēre.

derelictum magis obstinatum fore, & obsequia, quæ jam fottè parabat, omnino negaturum esse.

V.

Medicum paulò graviùs periclitantem seipsum curare minùs tutum est ob judicium in re propria densâ Philantiæ & affectuum inordinatorum nubem magis obte-
nebratum: infirmis etiam frequentius sensualitati magis, quàm rationi obedientibus, hinc præstat vel alios simul in consilium adhibere, qui citra animi perturbationem de morbo judicent, & absque pavore remedia suggerant, vel si medicus ægrotans adeo sit debilis; ut mens etiam langueat, ijs omnem medendi provinciam concedere.

VI.

Medicum non teneri cum extremo vitæ peticulo peste correptis succurrere, nisi pacto se obligaverit, vel salario ad id conductus fuerit, in confesso est. Hostes & inimicos suos in curam medicam assumendos esse nonnulli dubitant, ne, si quid humanitùs accideret, eosque mori contingeret, suspicionem incurreret. Verùm si-
cuti Medicina etiam inimicis opem non denegat, sed odium benevolentiam, damnum beneficentiam, ac pessima quæque humanitate vincendo medelam adhibere non recusat, ita majori hoc in passu utendum cautela, ut etiam, si fieri possit, alter adsit Medicus vel alius doctus Virorum rationes curationis intelligens, receptis quoque iu Pharmacopolio sedulò asservatis utpote incorruptis candoris & sedulitatis testibus.

VII.

Nonnulli Medicis inobedientes, Gulosos, qui Medicum & Medicinam infamant: ut etiam ingratos, qui jam olim vitæ discrimine erepti detestandâ ingratitude beneficentiam Medici contempserunt, eumque decaud

deuò ad opem ferendam impudenter accersunt, operâ Medicâ haud dignos censent, verum intemperantes ac inbdientes, qui vivunt, prout volunt, debent curari prout possunt; nequiquam vero omnino derelinquendi, quòd enim teste *Galen.* intemperantiæ dediti nullis possint iuari præsijs, potiùs de cura prophylactica quàm actuali morborum curatione intelligendum: præsertim etiam, cum alijs remedijs & nova temperantia, quam infirmitate oppressi sæpiùs sectantur, iuari possint. Ingratos quoque haud omnino negligere oportet, ne avaritiæ aut crudelitatis accusent Medicum, cuius supremadebet esse cura, ut nihil committat, quod vel Christianæ charitatis jura frangere, vel nobilem & præclaram facultatem turpi pecuniæ exactione sædare possit.

VIII.

Cum salus ægri suprema Medico lex sit, eaque non minimùm dependeat à legitima Medici visitatione, quæ est veluti anima felici curationis, hinc plurimùm interest, ut à Medico decenter instituat, multum enim præstat ad morbi cognitionem: plus ad ejus curationem: plurimùm ad errorum plurimorum, qui ab ægris & assidentibus in absentia Medici committuntur, evitationem, sic etiam quod vox viva Præceptoris: quod præsens Magistri auctoritas apud discipulos, hoc Medici præsentia apud ægros, ac tantum hoc ævo valet remedium: quantum de Medico sperat æger, quantumque in eo est opinionis & authoritatis, hinc promptum semper habens iuandi animum rogatus omnibus domi sit oportet, neque tristem à se quemque patiat abire, laturus omnibus visitando auxilium, vel quantum in se est, non denegaturus.

IX.

Medicus ægrotum accedat opportunè, semperque illorum, qui periculosius decumbunt, prius: reliquorum

quorum verò posterius curam gerat. Matutinum inprimis tempus eligat visitationi aptissimum, sæpius etiam vespertinum huic labori impendat, interdum bis de die, si morbus præsertim acutus urgeat: subinde ter vel quater, si morbus acutissimus & præsertim rogatus, in levioribus & Chronicis quotidie semel vel alternis diebus: immo quandoque post 3. 4. vel plures dies demum, prout opus esse videbitur, ita tamen, ut semper, quid ad reditum usque suum faciendum sit, reliquerit. Optime faciet, si accessum moderatus fuerit juxta morbi conditionem, agrotantisque affectionem. Sunt enim ægrorum aliqui, qui crebro se invisi maximopere lætantur, & Medici non aliter quam Angeli cuiusdam aut Numinis cælitus delapsi adventum expectant, alii contra à sæpius invisentibus afficiuntur molestia, Medicumque querendi lucri: se ipsos verò detestandæ arguunt avaritiæ.

X.

AD ægrum placide ingressus lætabundus cum saluter Medicus, ac monente *Hippoc.* meminerit auctoritatis & sessionis, anima enim teste Philosopho 7. *Physi.* 2. sedendo sapientior fit, & prudentior, ac Intellectus assimilatur quieti & statui magis, quam motui, unde olim quoque sedere tenebantur consultantes & iudicantes. Sedeat ex adverso vultus ægrotantis, ut ex eodem velut ex speculo mala tum præsentia tum futura intueri valeat, & quidem paulò remotius præsertim in ægritudine maligna, vel quod tutius ex latere, ne miasmate venenato cum halitu ab ægrotantis corpore emissio inficiatur & ipse Medicus, quo in casu etiam ad ingressum suffitum parari, fenestras aliquatenus aperiri ad spatium aliquod jubebit, seque tum odoris, tum in ore decenta myrrha vel masticata rad. Zeduar. Angel. Cort. cit. rotul. aut morsell. aliisque alexi pharmacis, & breviori præcipue visitatione ab imminente contagio immunem reddet.

XI.

SEdens pacatè ac modestè hilari facie ad ægrum conversus, gravitatèque comitati & humanitati conjuncta cognita, visùque necessaria inspiciat, ea quoque, de quibus fas & opus est, interroget, ægrumque vel adstantes morbi Historiam referentes patienter, ac attentè audiat, sermocinetur de rebus Medico non naturalibus dictis de cibo & Potu, eorumque vario præparandi & administrandi modo & usu, de ægro ad confidentiam & obedientiam disponendo, de remedijs debito tempore & modo exhibendis, de alijs etiam rebus indifferentibus ac opportunis juxta ægotantium conditionem, capacitatem & genium, quibus Medicus Prothei instar se conformet, omnesque lucretur, modo à civilitatis ac modestæ gravitatis limitibus non scedat.

XII.

AB initio Visitationis præsertim de morbi essentia, causis vel exitu oraculorum more dubius respondeat, neque ordinatorum semper rationem reddat præcipuè coram vulgo & ignaris, aut ægris quibusdam hæsitantibus & omnia secura metuentibus, ne majorem hæsitandi occasionem nanciscantur; benè tamen coram peritis & scientificis agendorum, morbi que causæ sæpius manifestandæ, ut præceptis medicis magis obtemperent, & non respondeant, quod Aristotiles Medico suo multa vetanti & non pauca citra morbi causam edicenti scitè respondisse fertur, *ne me cures, ut bubulum vel fessorem, sed prius causam edisere, atque ita præceptis tuis me facile morigerum reddideris.*

XIII.

ÆGris non nimium familiaris sit Medicus, ne ipsum, ejusque remedia parvi pendant, & contemnant nec ministros sibi faciat socios, nisi debitam in se venerationem

tionem posthabeant : non tamen inimicos sed benevolos potius, eorumque acta collaudando ac celebrando sibi devinctos reddat. Procuret etiam, quantum ex se est, ut ægrotis adstantes & assidentes munere suo rite fungantur, ut sint infirmis grati, gnari morum & consuetudinis & naturæ ægrotorum, sint mundi, gratiosi, urbani, seduli, fideles, patientes, Dociles ac Medico obtemperantes, cavendo etiam, ne ægris, vel iram concitent, vel tristitiam ex intempestivis nuncijs vel aliam offensam causentur.

XIV.

Visitando Medicus diutius ægris, quam par est, non adstet vel saltem raro & quidem non nisi familiaribus; mulieres etiam non nisi cum aliorum adstantium præsentia & brevi intervallo visiter, illisque quasi transeunter accessionem quoddammodo fugitivam exhibeat : neque tamen etiam, nisi coactus nimium properet in omnes circumstantias diligenter inquirens, & imprimis, quomodo tulerint medicamenta, attentè notans, cum ex juvantibus & lædentibus tutissima sumantur morborum remedia, hinc maxime hallucinantur, qui statim ac ægros intuiti sunt, pulsūque tetigerunt, rigoroso, ut decet, morbi, causarumque exagitatione neglecto inconsulto statim medicamenta dictant & Andebatarum more agenda præcipitant.

XV.

Medicus ægrotos visitans honestè & decorè vestitus sit, sicuti enim sumptuosus valdè vestitus arrogantiam sapit, ac lividi dentis commata vix evitat, ut taliter vestitus vel luxuperdita, levia, otiosa ac prodiga audiant ingenia, vel incurrant suspensionem ampullosi circulatoris & agyttæ, ita sordidus aut nimium vilis vestitus vel quæstum exilem vel egestatem vel avaritiam denotat. Videat igitur, ut vestitus gravis sit, honestè

elegans, mundus, non lacerus aut labe vel spurcitie inquinatus, ut omnia ad optimam existimationem, prudentiam ac animi moderationem sint composita. Ad cultum & mundiciem corporis quoque spectat, ut medicus manus quam maximè purissimas habeat, facièmque mundam, & pilos in barba & capite decenter compositos cavendo quoque, ne retro odore ex quacunque parte corporis emisso vel ex sorditie oriundo ægrotantibus molestiam: vel econtra etiam odoribus molcharis vel ambratis fæminis hystericos excitet Paroxysmos,

XVI.

TAndem Medicus visitans artem medicam adversus ejus osiores & contemptores acriter tueatur, eam malè tractantes semel bisve tacitè correptos & non emendatos palam arguat: ægros inobedientes blande primùm, hinc severè corripiat, vel omninò deferere comminetur, præsertim verò apud potentiores sciat vi virtutis patientiæ & mansuetudinis Medico quam maximè necessariæ multa connivere ferre, dissimulare ac calumnias, aliâq; innocenter, ac injustè sæpiùs illata vitæ sinceritate & oppositis actionibus aut amicorum, vel proborum aut eruditorum potentùmve laudè abolere.

§. IV.

De Officio Medici indignoscendis morbis eorùmque causis.

I.

Quo quis Medicus accuratior est in morbi cognitione, eò felicior in ejusdem curatione. asserente enim Hippoc. *de art.* si suffecerit Medicus ad cognoscendum, sufficiet etiam ad curandum, ut adeo non mirum, complures tantùm in medicinæ operibus aberrare, quantum in cognitione morbi falluntur, cùm igitur

prima

prima basis curandorum morborum sit recta earundem cognitio, atque debitum unius ab alio discrimen, Medicum planè percontatorem esse oportet, qui necessarijs interrogationibus non parcere, sed artificiosâ inquisitione morbi essentiam ejusque causam investigare debet, antequam curationis methodum aggrediatur.

II.

HAud malè agunt illi Medici, qui in curatione morborum moram aliquam admittunt, ac primâ die toti sunt in examinando ad amissim ægrò circa causas occasionales, omnèsque morbi antecedentes ac præsentes circumstantias, quo tempore nihil remediorum imperant, ne per illorum usum ordinaria morbi perjodus signorùmque constantia perturbetur, aut morbus alienâ facie sistatur, vel saltem generale aliquod & innoxium præscribunt Medicamentum. Secunda die diligentius consideratis rebus ante dictis morbi speciem tandem decernunt, & exinde remedia opportuna præscribere incipiunt, latent enim sæpiùs in puteo Democriti profundissimè sepulta prima morborum stamina, densâque caligine circumfusa delitescunt, ut non nisi magno labore, summâque industria erui possint.

III.

ANtesignanus noster *Hippoc. L. de affect. tit. 36.* quinque interrogata Medico, cùm ad ægrotum devenerit, proponenda injungit inquirendo. 1. *Quid doleat?* 2. *Ex qua causa?* 3. *Quot diebus?* 4. *An alius secedat?* 5. *Quo victu utatur?* plurimi quæstionum harum limites paulo angustiores agnoscunt, hinc etiam celeri cogitatione, linceâque mentis acie percurrere examinare & perpendere jubent ægrotantis *temperamentum, ætatem, sexum* & quo ad hunc sciscitando an mulier *gravida* & quot *mensibus* utero gerat? an *mensēs* in virginibus vel non gravida vel lochia in puerperis ritè fluant? item quale anni tempus, aëris constitutio, loci

ac regionis mutatio, consuetudo in victu, exercitia, Idiosyncrasia ac singulares, occultaque nonnullorum proprietates. Item quærendo an & quibus hæcenus usus fuerit remedijs? qualis eorum fuerit effectus? an prioribus jam annis tali morbo laboraverit, vel Parentes simili morbo detenti fuerint? an consuetam aliquam evacuationem neglexerit? &c.

IV.

PRædictis similibus quæstionibus pro se nata propositis, observatis simul ægri moribus, discursu, facie, oculis, ac lingua præsertim in morbis acutis pulsum tanget medicus, ex eoque virium vel robur aut debilitatem, vel effervescentiam febrilem aut naturalem æconomia corporis dispositionem dignoscet, ita tamen, ut, sicut in civilibus non uni testi, ita neque in foro medico huic soli signo tanquam fallaci subinde & incerto præsertim in affectibus capitis ut apoplexiâ, Icthargo, febribus etiam malignis, facillique ex causa mutabili & in varijs individuis vario non fidat.

V.

Idem dicendum de Urina, quæ post pulsum cognitum inspicienda, quo ad substantiam, colorem & contenta scite examinanda in morbis præsertim; quæ Vroscopia subjacent, ac quorum causa in genere venoso, Epate, Linene renibus, ureteribus vel vesicâ delitescit, hinc exhibilandi sordidi illi uomantes & lotio Phisici qui nescio quot vaticinium omni ratione carens levi popello vendunt, & quidem non ut Apollo ex tripode, sed ex matulis oracula edunt, ac turpem lucri odorem venantur, noverit autem Medicus, urinam æquæ ac pulsum ut signum coindicans tantum considerandum esse: ita ut cætera quoque signa diagnostica ex alijs fontibus desumpta ad partes vocari debeant, ut ex omnibus simul certi quid decerni possit, cum sola prothei instar mutabilior

bilior sit cum pro diversa individuorum varietate sanguinisque ac spirituum crassi, tum pro diverso vitæ genere pro Vigiliarum vel somni, repletionis vel inedia, motûs vel quietis, regionis, anni temporis, assumptorum, aliarumque circumstantiarum varia conditione.

VI.

Sicuti autem Urinæ, ita etiam pro varietate affectuum, excretorum alvi, sputi ac sudoris habenda ratio, præterea quoque tam in morbis Chronicis quàm acutis *Hippoc.* in cognoscendo hypochondriorum statu, num eadem mollia, æqualia & sine dolore Medicum quotidie diligentissimum esse jubet, cum ibi non tam potissima facultatis naturalis sit sedes, quàm etiam veluti Palæstra quædam, in qua omnes propemodum naturæ, morbi que fiant conflictus, ut adeò non tantum multum inserviant pro morborum diagnosi, verum etiam non leve futuri prælagij, evadant argumentum.

VII.

Cum ex dictis facile elucescat, quantâ solertiâ, ingenij perspicacitate & vigilantia egeat Medicus ad ægritudinis ideam, speciem, causamque detegendam, ut adeo veteres haud frustra Palladis ac Æsculapij simulachro draconem veluti vigilantia symbolum, & quem acutissima pervigilique oculorum acie præditum esse tradunt, apponerent, fontes signorum partis affectæ morbi causarumque quàm diligentissimè trutinandi & delibandi, quales sunt. 1. Essentialiter inhærentia, quo spectant partis temperies, magnitudo, situs, figura, morbus ipse sensibus obvijs. 2. Cognitio causarum procatharticarum & dispositivarum, vel hæreditariarum. 3. Actiones læsæ & quidem vel naturales, vel vitales vel animales. 4. Excreta, eorumque substantia, qualitas, quantitas, sapor, modus ac ordo excretionis. 5. Qualitates mutæ quo ad calorem, frigus,

gus, colorem, saporem, sonum. 6. Examen juven-
tium & lædentium. 7. Mutatio unius morbi in alium.

VIII.

QUodd, si verò, ut subinde etiam omni adhibita dili-
gentia & ab initio inprimis contingit, planè obscu-
ra fuerit morbi species, ut penitus cognosci & perspic-
nequeat, præsertim si quis vocetur ad curationem mor-
borum vel complicatorum vel obscure procedentium,
vel similitudinem cum alijs morbis habentium, ut Me-
dicum confundant, ac anxium & dubium reddant, ad
magna saltem remedia non accedendum, sed inviola-
bile illud præceptum Hippoc. *6. epid. sect. 2. text. 50.* ob-
servandum *si non potes prodesse: vide saltem ne noceas.*
hinc vel urgenti symptomati prospiciendum, vel debi-
lia aut communia tentanda præsidia, ex quorum admi-
nistratione nullum ægroto imminet periculum, vel res
tota naturæ committenda confortantibus interim insi-
stendo, tenuemque victum imperando, usque dum na-
tura vel vincat, vel morbum detegat, cavendo tamen,
ne æger aut adstantes propositum tuum agnoscant, ac
te ex incerta coniectura remedia tentare, eaque cum
alienæ vitæ discrimine experiri malè & perperam accu-
sent.

S. V.

De Officio Medici in prognosticando.

I.

VIx ulla Medicinæ pars est, quæ excellentiam artis
& Medici præstantiam adeo ostendit, quàm ea,
quæ eventus præfagiendi rationem tenet. Hæc
enim maximam medenti conciliat auctoritatem, cum
Numinis instar

Quæ sint, quæ fuerint, quæ mox futura sequantur.
Prænoscat. 2. Futuris docet tempestivè occurrere,
cùm

cum oculati Argi instar veluti ex specula futuras affectiones, imminentiâque gravissimorum symptomatum pericula prævideat & præcaveat. 3. Apud ægros & adstantes parit admirationem: hinc admiratio fiduciam: fiducia obedientiam ac obedientia sanitatem. 4. Medicum infamiâ, calumnijs, ac crimine internecionis liberat. Cum enim omnes sanari non possint, ac plurimi vel ob ægritudinis contumaciam vel ægri inobedientiam vel ejusdem debilitatem vel adstantium errores, vel rerum necessariarum defectum vel fati necessitatem vitali luce priventur, Medicus prudenti prælagio ab omni mortis culpa se reddet immunem. Officium enim ejus est, morbos sanabiles sanare, & insanabiles prædicere, ne, si fortè ars victa malo fuerit, vel ignorâsse vel fefellisse videatur.

II.

Sicuti autem scientia Prognostica nobilissima ac utilissima, ita pariter quoque obscurissima & difficillima, ut plures, vel peritissimi Medici subinde in prælagiando cæcutiant, & vacillent. difficillima est, 1. Ob subitam crîsum mutationem, quæ prædictionem multoties interturbat. 2. Ob velocissimum turgentis morbificæ causæ impetum nunc ad penitiora partis alicujus principis penetralia, nunc ab ijs ad ignobiliorem corporis partem, ut vel repentina salus, vel inopinatus sequatur interitus. 3. Ob plures morbos ex humoribus diversis & contrariis scaturientes. 4. Ob causas procatharticas inopinatò supervenientes crîsum certitudinem corrumpentes. 5. Tandem ob peculiare hominum proprietates & Idiosyncrasias Medico sæpè numero haud compertas.

III.

Cum igitur tanta Prognosis difficultas, ut etiam Hippoc. prælagiendi artis magister peritissimus 2. aph. 19. pronuntiaverit, *acutorum morborum non esse certas præ.*

Prædictiones neque ad salutem, neque ad mortem cautum semper Medici sit præfagium, ne, si res aliter ac prædixit, succedat, ægro & adstantibus risui & contemptui habeatur, vel commissi in curationis negotio erroris insimuletur, nihil enim juxta effatum Hippoc. 2. prorrh. & lib. prenot. ineptius est, quam Medicum in prognosi morborum frequenter falli. Sicuti enim nunquam hallucinari ferè supra captum hominis: ita rarissimè solius artificis, prout ingenuè fatetur Censorius l. 3. progn. 41. & Galen. in Commentar.



IV.

Medicus nunquam sanitatem, nisi infallibilis sit, certo promittat, vel ejusdem certos præfigat terminos: multo minus agyrtarum & scurrarum more turpis captandi lucri causâ certitudinem talem juramento confirmet, cum nunquam certus sit de suprema causa, à qua cuncta hæc inferiora diriguntur, neque etiam de obedientia ægri, vel diligenti applicatione, aut operatione remediorum, vel naturæ cooperatione aliisque pluribus casibus subitaneis, atque fortuitis temerarias ejusmodi pollicitationes evertentibus; ut adeo non mirum tales sui dedecore, infamiæque dolore meritis errorum suorum pœnas luere.

V.

Pari ratione nunquam mortem certam, nisi certissima & infallibilia fuerint indicia, vel eam absque spei, si aliqua affulserit, mentione prædicat, ne fortè, quem moriturum infallibiliter falso præsenſerit magna cum nominis sui calumniâ non ita longè post quasi à mala sententia provocaret, supervivat. Non enim omnia adeo manifesta sunt circa ægros ob specialem uniuscujuscunque individui idiosyncrasiam, quin interdum hujus ratione miracula in Medicinâ fieri videantur, & si, qui conſignati putantur præter spem subinde convalescant.

VI.



VI.

A Gritudine incipiente aut parum invalescente Judicium suum suspendat Medicus, ac oraculorum more ambigue de morbi exitu sermocinetur; illudque Galen. 1. *De dieb. decret.* 12. observet, si nihil in morbo firmiter præfagire possimus, satius est tacere quam temere propuntiantem falli, quia 1. nonnulli videntur morbi ab initio salutare latente malignitate, qui postmodum ex insidijs erumpentes ad occasum insperato tendunt cum dedecore bene præfagientium. 2. Medici nonnulli minus cauti facile decipiuntur, dum vel subitis ægrorum alleviationibus absque ratione & causa manifestè repente factis cæcâ decepti fiducia, & ab omni suspitione remoti salutem statim spondent, dum non raro, insperata supervenit mors, ac spei gaudium inopinatò vertitur in mærorem cum artis ignominia & medici infamia, vel mala pertimescunt, quæ tamen, sicuti præter rationem ac temerè eveniunt, ita non sunt formidanda utpote instabilia & minimè durabilia, vel tandem magnum & acutum pronuntiant morbum, qui dein repentè evanescit superstitè solum Medici amuli & inexperti infamia. Nihil igitur temerè affirmandum: nihil etiam contempnendum.

VII.

Medicus in Prædictionibus *Hippoc.* utpote hac in arte cautissimi & exercitatissimi apprime versatus sit, & nocturnâ diurnâque manu ea versans illius *lethale, malum, periculosum & perversum* probè norit distinguere. Sciat etiam interdum à multis bonis indicijs unum malum vinci, & rursus e contrario à multis malis unum bonum, noverit quoque fundamentum legitimum prognosticos cujuscunq; consistere in circumspecta consideratione roboris naturæ & violentiæ morbi, & utriusq; mutuâ collatione, imprimis etiam ægri decubitus & faciem
veluti

veluti corporis & animi speculum, & oculos, in quibus elucet vitæ nostræ radius & Virium præcipuus Character, & nares, & linguam, quæ humorum qualitates ac inflammationes internas siccitate sua exprimit, & manus & pulsum & urinam, reliquaque excreta, ac præsertim signa coctionis in ijs apparentia vel deficientia linca mentis acie contempletur, quæ cùm *Galen.* accuratissime semper observaverit, se nunquam in prædictione deceptum fuisse gloriatus est, unde etiam *3. epid. comment. ult.* doctum in arte non valde in prædicendo falli posse affirmat.

VIII.

SI Medicus dubiam naturæ victoriam sagaci conjecturâ prævideat, periculum adstantibus maturè insinuet, ut patiens prospiciat conscientiæ, domuique suæ disponat, & affines curæ suæ & hæreditati cogitent. ipsæque Medicus à mortis subsecutoræ culpa fiat immunis nihil interim ommittendo, quod ad opem naturæ ferendam, ad ægrotantis solamen, assidentium gratificationem, suæque operationi ultimum posse tribuendum accommodatum videbitur: spei etiam, si aliquod adsit lumen ostendendum, salusque à remedijs & à viribus, si hæc constiterint, ac nullus obtingat error, speranda.

IX.

SI Medicus nullam superesse spem, ægrumque prorsus conclammatum viderit, post exitum è cubiculo absq; terrore submissâ voce & appatenti saltem visus & animi tristitia assidentibus iudicium suum aperiat, nullatenus autem ægrotantem omnino deserat, cùm multi sæpè mirabiliter sanentur, ac monstra non tantum in natura, sed etiam in arte contingant, ac interdum in desperatis casibus Benedictio divina præter omnem spem, dum lex officio sæpius extremè laborantibus succurrimus, nobis affulgeat, hinc sæpius à Medicis prognostico derelicti vel sponte, vel obvijs oblati remedijs convalescunt.

X.

Medicus animum decumbentis præsertim timidiorē quantum fieri potest, & animæ salus concedit, erigat, consoletur, spēmque ejus dulciter nutriet, cū ejusmodi confidentia spiritibus recreatis & in motum concitatis sæpius humores corporis facilius corrigantur, hisque se benè habentibus viscerum damna quoque promptius deleri possint, ita tamen, ne periculosus in morbis ægrum nimis hilarem ac bonæ spei plenum reddendo in multo majorem hinc conjiciat tristitiam, cū in pejus ruit morbus, vel ultra ejus promissa produci-
tur, aut in futura salute nimium confusus Medico, ut fat est, non obtemperet.

XI.

Caveat medicus, ne coram infirmis, qui oculis & auribus intenti in cubili detinentur, ac gestus, vocēsque Medici nondum elatas, & vix dum in labiis hærentes, circumspiciunt, mullitent, vel gestu assidentibus, ac multo minùs ipsis ægris ægritudinis periculum & acutiem manifestent, nisi vel occurrat æger animo fortis & prudens, qui plùs magni fecerit scire eventus morbi veritatem, quàm exitum adversum extimuerit, vel ægri morosi ac Protervi remedia ad salutem utilia ac necessaria respiciant, ut ea lubentius admittant, vel exposcant, vel Patientes permaneant ad Pænitentiam contumaces, & monita salutaria spernentes cras in crastinum differant, quo in casu Medicus zelo charitatis accensus (suavi primùm cum dexteritate, hinc etiam hæcvanà existente indignabundus propinquam iis mortem aperte præ-
giat, ut saluti suæ provideant, & licet malevolentiam incurrat, generosè tamen eam contemnat, pro certo habens, gloriæ palmam sibi comparari, si quid-
quam adversum in recti muneris execu-
tione procedat.

S. VI.

§. VI.

De Officio Medici in consultando.

I.

Consultatio Medica non tantum ægroto maxime utilis, quam medico honorifica, Vtilis, cuius
1. cum in rebus alioquin omnibus pluralitatum
votorum tum consiliorum tam sollicitè quæratür &
expetatur, eadem minime rejicienda in re maximi mo-
menti, qualis est sanitas & vita nostra thesaurus longè
omnium præstantissimus, ut adeo æger bonam recupe-
randæ valetudinis spem, ac singulare emolumentum
sperare possit ex plurium Doctorum virorum colloquio,
qui magnâ vigilantia & cura, sapienti consilio, fide egre-
gia, mira dexteritate, & accuratissima providentia
eidem assistunt, ac de ejus affectu curando disserunt, 2.
Quia curatio & cognitio morborum utpote sæpius res
ardue & intricatæ multorum judicio ac voto magis
enodantur, ut unus solus in tanta judiciorum difficul-
tate, in tam magna experimentorum incertitudine, in
tam præcipiti occasionum lubricitate, in tot millenis
rerum circumstantiis sæpius haud sufficiat.

II.

Honorifica Medico est consultatio, cum in ea Medi-
corum Doctrina, judicium, modestia, aliæque vir-
tutes præcipue cognoscantur, sicuti enim plures ob
consultationem indignè institutam famam via indirecta
acquisitam de repente amiserunt, ita econtra multi rara
eruditione conspicui, qui ob taciturnitatem & mode-
stiam vel aliorum invidiam diutissime latuerunt, facto
sermone doctrina & eruditione pleno emerferunt, ho-
minumque benevolentiam & morem magneticè ad se
rapuerunt: cum præterea labores & curæ æquis inter se
parti-

partibus dividantur, ut vel plùs laudis, si ex communi voluntate res benegeratur, vel minùs invidiæ, si consilij dexteritatem speratus successus fefellerit, in medicos retundet, sicque vulgi calumniæ, imperitorumque detractorum tela magis evitentur.

III.

Sligitur morbi gravitas id exigit, atque æger vel adstantes, aut consanguinei alios pro consilio proponant. Medicus alacritet eos admittet, neque per hoc, prout venerandus senex *L. de præcept.* ait indecore quidquam aut contra auctoritatem suam facturum aliquid unum illum affirmat, qui plures advocaverit. Siquidem hominem se fateri, nec unum omnia posse agnoscere apud sapientes nihil omnino præjudicat, aut de jam præconcepta existimatione diminuit, cum præsertim cujuscunque etiam doctissimo id evenire possit, ut, dum alterius curam peragit, continuè ipse etiam curis & sollicitudinibus obrutus, & quibusdam quasi tenebris circumfusus eo ipso reddatur perplexus, minùsque perspicax ad discernenda ea, quæ in præsentì casu magis forent necessaria, magisque conducibilia, hinc etiam laudabile hoc institutum habendi consultationes etiamnum viget in non paucis Hispaniæ, Galliæ & Italiæ locis Parisijs imprimis & Patavij, ac modo etiam Vientiæ, ubi peraro morbus gravis curandus suscipitur, quin conjunctis plurimorum consilij de agendis deliberetur, si res postulare videatur.

IV.

UT ægro utilis ac Medico honorifica sit consultatio, primo consulentes sint eruditi, perspicaces, providi, curarum præsertim felicium experienciâ insignes ac Pacis præcipuè amantes, hinc olim Romani Medicos in templo pacis congregari jubebant, ut de ægri salute placidè, & absque altercatione conferrent, & ab execrabilibus

erabili, sedâque magis angue lernæ contentione ab-
stinerent. Ad ægrotantis enim salutem, veritatisque
centrum unicè collimandum: non ad gloriam, non ad
lucrum, non ad privata commoda, aliòsque affectus,
qui pessimi sunt Consilarii; plures enim ægrotantes ob
exorta inter Medicos dissidia; dum privatis inter se gli-
scunt odiis aut æstuant simultatibus videntes quomodo
calamitatem aut maledicta alteri afferant vel affingant;
infaustissimam sortiti sortem pereunt, dum occasio nun-
quam reditura præterit, pessumdata restat natura, mor-
bus invalescit, ægërque interuicione deletur: sicuti
ignui medicorum æmulatio, contentio ac dissidentia in
ægrotantium periculum ac perniciem adstantiùmque
confusionem; ita eorum consensio ac concordia in ma-
ximum ægrotantis & reipublicæ Medicæ emolumentum
& honorem cedit.

V.

SECUNDÂ consultatio maturè instituatur, antequam
prosteruat, conculcet, vires atterat, ac prorsus ener-
vet morbus, ægërque symptomatum violentia ac sævi-
tia succumbens agonizet. Numerus consulentium ad
evitandam confusionem non sit nimius, hinc cum in
ore duorum vel trium stet omne verbum ac trium viro-
rum unio sit quasi symbolum perfectionis, adeo ut co-
gnitio, quæ à tribus eruditis non habetur, vix à pluribus
obtineri queat, gemini vel tres sufficiunt, licet etiam
in aulis principum quatuor vel ad summum sex non
improbentur.

VI.

TERTIÂ consultatio non sit imparata; omnia enim
subita probantur incauta, nisi subinde necessitas ob
repentina, graviâque ac urgentia symptomata superve-
nientia gladiatorum more in arena ex tempore consi-
lium capiendum esse jubeat, hinc maximè ægrotis con-
sultum atque proficuum & exoptandum foret, ut Me-
dicus

dicus ordinarius prius casum seu speciem facti cum omnibus circumstantiis cæteris futuris consiliariis scripro mitteret, ut tanto paratiores, maiorique eruditione instructi accederent, sana enim consultiatio, ut, inquit, Bias apud Laert. ex eruditione rerumque peritia & experimento contingit.

VII.

Quartò consultatio sit ordinata, ita ut Medicus ordinarius omnium primò Historiam morbi, eiusque originem, vehementiam, durationem, adhibitaque præsidia fide recta, mentèque sincera proponat: hinc doctoratu junior ascendendo ad senioreni usque conclusum ultimato formantem graviter, erudirè, liberè, benignè tamen ac modestè absque ullo existimationis suæ nævo de morbi genere, differentiis, causis, signis, indicationibus, ac materia remedium, & quidem omnia lynceo mentis acumine penetrando dissecat, sententiam suam validissimis rationibus stabiliat, præstantium & authenticorum scriptorum auctoritate fulciat, experimentis atque exemplis, quibus res clarior evadit, confirmet, aliorumque opiniones, si minùs idoneæ & rationi consentaneæ videantur, modestè & absque zelo refutet, arque aliam magis tutam curationis viam persuadeat.

VIII.

Sicuti Galen. non reprobat Medicorum dissensum, sed amicitiam plenum, ac doctam duorum Medicorum contentionem honestum consultantium certamen appellavit, quæ etiam in medicina, ubi multa conjecturabilia, quæ ambiguitate & controversiâ non carent inevitabilis: immò sæpius cotis instar ferri que mutuo attriti veritatis ignem elicit, atque ex dissonantium vocum, opinionumque discordia gratissima, ægroque utilissima emergit harmonia, ita prudentis erit Medici sententiam adversariam, si necessitas urgeat, benivolè recellere, non
C
proflus

prorsus eam negando vel directè vehementius impugnan-
do, sed placidè distinguendo, ac contrariorum argu-
mentorum vi modestè rerundendo. Cordati enim Me-
dici est revelli sine pertinacia, & revellere sine iracundia
cavendo insuper vel maximè, nediſta & facta Ordina-
rij vel alterius ad ejus oppressionem. & contemptum,
ſuique ad aucupandum honorem carpat, ſua meliora
importunè obtrudat, peccata in medendo obtendat, &
omnia crebris contradictionibus peſſumdet.

IX.

QVINTò conſultatio talis ſit, in qua ſuperflua omnia
vitentur, nihil ad pompam, nihil ad oſtentionem
proponatur, nihil etiam neceſſarium ad ſanitatē ægro
redimendam ommittatur. Exulent igitur. 1. qui lo-
quacitate ſua, dum de ægroti ſalute vel ſaltem de rebus
ad eam pertinentibus ſermocinari deberent, turpiſſimè
in devia ac inanium & importunarum quæſtionum la-
byrinthum incidunt, vel de non entibus proluxa verbo-
ſitate diſcurrunt. 2. Qui eloquentiam ſuam oſtenden-
tes magnificis verbis, ſuperbísque nominibus de morbo,
ejúsque cauſis pronuntiant, hincque vel curam alij Pro-
ſus morbo accommodant, vel in remedijs omninò jeju-
ni & ſteriles frigescunt, cùm tamen laudabilius ſit fide-
liter curare, quàm ſubtiliter de morbo diſputare, &
admirari morbos, non autem curare ſit hominis ſua
arte & ingenio abutentis. 3. Qui ut boni Præctici vi-
deantur, remedijs onerari ut Mendicus laccinijs & aſſi-
nus ſaccis prodeunt, ac morborum eorúmque cauſas ſicco
pede tranſcuentes neſcio quibus ſecretis non tam è tripode
Apollinis aut Jovis cerebro depromptis quàm propria
ſpeculatione inventis morbum ſanatuſ ſeſe promiſſis
potiùs magnificis aures ſcalpunt magis, quàm effectū
præſtant.

X.

Quo ad locum consultationis, Patavij habetur in publico, ubi coram plurimis auditoribus, consanguinitate junctis alijsque magna cum gravitate de natura affectus differitur & plerumque in potissimis consensus in parvis dissensus, sed amicitia plenus reperitur. Alii semotis arbitris, alijsque affinibus ac ægrorum domesticis peragitur, ut sic liberiùs proferantur sententiæ, factaque à primo Medico, si correctione indigeant, liberè sine omni nota ignorantia, corrigi possint, in quem aliàs creduli adstantes si mors subsequeretur, ejus causam referrent. siue autem in publico siue in privato instituaturloco, nunquam tamen in præsentia ægri periculoso valde vel incurabili morbo laborantis, ne audita mentione infelicis exitus turbetur animo, qui corpore jam ante languebat infirmo, vel priùs saltem de simulato prognostico conveniendum, ut ejus animus in bonam spem erigatur veritate rei interim amicis insinuata.

XI.

Facta consultatione Medicus ordinarius peritorum consultorum exequatur consilia, eorumque decretis obtemperet, necesse est, sæpè enim accidit, ut hic consultorum dicta contemnat, laceret & præscripta eorum, postquam abjerunt, rejiciat, lividis coloribus depingat, ad sua redeat, in sententia ac erroribus suis obstinatè perseveret, ægròque persuadeat, eos multa quidem dixisse, sed scopum non attingisse, se meliùs ægri naturam noscere, sicque meliùs sanitati suæ consulere possesed sicuti talis, dum consultores ægro sunt præsentés in eodem loco, summè arrogans ac præsumptuosus, in socios perfidus & ægrotanti summè perniciosus jure merito habetur, ita si consulentes absint, scriptoque tantum sua communicent consilia, Medici adstantis ac Domestici potior habenda ratio tum quia autopsia Medicum

docet & confirmat tum quia, licet è longinquo exper-
 tissima præsidia medica præscribantur, sæpiùs tamen vel
 eorum mentem non semper rectè percipiunt ægroti,
 vel dubij sunt, an hæc ferre possint, vel nova inexpec-
 ctata, nec prævisa superveniunt symptomata, vel re-
 media non statim eam, quam ægroti sibi pollicebantur,
 præstant operam, ut iam deferere sit animus, quibus
 in casibus necessarium est, ut ordinarius præscriptæ curæ
 clavum teneat, ac dirigat & pro ratione loci, temporis
 ægri ac morbi nunc addat, nunc demat,

XII.

Quisquis igitur vitam summopere zelans morbo per-
 tinaci ancipiti, periculoso aut ex toto vel ex parte
 insanabili corripere, & ad medicam consultationem,
 velut ad anchoram & aylum confugis, ut vel levamen
 vel integram exinde speres valetudinis restitutionem, ut
 eadem ritè & dicto modo peragatur, cura, vel si perni-
 ciosa consulentium dissidia & turbas timeas, eos seor-
 sim accersere, velut separatim sententiam, atque rationes
 suas scriptis mandent, iube, eaque medico tuo adstanti
 & ordinario approbanda vel reiicienda vel ex Parte vel
 ex integro committe. Si enim vir probus sit & hone-
 stus, in cuius animo Charites, medicæ virtutes ac pe-
 ritia conspirant, excitatus præsertim fiducia tua ad
 maiorem curam & sollicitudinem nihil quidquam in
 votis optatusque habebit, quàm ut boni principis in-
 star, vel amantissimi patris aut tutoris valetudinem
 tuam regat, vitamque pro viribus tueatur, si autem eius
 scientiam ac peritiam suspectas habeas, cum prorsus
 cum emerito sostro dimmittas, aliique, cui libentiùs
 fidas, salutem tuam concredas, consulo.

S. VII.

De Officio Medici in Methodo medendi.

I.

Rogatus olim à nonnemine *Capivacius* magni nominis & immensæ eruditionis præclare de de universa Medentum republica meritis, ut arcana & secreta sua communicare vellet, scitè respondit, *Disce meam methodum, & habebis mea secreta*, hæc enim est arcanorum suum arcanum, hæc est basis ac firmissimum artis medicæ fulcrum, hæc est lapis lydius, quo veri rationales Medici à spuris & adulterinis, Empyricis nempe & agyrtis discernuntur, hæc est vera ars, quæ per indicationes auxilia inveniuntur ad sanitatem tum conservandam tum redimendam. Nemo enim ut Parens Medicinæ *Galen 9. method. 8.* testatur artis medicæ scientiam nancisci potest, nisi & methodum quandam habuerit per universalia Theoremata, & in particularibus se exercuerit.

II.

Medici Methodici est curare citò tuto & jucundè. citò quidem tum ob celerem fugacitatem occasionis, quæ citatis alis properat ac fulguris instar fugit: tum ob corporis humani æconomiam variis mutationum vicissitudinibus obnoxiam, tum ob celerrimos haud rarò causæ morbificæ motus, ut medicamenta, quæ antea erant proficua, hinc reddantur inutilia, tum ob vires quæ modo validæ ad remedium perferendum, postea diminutæ & languidæ illud ipsum admittere nequeunt. Rectè igitur magnus *Hippoc. in epist. ad Crater.* meminit. Ab omni quidem arte aliena res est procrastinatio; verùm maximè in Medicina, in qua vitæ periculum parit: præcipuè autem occasio atten-

denda in morbis acutis , qui vehementissimis stipati
 symptomatibus ocyllimè citato cursu ad statum pro-
 perant.

I I I.

CAveat igitur Medicus , ne agyrtarum , & Pseudomē-
 dicorum instar turpissimi lucri causa morbos pro-
 longer , ac momentum illud occasionis , quod est anima
 curationis , turpiter negligat : neque etiam imitetur
 meticuloſos illos & superficialios Medicos , qui famæ
 suæ nimis sollicitè consulentes , ac mulierculas , impe-
 peritum vulgus subinde etiam magnates nescio quid ul-
 tra artem sibi sapere visos timide respicientes nullum
 magnæ efficacix prælidium administrare audent , quod
 non ipsis adstantibus vel approbatum vel concessum
 fuerit , ne ex minùs prospero eventù nocuisse potius ,
 quam profuisse visi ægri incurrant contemptum , neque
 timidos illos lepores , quorum timore plures ægroto-
 rum è vita discedunt , vel chronicos incurrunt affectus ,
 dum vel ab initio non satis validè mox revellunt mate-
 riam aliquam in partem affluentem , vel purgationem
 saburra cacochymica in primis vijs hærente differunt ,
 usque dum præternaturale præpullulet fermentum
 totam iuficiens massam sanguineam ac reliquas visce-
 rum digestiones corrumpens , vel dum ebullitiones fe-
 briles prætermittis venæsectionibus non restinguunt ,
 vel in morbis gravibus quibuscunque ad generosum
 aliquod auxilium descendere reformidant , non perpen-
 dentes illud *Massaria. vix ullos magnos curari morbos ,*
quia raro se expediunt Medici à lenientibus vel illud *Cels.*
satis est experiri anceps remedium quàm nullum.

I V.

Non tantùm citò curabit Medicus , cum elapsa occa-
 sione causæ morbigicæ repente sumant aliam ideam ,
 motum , ac morem , humores noxij dominantur morbus
in-

inualeat, symptomata sæviant, vires collabascant, naturaq; oppressa succumbat, sed etiam celeritati iungenda est *securita* veluti media, & inter duas reliquas conditiones præstantissima. Licet enim in morbis chronicis faciles inducias concedentibus festinatio nimia sæpius periculum minetur, Medicus tamen eo semper intentæ mentis acie collimare debet, ut *turò* saltem medeatur.

V.

Turò curabit Medicus, si utatur remedijs velut amicis, paucis nempe sed expertis, ac longissima annorum serie approbatis, & quasi canonizatis. Certa enim dubijs & incertis præferenda, hinc dum *Cels. l. 3. c. 9.* temerarijs subinde remedijs utendum esse innuit asserendo *quos ratio non iuvat, temeritas subindè sanat*, intelligendum hoc de morbis planè conclammatis & desperatis, in quibus melius est anceps remedium expectari quàm nullum. *Turò* curabit, qui noverit remedia vulguria præ foribus nascentia viribus integris, faciliq; pretio ubivis habenda sæpius præstare exoticis & peregrinis incertam subinde profapiam mentientibus, suspectis, mangonizatis, nec raro situ, tere dine, sentinæque corruptis.

VI.

Turò curabit, qui noverit æquè feliciter & faciliter curari morbos remedijs simplicissimis, evaporistis ac vulgaribus, selectis tamen ac circumspectè, & cum iudicio adhibitis, quàm per stupendam illam, & lesqui pedalem receptatum molem, aut per abstrusissima nonnullorum secreta, hinc teste *Helmont.* pauca sunt, quæ Medicum Nobilitant, sæc aureum illud *Arnoldi de Villa nova* dictum probe observandum. *Dolus est, uti compositis: ubi simplicia sufficiunt*, sicuti enim simplex victus saluberrimus ac naturæ convenientissimus, ita pariter & Pharmaca, cùm in utrisque natura paucis

contenta sit. Pro re nata igitur medicus nec solis eum-
poristis & simplicibus, nec semper compositis uti sciet.

VII.

Prò curabit, qui didicit abstinere remedijs chymicis
propriâ manu haud paratis, aut quorum experien-
tiam nondum habet, præsertim si Galenica sufficiunt.
Item qui purgantibus violentis præcipuè Mercurialibus
& antimonialibus haud usus fuerit præsertim in jam se-
nescentibus, lactantibus, cachecticis & debilibus aut
Venæsectione nimis prodiga in ætate jam ingravescen-
tè, in non assuetis, in morbo inveterato, viriumque
defectu, vel opiatís in asthma, hydrope, infantibus,
extremâque spirituum inopia exhaustis, vel dulcibus in
affectibus tartarico acidis.

VIII.

Prò curabit, qui omnes causæ morbificæ reliquias è
corpore ad pulvisculum usque expellit, ne ijs reli-
ctis massa cruoris subinde ebulliat, fermentescat :
sicque recidivam radice sua pejorem patiatut æger, qui
insuper maximè studuerit eradicandæ causæ morbificæ,
ex siccandoque fonti, unde tot symptomatum scaturigi-
nes propullulant, ita tamen ut subinde à regia via diver-
tere, & symptomatibus præsertim urgentioribus occur-
rere possit, vel causæ simul & symptomatibus prospicere.
Item qui morbis debilibus debilia, valentibus valentia
adhibet remedia. Sicuti enim, quæ longo tempore
sunt contracta, lentè curare oportet, ita quæ brevi bre-
viter, ut creationis morbi & curationis paria quoddam-
modo sint temporum momenta.

IX.

Prò curabit, qui auream illam venerandi *Coi* obser-
vaverit regulam. *Si non potes prodesse, saltem ne no-*
ceas. Sæpius enim dum Chronicas ac profundâ radice
inveteratas ægritudines curare præsumimus, hydram
lera-

Iernam offendimus, ac non solum non juvamus, sed magis ledimus: hinc noverit optimum sæpè medicamentum esse non uti medicamento. Quiere namque & abstinentiâ præcipiente *Celso* gravissimi curantur morbi; immò neglecti subinde morbi teste *Ætio* fiunt leviores, frustranea enim sunt medicamenta exhaustâ naturâ vel obtento jam sine, vel ubi ipsa natura sufficit. *Tutò* etiam curabit, qui topica, nisi aliquid adsit, quod curationem prævertere possit, ante universaliâ remedium usum non applicaverit: qui medicamenta temerè non mutaverit, cùm crebrior eorum mutatio, vel ignorantiam vel diffidentiam innuat, qui tandem vel diætâ subinde sola vel saltem nunquam sine illa medebitur, nam sine clavis & remis navigat, qui nullâ victus ratione observata Medicinam facere conatur, hinc verum illud magni *Sennerti* effatum. *Medicamenta vel efficacissima in cassum propinantur, ubi justum & conveniens diata regimen fuerit neglectum.*

X.

Itundè tandem, quæ ultima medendi conditio, medebitur medicus, si remedijs utatur suavis, & quoad fieri potest colore, odore & sapore gratis, lubentius enim tinctura vel essentia dulcis & odorata vel pauca & insipida pillula vel exiguus assumitur pulvisculus, quàm longum & ingratum apozema, aut portiones amaræ vel prodigiola & theriacales compositiones & nauseabunda variorum simplicium commissio, quæ insuper certa ignorantia filia, periculosa etiam & sumptuosa.

XI.

Itundè curabit, qui sine dolore vel absque insigni molestia ægrotum tractaverit vitando omnia, quæcunque vel animum vel sensus ejus offendere possunt: concedendo econtra, quæ visui jucunda oculos delectant: quæ tactui grata & attingenti mollia, quæ in

cibo & Potu palato suavia in ijs præsertim , quæ pa-
 rum nocere valent , aut quorum levis illata noxa facile
 reparari potest , curando etiam ut omnia sint munda ,
 mundisque vasculis excipiântur. Nullus adfit ministro-
 rum , nisi quem æger libenter viderit : nemo adstatu-
 rium vel amicorum cubiculum introeat , nisi cujus ad-
 ventus & præsentia ægro fuerit gratissima. iucundita-
 tem augebit per omnia, Medicus, si lenitatis, dilectionis
 & beneficentiæ affectibus excitatus erga ægrum fuerit
 humanus, affabilis, suavis & gravis.

XII.

DVm autem ægrotorum genio gratificari conatur Me-
 dicus, caveat, ne nimia promptitudine in præstan-
 dis ægro obsequijs excedat, quemadmodum enim faci-
 litas mediocris iucunda est, & nihil detrahit de autho-
 ritate Medici, ita, si nimia non tam sæpè cedit in Medi-
 ci contemptum quàm ægri perniciem, si peræsertim
 concedantur, quæ curationis cursum retardare, vel
 morbi periculum augere possunt, ut medicastris adula-
 toribus haud infrequens, dum vel in gratiam ægrotorum
 causâ morbificâ multum adhuc in corpore luxuriante
 dolores Narcoticis sedant, sicque ut cum Rhase loquar,
 rem magni terroris componunt, vel appetitui ægrotorum
 unice lenocinantes nunc frigidam, nunc vinum, nunc
 cihos solidiores, ubi non deberent, porrigunt: nunc
 servorum ritu quibuscunque iussis parent, cum tamen
 Medici ex Æsculapij progenie exorti ægris dominari,
 iisque præesse debeant, sicuti duces exercituum militi-
 bus ac Reges subditis, & certè quàm multi blanda au-
 rium gargarizatione per deceptorios hos susurriones in-
 struta ad superlunares ablegari fuerunt, qui sub rigi-
 dis veterum Medicorum præceptis con-
 valuissent.

XIII.

XIII.

Jucundè tandem curabit Medicus , qui minoribus , quoad fieri potest medebitur expensis , haud imitando illos , qui ægros in maximas inutiles ac supervacaneas expensas præcipitant , præscribendo ad ostentationem potius vel inscitiam suam multitudine & pretio medicamentorum tegendo , vel Phatmacopolas , cum quibus subinde pacta quædam circumventiosa instituunt , ditando præscribentes remedia tam cara quam rara , quæ ægrum è morbo convalescentem in novas pro tot debitis persolvendis angustias & ægritudines deturbant , ut deinceps mori potius cupiant absque medicamentorum ope , quam cum tanta Pharmacorum suppellectile ac hæredum suorum dispendio perire.

XIV.

Felix igitur ille Medicus , qui *tutò , citè ac jucundè* medebitur. Licet autem reperiantur quidam casus , in quibus hæc 3. requisita incuratione conjungi nequeunt , non enim in morbis chronicis semper citò , nec in illis , qui vomitum desiderant , alijsq; semper jucundè mederi valemus , unde spectandum ad id , quod magis urget , anteponendæque securitas celeritati & jucunditati maximè ubi mortis impendet periculum : satius etiam est morbum cum minori jucunditate citò curare , quam ægrorum Palato & voluntati abblandiendo affectum prolongare & exasperare.

§. VIII.

De Officio Medici in petendo & recipiendo Sestro.

I.

Medicis ac præceptoribus non rei , quam communicant , sed operæ quam locant , pretium solvi

Solvi elegantissimo loco exprimit *Senec. l. 6. de benefice. c. 24. emu*, Inquit à medico rem inastimabilem vitam ac valetudinem bonam: à bonarum artium præceptore studia liberalia & animi cultum. itaque, his non rei pretium, sed opera solentur: quod deseruiunt: quod à rebus suis advocatis nobis vaccant, mercedem non meriti, sed occupationis sua ferunt. Meritò igitur Medico convenit Honorarium tam pro visitationibus, quàm Itineribus, formularum præscriptionibus, tædie, labore. lectione ac meditatione &c. cum illud *honora Medicum* non de verbali tantum, ut ita dicam, sed reali etiam honore intelligendum sit, si enim juris consultus non tenetur gratis consilium ferre, nisi pauperibus, si advocatus pro labore honorarium postulare potest, multò minùs Medicus gratis haud mederi tenetur utpote salutis hominum unicè intentus.

II.

Licet verò Medico competat honorarium pro suo labore & diligentia, etsi etiam moriatur æger, dummodo juxta artis præcepta medicinam fecerit, ut nihil ipsi imputari possit, quod vel maximè observavit *Socrates*, cujus morientis ultima vox erat. *O Cristo Cristo! Æsculapio gallum debemus, quem reddere nec negligatis.* Tamen de mercede cum ægro pacisci præsertim in morbis dolorificis & acutis videtur esse res nobilissimâ arte medicâ indignissima ac mos potiùs *Empyrciorum* & *agyrtarum*, qui, dum dolor est & occasio viger, quidquid possunt, attripiunt, quod tamen, sicuti impium, ita arti potissimum ignominiosum. Pacta hujusmodi honestis viris avaritiam & sorditiem: Jurisconsultis extorsionem sapiunt, quid enim non largiretur in periculo constitutus? *pelle pro pelle*, ut legitur in *lib. Job. Et omnia, qua possidet homo, dabit pro anima sua.* Sicuti igitur de mercede cum ægro pacisci indignum, de illa deliberare durante morbo indecorum & avarum, ita impium urgente eodem magno & acuto.

III.

CAveat ingenuus Medicus, ne tacito quodam postu-
landi genere apud ægrotum hanc aut illam vestem,
clinodia, equum, libros aliâmye supellectilem dome-
sticam nimirum commendet, nevé ab eodem, si merca-
tor fuerit, quidpiam emere tentet, ne aliquam inferat
cogitationem hominibus alioquin suspiciosus, & de lu-
cro semper cogitantibus velle, ut sibi offeratur id,
quod emit aut collaudat, & artificio quodam id ex-
torquere, quod ipsum oblatum non confidit, multo
minùs quidquam ex domo Patientis assumere detestan-
dæ avaritiæ indicio, quàm summopere improbat divi-
nus *senex dum lib. de dec. ornat.* sapientem Medicum ar-
genti contemptorem debere esse dicit, idem inuit *Seneca*,
ac laudatissimo exemplo re ipsa testatus est *Hippoc. abde-
rites*, qui nunquam se pro usu medicinæ accepisse mer-
cedem scribit, quia Medicina libera est & Deorum mu-
nus, quam laudis partem Patri quoque suo Medico at-
tribuit hoc disticho *Ausonius*

*Obtulî opem cunctis poscentibus artis inempta.
Officiûmque meum cum pietate fuit.*

IV.

Sicuti laudabilis mos est nonnullorum locorum, quo
certum pretium certis Medicorum laboribus deter-
minatur: ita si nihil certi statutum sit, æquum exigere
potest sostrum Medicus cavendo, ne vel nimio rigore
incurrat suspicionem avaritiæ, vel abjecto nimis pretio
suspicionem negligentiae, quasi non adhibuisset ea om-
nia, quæ è re ipsius ægri fuissent, cum contemptu etiam
nobilissimæ artis, potissimum autem illuc respiciet, quid
conditio ægrotum ferat, quid mores postulent, & quid
morbi essentiae conveniat. Sunt enim alij morbi pericu-
losiores malignitate sua, alij diuturnitate tædiosi: alij
curatu magis jucundi &c.

V.

CVi Medico honor curæ est, cautum se gerat in hoc negotio, neque facile solum ab ægro exigat, quia grati spontè dant, ingrati verò ne coacti quidem, est enim longè satiùs, ut asserit *Hippoc.* à morbo servatis in-
gratitudinem exprobare, quàm malè habentes emun-
gere, aut miseros sine ope relinquere. Nullus enim Medicorum est, qui non experiatur multos etiam gra-
tos: subinde autem horridam illam, terribilèmq; fa-
ciem, si præmia laboris poscat, vel ægros, qui vano
verborum sacculo, & turgidis promissionum, gratiæq;
ampullis medicum dimittunt: hinc verborum obli-
tissimi *Balthas. Zahni* tractatum de mendacijs
capite vel paragrapho adaugent, quasi Jure quodam di-
vino vel naturali obstrictus teneretur Medicus, ut lar-
gos illos non in unum sed complures studiorum annos,
in libros cariores, in peregrinationes quoque impensos
sumptus, in gratiosi tantum aspectus spem, aut vanæ pro-
missionis expectationem summo privatæ rei cum dam-
no impenderit, & tandem id lucri habeat, ut miserrimum
servorum servum se exhibeat.

VI.

Non decet Medicum esse mercenarium, sed nobilem
& ingenuum, ut ejus liberalitatem & promptitudi-
nem studiorum, officiorumq; ægri magis experiantur,
quàm de collatis in illum beneficijs aut larga benefi-
centia eidem exhibita gloriari possint. Sublimior, &
supranaturalis medentis debet esse intentio ac spes æter-
næ Mercedis ex obsequio exinde Deo præstito. Stoli-
dus enim jure meritò haberetur ille Medicus, qui in
morbis præcipuè malignis sub vili forsitan uno vel altro
imperiali totâ die venalem circumferret animam: qui
dum per annum: sæpè etiam complures plurima præ-
stitit officia, vel nihil, aut vix & ne vix quidem impe-
rialium

rialium aliquot munusculum ex rejectæ non raro monetæ quisquilijs accipit, qui pro exiguo subinde salario tot aëris exeretorumque corruptelas, tot Itinerum pericula, tot æstus, tot algores, nimbos, nives, inundationes, tot ægrorum visitationes in varias partes distributorum aut longa locorum intercapedine distitorum, tot prandiorum interruptiones, tot juges vigiliæ, somni interruptiones, vel maturas ad gallicinium expergesctiones, tot sollicitudines & cûtas sustineret, nisi perenne quoddam officio suo ritè functis superesset præmium,

VII.

IN accipiendos nostro Medicus eam moderationem observare potest quam *Severus & Antoninus* Imperatores prudentibus & advocatis ex publico, ut moris olim erat, salariatis in acceptandis xenijs & Donativis à clientibus præscripserunt. *neque omnia, neque semper, neque ab omnibus.* nam valdè inhumanum est à nemine accipere, passim vilissimum, omnia avarissimum. Præcipuè autem pauperibus gratis succurre studeat. non enim lucri, sed sanitatis & charitatis causâ medendum: immo lucrum tunc maximum esse credendum est, si lucrum negligatur in tempore, quod enim ad superos transit, nos ne sentientes quidem divites reddit & locupletes: hinc placet, quod summo cum laudis & honoris titulo de Hieronymo Fabricio ab Aquapendente refert *Polyhistor Rhod.* in elogijs virorum Illustrium, laudatum Medicum constantissimè omne oblatum munus recusasse, seque eodem planè animo erga pauperes quo erga divites se exhibuisse: id verò eo ipso effecisse eum, ut tot muneribus aureis alijsque pretiosis & rarioribus ornatus fuisset, ut amplum satis cubiculum ijs exornare potuerit, quibus inibi omnibus benè dispositis hanc foribus addidit inscriptionem

Lucri neglecti lucrum.

C A P U T II.

D E

Officio Medici in specie & primo quidem in affectibus requiring Venasectionem,

§. I.

Quibus in morbis Medici officium sit secare venam?

I.



Venasectio cum sanguinis plenitudinem ad mediocritatem reducat, corpus gravi onere liberet, illudque calorem nativum liberius venando, arctioresque vias & meatus referando alacrius & expeditius reddat: ejus etiam orgasmum & effervescentiam sistat: humores ipsi permixtos per effervescentiam, conflagrationem & adustionem corruptos vel omnino in putredinem degenerantes evacuet, ultionemque putredinem arceat, sanguinem ventilando, circulationemque liberiores reddendo: præterea sanguinem ex vasis p. n. elabentem vel ferociori impetu in partem aliquam irruentem vel potius in parte quadam stagnantem revellat, derivet, eum promptius ad partem ab affecta distantiorē moveat, stagnationis incrementum inhibeat, sanguinemque pristino motui & circulationi restituat, clarè elucescit, eam indicari in morbis excitatis à vitio sanguinis vel *in quanto, vel in qualitate, vel in motu.*

II.

His præsuppositis officium Medici erit, eam ceu primum maxime necessarium & utilissimum remedium administrare in omnibus inflammationibus, tam internis ut *Phrenitide, angina, ophthalmia, pleuritide, peripneumonia, Hepatitide, inflammationibus Ventriculi, Intestinorum, Mesenter. lien. ren. Vesic. uteri &c.* quam etiam externis: neque sanguis tantum mittendus ratione præsentis, sed etiam ratione futuræ inflammationis præcavendæ ut in *fracturâ, luxatione, contusione magna, Vulneribus majoribus, ictu, casu, doloribus* cujuscunque Partis *Sebementioribus*, in quibus *Galen.* se nulum majus invenisse remedium fateretur, quam venæsectionem usque ad animi deliquium administratam, nisi viribus jam collapsis & debilitatis.

III.

Venæsectionem quoque administrari curabit in *febris continuis*, ubi nimius urget, vel metuitur æstus, aut nimia turgescencia, vel imperus sanguinis ad caput, pulmones vel alia membra, præsentibus præsertim coindicantibus, cum depletis hæc ratione vasis, laxatæque quasi sanguinis massa via sternatur Diaphoreticis, purgantibus, aliisque præcipitantibus in statu morbi exhibendis. In *Intermittentibus* præsertim sub hoc climate non adeo necessariam judicabit, nisi adsit plethora, vel urinæ rubræ, crassæ, ingens cephalalgia, vel metuarur futura febris continua vel inflammatio alicujus visceris.

IV.

In febribus *malignis* quam cautissime procedet Medicus observando præcipue statum sanguinis febricitantis, an ad dissolutionem, orgasmum & nimiam ebullitionem inclinet, an verò ad coagulum, lentorem ac majorem malignitatem: in posteriori casu parce adhibenda, vel eadem omnino supersedendum præsertim

D

etiam

etiam , si ab experientia pluribus nocuisse quàm pro-
fuisse constiterit : in priori verò , ubi malignitas mi-
rior cum febre ardente vehementiori juncta in subjecto
præsertim juvenili vel Plethorico , & si Visceris inflam-
matio adesse vel imminere videatur , confidentiùs & lar-
giùs administrabit.

V.

Apparentibus *Petechiis* , *bubonibus* vel *Parotidibus*
intermittet Medicus Venæsectionem , si ex hisce
evacuationibus natura potentior reddita sit , ac victri-
cis naturæ signa deprehendantur , ut pulsus æqualitas ,
vehementia , dilatatio plenior , febris ac symptomatum
remissio cum veris coctionis signis : cautè tamen & par-
ciùs administrabit , si erumpant symptomaticè ex in-
genti sanguinis ebullitione & humorum malignorum ac
putrescentium fervore , admotis paulò post v. s. cucur-
bitulis , cum levatâ sic subinde natutâ post talem v. s.
copiosos sudores , eosque criticos erumpere observemus.
Idem ferè observabit Medicus in *Varriolis* abstinendo à
v. s. eisdem erumpentibus , si eruptio fiat per ebullitio-
nem *depurativam* , & ex eorum eruptione febris & sym-
ptomata remittant : administrando et contra , si sit eru-
ptio perebullitionem *corruptivam* cum febre intensiori ,
anxietate , difficultate spirandi , urina rubra , crassa alijs-
que gravioribus symptomatibus ac minor etiam adsit
malignitas. Ante eorum eruptionem Medicus eam
administrabit , si sanguis nimium ferveat , ebulliat
copiâ turgescat , cum impetu caput petat , immincant
inflammationes viscerum , adsint deliria &c. nam hæm-
morrhagia narium in principio copiosa morbum
imminuit , ac natura oneris parte levata reliquum
faciliùs expellit , & vincit.

VI.

Medicus v. s. quoque instituet in omni fluxu & eva-
cuatione sanguinis copiosiori , ut *hammorrhagia*
narium ,

*parium, vulnere, Hamophrysi, vomitu sanguinis, in
 Cruento, Dysenteria nimium cruenta, immoderato
 fluxu mensium, Hamorrhoidum &c. viribus nondum
 extreme debilitatis maxime etiam si oriantur ex copia
 & orgasmo sanguinis. Idem faciet in affectibus ex con-
 sueta sanguinis suppressione exortis ut in suppressione
 mensium, Hamorrhoidum &c. nisi affectus jam sint om-
 nino inveterati*

VII.

Sanguinem præterea mittet in *Cattarrhis* ac *defluxio-
 nibus calidioribus* sero cum cruoris massa bulliente
 & turgescente affectibus *Rheumaticis, Arthritide uni-
 versali, mania, Melancholia, apoplexia sanguinea*, id
 est, à stagnatione sanguinis circa vasa capitis producta
 cum faciei rubore & venarum turgentia, quæ nullo alio
 remedio citius curatur, quam per v. s. in ipso curatio-
 nis vestibulo statim institutam. Item in *Palpitatione*
 cordis, in qua *Galen. s. de loc. affect. c. 2.* fatetur, se
 nunquam inutiliter in hoc affectu venam secasse. In *Dy-
 spnea*, quæ fit sine stertore, & uno verbo in omnibus
 alijs affectibus, qui vel à sanguinis copia, vel ejusdem
 vitiosâ qualitate, vel præpostero ejus motu oriuntur;
 sicuti e contrario nullo horum urgente omittitur ut in
Phtysi, hectica, paralyti, ascite, tympanitide &c.

VIII.

Ultimò tandem pro cura prophylactica venæ sectio-
 nem suadebit Medicus semel vel bis in anno ad-
 ministrandam, qui sanguine abundant, & quibus nec
 integrum, nec commodum est exactam servare diæ-
 tam & clinicam agere vitam, cum nulla alia suppetat
 ratio valetudinem suam tuendi & vitam in longam se-
 nectutem producendi, quam vel per exactissimam diæ-
 tæ rationem vel per purgationem, & v. s. semel vel bis
 in anno vere nempe & autumno institutam. Qui enim

Sobriè exactè haud vivunt, singulis diebus aliquid crudi humoris addunt, qui sensim & sensim adauctus ac putrescens lethales excitat affectus, ut adeo plures fere hæc de causa pereant.

S. II.

De Officio Medici in observandis coindicantibus & contraindicantibus venæsectionem.

I.

IN venæsectione præcipuè observabit Medicus permittentia vel prohibentia, cùm Thesaurus vitæ in sanguine sit reconditus, ac *Helmontio* teste vires vitales & sanguis sint correlativa, hinc oculus dexter præcipuè ad vires: sinister ad morbum dirigendus. Intelliguntur autem per vires! præcipuè vitales, quæ sunt debiles, vel per *resolutionem* seu ab immodicâ evacuatione, seu à morbi diuturnitate vel doloris atrocitate, vel labore, inedia, vigilijs &c. & cognoscitur per pulsum continuum, parvum, languidum ac valde frequentem, vel per *suffocationem* seu *oppressionem* ab humorum copia, & cognoscitur ex pulsu vario, confuso & inæquali, & quòd nulla causa externa resolvens præcefferit. Sicuri igitur viribus non resolutis, sed suffocatis & oppressis convenit v. s. & quidem larga: ita viribus nonnihil imbecilibus mediocris: resolutis verò & planè prostratis nulla, cùm non deceat exhaustos spiritus vitales magis exhaustire.

II.

Cùm vires insignem à rebus secundùm naturam, præter naturam, & non naturalibus mutationem pariantur, de ijs etiam considerationem instituet Medicus & primò

primò quidem *de aetate*. Ex ætatum numero sanguinis missionem coindicat *aetate florens* inter pueritiam & extremam senectutem media, Pueris *Galen.* venæsectio- nem prohibet, eamque ante 14. annum non vult admi- nistrari, Medicus tamen in septennibus, octennibus, de- cennibus &c. detentis morbis acutis à sanguinis copia, ejusque effervescencia exortis tutam & necessariam iudi- cabit, præsertim si validiores venis amplis ac copia san- guinis præditi, In admodum natu parvis tutius est ab- stinere his in locis, quia vires in tam tenella ætate de- biles, fermenta viscerum in primo flore, unde facile ex- hauriuntur, habitus corporis tener ac facilè relolubilis, & perspirabilis, ac aliud est in Gallia, aliud in Italia, aliud in Germania Medicinam facere.

III.

IN senibus idem *Galen.* post annum 60. venæsectionem prohibet quia senes frigidi, sicci, debiles & ob sangui- nis ac spirituum penuriam eius noxam vehementer sen- tiunt. Interim tamen eam admittet Medicus morbo acuto id exigente, ac validioribus viribus existentibus, quæ non semper dependent ex numero annorum, sed ex musculofo, & benè habito corpore cum pulsu magno & venis amplis, cavendo tamen ne decipiatur Medicus inflatis in senibus venis, cum sæpè à flatibus oriri possit talis venarum distensio. Sicuti autem permittitur v. s. morbis acutis eam exigentibus, ita eadem in senibus li- mitatur, ut parciore fiat eiusdem evacuatio.

IV.

Mulier molliore habitu & frigidiori temperie prædita v. s. minùs tolerat, quàm Vir. In gravidis fetus in utero etiam non impedit v. s. urgentibus præsertim morbis acutis vel aliis abortum minitantibus, eam ta- men moderatur ratione quantitatis. Ex *Hippoc.* enim *s. aph. 31. Mulier utero gerens venæsectiâ abortit* (intellige venæsectionem largiorem & antiquis ad libras consue-

tam, ut fœtui alimentum subtrahatur) sicuti autem urgentibus morbis acutis venæsectio in gravidis permittitur, & teste experientiâ innoxie administratur præcipue à primo mense usque ad 5. tum: cautiùs verò medijs & postremis, & quidem in partibus superioribus ut medianâ vel salvatella, ita eam pro præcavendo abortu circa medium gestationis tempus vel ultimis temporibus pro facilitando partu non temere & ex consuetudine tantum, sed consideratis probè indicantibus & prohibentibus administrandam curet Medicus nempe in plethoricis tantum & copiosos alias menses habentibus, ubi abortûs periculum imminet à copia sanguinis fœtum obruente & suffocante, quo in casu præsentissimum est remedium v. s. sæpiùs etiam quandoque repetita, hinc etiam accidentia gravidis supervenientia, ut inappetentia, vomitus &c. cum ex sanguine retento, impuro & cacchymo (melioris fœtui in alimoniam cedente) oriantur, à venæsectione sublevantur: immò in totum auferuntur, si usque ad solutionem symptomatum singulis mensibus iteretur, cum e contra à purgatione magis exacerbentur.

V.

Quoad temperamentum v. s. magis coindicat sanguineum minus biliosum; omnium minimè Melancholicum & Pituitosum; quod ad habitum corporis cum magis coindicat carnosus, venisque latis præditus: sicuti e contra difficulter v. s. sustinet præpinguis & obesus, uti & habitus omnino raræ & gracilis naturæ cum venarum exilitate. Gracilitas enim corporis cum venarum latitudine magis permittere solet v. s. Quo ad anni tempus, tam magis coindicat verum: hinc autumnale, minus hyemale, ac omnium minimè æstivum ac canicularare. Quo ad regiones, largiorem v. s. tolerat temperata, hinc calida & sicca minimè autem frigidior hinc in Germania cautiùs, quàm in Italia, Gallia,

Gallia, Hispania &c. venæsecanda, quæ copiosiori homines etiam apparenter robustos in animi deliquium cachexiam hydropem vel alios morbos incidere observamus.

VI.

Quoad *consuetudinem* alacrius & leviùs venæsectionem perferunt *assueti* quàm non assueti & hæmophobi. Licet autem non tanta sit vis consuetudinis, ut semel detractus sanguis necessariò dein singulis annis subtrahi debeat: præsertim si altero anno non adsit idem indicans, ac causa venæsectionis sublata sit, tamen ejusdem multa habenda ratio, cum experientia constet, v. s. assuetos statis vicibus in vena pungi solita titillationem sentire naturâ quasi ad solitas evacuationes mōnente. Quoad *victum* magis evacuandi utentes eodem *pleniori* & liberaliori: parciùs *frugaliter* victitantes. Quoad animi Pathemata venæsectionem impediunt *ira*, *tristitia*, *timor*, quo etiam reducuntur *vigilia* ac nimius *venereorum* usus: sicuti econtra eam indicat *terror* subitaneus pro suffocatione cordis ex cruoris stagnatione impedienda.

VII.

Evacuaciones tempore v. s. coincidentes, si sint *sanguinis*, & accedant pro quantitate causæ, ut sint veluti criticæ *perfectæ*, pibil innovandum teste Hippoc. 1. aph. 20. si *dimminutæ*, adjuvandæ & v. s. administranda, evacuando tantum, quantum conjunctis evacuationibus causa morifica requirit. Si nimix, priùs sistendæ, in quem finem etiam locum habere posset v. s. revulsoria. Si sint evacuationes *aliorum humorum* seu per *alvum*, vel *vomitum*, vel *habitum corporis*, vel *abscessum* &c. eodem ferè modo procedendum & criticæ perfectæ naturæ relinquendæ: dimminutæ per loca conferentia adjuvandæ: hinc pro exigente necessitate vena secanda.

S. III.

De Officio Medici in considerando loco, & quantitate venæsectionis.

I.

Locus venæsectionis administrandæ specificatur tum ab affectu exigente vel revulsionem vel derivationem vel evacuationem tum à situ partis affectæ huius vel illius venæ apertionem requirentis. *Revulsio*, quæ est sanguinis in quadam parte stagnantis in contraria vel opposita evacuatio, si sit *universalis* contrarietatem observat respectu totius corporis, & in eo contrarios terminos respicit, vel à capite ad pedes, vel à dextris ad sinistram & vicissim: ita tamen, ut non simpliciter pars distantissima requiratur, sed attendenda origo fluxionis, tum valorum communio cum parte affecta. Si *particularis & localis* in uno membro contrarios terminos respicit, & quidem vel à parte posteriore ad anteriorem, vel ab interna ad externam & vicissim, licet hæc potius ad derivationem referenda, nec facile in principio corpore pleno instituenda. Sicuti autem revulsio sanguinem stagnantem in contraria distantiori evacuat, dum reliquus sanguis promptius ad venam apertam fluit, & imminuta ejus quantitate sanguis stagnans à vicinis vasis depletis resorbetur ac motui circulari restituitur: ita derivatio in proximiori, & evacuatio ex ipsa parte affecta evacuat.

II.

Circa venarum electionem stante circulari sanguinis motu non amplius supersticiosus sit Medicus. Nulla enim hic ordinis prærogativa specialis, neque ulla vena datur, cuius sectio specialiter medeatur determi-

negal nataz alicui parti vel morbo. Communiter in praxi *varices* pro evacuatione in febribus secatur mediana, die Mea-
biano

dian. Aber utpotè tutissima, cui arteria non subiacer, vel *Basilica die Leber. Aber* / cui tamen arteria subiacat. *Cephalica Brachij die Haupt. Aber auff den Arm* ramus ceteris exilioceſt, minùsque in praxi observabilis interim una vel altera non apparente altera magis conspicua aperienda, cùm omnes hæ venæ æquales ſint rivuli ex eodem flumine sanguinem haurientes : eadem Mediana vel basilica evacuationis causa ſecatur in affectibus omnium illarum partium, quæ ſunt ſitæ inter claviculas & renes, ut Cordis, pulmonum, Epatis, lienis, ventriculi, renum &c. uti etiam revulſionis gratia in omnibus affectibus partium inferiorum, ac etiam ſuperiorum ſupra claviculas ut Colli, faciei, capitis &c.

III.

AN *dextra* vel *ſiniſtra* ſecanda, deſumitur ex habitatione vel revulſionis, vel derivationis vel evacuationis, ſic v. g. in pleuritide dexteri lateris, ut vera fiat revulſio, ſi Medicus in principio vocetur, & adſit inſignis plethora in ſiniſtro latere utpotè parte oppoſita vena ſecanda. Secus & ordinariè per derivationem potiùs ex brachio partis affectæ, unde ſtatim inſigne doloris emergit levamen. Evacuationis causa dextra magis aperiiri ſolet, niſi in affectibus lienis, ubi ſiniſtra præfertur, ut ſervetur rectitudo & vaſorum communio. In venæſectione præſervativa verno tempore dextri : autumnio ſiniſtri brachii vena tundi ſolet, non autem neceſſario debet.

IV.

Vena *cephalica manûs die Haupt. Aber auff der Hand* & *Salvatella die Salvatell* incidi ſolent, ſi vel in brachio nulla vena ſit conspicua, quæ tundi poſſit, vel virium adſit minus robur, cùm tardiùs, & minori cum debilitate evacuent, aut majus immincat pericùlum ex v. ſ. largiori ut in gravidio. Apertio Salvatellæ in febre

D 5

quæ

quartana pluribus experimentis laudata solido caret fundamento , & nulla ratione fulciri potest. *Vena frontis* die *Gestirn=Ader* derivationis gratiâ secari solet in affectibus capitis ut *Phrenitide*, *mania*, *dolore capitis*, *ophthalmia* &c. *Venæ sublinguales* seu *ranina* die *Aderen vnter der Zungen* / ejusdem causæ gratia aperiuntur , præsertim si turgidæ sunt , in *dolore capitis*, *prunella* seu *inflammatione* & *ardore linguae* , in qua maturè aperiendæ , item in *angina* , in qua etiam , ubi febris haud adeo magna , nec corpus plethoricum , vel solæ apertæ præcauent faucium angustiam , dum anginae sentitur principium.

V.

Vena sub genu utriusque cruris die *Brand=Ader* secari solet in pedibus ulceratis. *Saphena* die *Rosen Ader* in suppressione mensium , & exinde oriundis affectibus , licet in plethoricis & suppressione antiquiori plures prius ex brachio : hinc ex pede mittant medici. *Ischiatica* die *Sticht=Ader* in coxendicum dolore. *Cephalica pedis* ad pollicem die *Haupt=Ader* auff dem Fuß / vel quæ est *ad minimum pedis digitum*, die *Viertel=Ader* / in affectibus capitis pro revulsione , in febribus quoque continuis , si adsit æstus & dolor lumborum cum urinis rubris crassis , vel materia caput petat cum cephalalgia , vigilijs , imminentibus delirijs , quo in casu post unam vel alteram Phlebotomiam in brachio administratam hæc vena pedis secanda , Convenit etiam derivationis gratia in affectibus renum ac partium infra eos existentium ut *Vesicæ*, *uteri* &c. interim quod de venis Brachij , hoc etiam de venis pedis dicendum , parum nempe interesse vi sanguinis circulationis , quæcunque tandem tangatur , cum omnes sint rami unius trunci , licet Medicus subinde accommodare se debeat vulgari praxi.

VI.

VI.

Quantitas emittendi sanguinis desumitur ex morbi magnitudine ac virium robore ; tantumque evacuum , quantum morbus exigit , & vires tolerant. Ratione Magnitudinis morbi *Galen.* in febribus ardentissimis , maximis Phlegmonibus , & doloribus vehementissimis sanguinem ad animi deliquium mittendum esse suadet ; modo vires sint validæ , quod tamen hoc tempore obsoletum ; ejusque loco repetita commendatur v. s. præsertim in paucitate sanguinis , debilitate corporis , & ubi magis revellendum , abstinendum etiam à v. s. *Neroniana* dicta , seu apertione duarum vel trium venarum simul & semel eodem tempore.

VII.

In *Inflammationibus Hippoc.* sanguinem ad coloris mutationem usque mittendum esse jubet , si in prima vel secunda v. s. appareat crudus , pituitosus & æquosus , eadem continuanda usque dum appareat rubicundus & vicissim , cujus præcepti observatio licet in praxi sæpè optimè succedat , pertinaciter tamen coloris mutatio expectanda non est , cum vires priùs deficere possent. Nonnulli sanguinis emittendi quantitatem ex labascente fluxionis impetu ac pulsûs mutatione colligunt , quæ tamen non semper expectanda , cum in robustioribus non nisi plurimâ sanguinis jacturâ factâ succedant.

VIII.

Tutò procedet Medicus in quantitate sanguinis emittendi detrahendi , si largiorem adhibeat , vel eam pronecessitate repetat , ubi major sanguinis effervescencia , major sanguinis copia , ætas florens , temperamentum sanguineum , venæ latæ & amplæ , regio ac tempus anni calidius ; parcius e contra , & præsertim in Germania

nia licentiosa illa & prodiga venarum apertio, nonnisi urgente admodum indicatione instituenda, idque saltem permittentibus, nec contraindicantibus viribus, cum sanguis sit vitæ thesaurus, & copiosior v. s. spiritus exhauriat, calorem innatum dissipet, viscera languefaciat, cruditatesque generet, hinc testatur experientia, aliquos ex phlebotomia copiosa in morbos incidisse longos, nonnullos in reliquum vitæ tempus frigidos aut decoloratos ac cachecticos redditos fuisse: alios incidisse in morbos exitiales ut hydropem, dyspnæam, Hepatis ac Ventriculi imbecillitatem vel tremorem, paralysem, apoplexiam. Tutissimum igitur est a Mediocritate non recedere: & in ventilatoria v. s. cum Luffæ & Löffl ad Unc. 4. 5. & in evacuatoria ad Unc. 6. 8. 9. &c. pro una vice emittere.

§. IV.

De Officio Medici in considerando tempore.
v. s.

I.

Cum tempus v. s. aliud sit *commoditatis*: aliud *necessitatis*, vel aliud ratione *therapeutica*: aliud ratione *prophylactica*, ambo quàm maximè consideranda. Ratione curæ therapeuticæ urgente necessitate ut in angina, pleuritide vehementi, contusione magna, casu, hæmorrhagia enormi, apoplexia, Catarrho suffocativo &c. nulla habenda ratio diei, horæ & temporis, sed quantocyus administranda etiam neglecto prævio clystere vel laxativo, cum hi morbi ita sint comparati, ut nisi ijs v. s. subito occurratur, æger in præsentaneum conjiciatur vitæ periculum.

II.

Eodem modo acceleranda v. s. in febribus continuis, ac ab initio statim, vel secunda aut tertia die sanguis detrahendus est, modo ventriculus vel primæ viæ nullâ humoris corruptelâ vel cruditate refertæ sint, quo in casu clyster vel laxativum præmittendum. Nam 2. aph. 29. *incipientibus morbis, si quid movendum videatur: move, cum vero consistunt ac vigent, quiescere melius est.* Principio neglecto etiam in augmento venam secare licet, modo absit malignitas, viresque non sint resolutæ, nec proximè immineat crisis. In febribus *intermittentibus* ut v. g. tertiana etiam post tertium: immò quartum Paroxysmum & ultra commodè ac tutò venam secabit Medicus, quia in his febribus interdum cacochymia multa & sanguis paucus: interdum sanguis à principio copiosus, & cacochymia in massa sanguinea cum urina rubra crassa, turbida: interdum e-
 tra, unde pro horum varietate vena nunc citiùs, nunc rardiùs secanda: nunc prorsus v. s. intermittenda.

III.

In febribus continuis legitimum tempus v. s. est remissio febris, si autem nulla sit, ut in febribus synochis, eligenda hora matutina, quia tunc omnia corpora magis vegeta. In Intermittentibus tempore apyrexiae vena secanda. Si v. s. sit reiteranda, & quidem evacuationis causa præcipuè in acutis & morbis universalibus, eadem die fiat. In his enim subito corpus in alium statum transferendum, ac sæpè evenit, ut morbus mox principium percurrat, ut postmodum v. s. ambigua fiat: si revulsionis causa, diversis diebus repetenda est, ut natura contrario motui diversis vicibus & intervallo interjecto assuescat magis. Si in uno eodemque affectu & purgatione, & v. s. opus sit, præstat v. s. purgationi (intelligitur autem radicali: non lenitiva) præmittere.

IV.

Ratione curæ prophylacticæ seu in v. s. electa: in quâ commodum tempus expectare possumus inter anni tempora ob temperatam ejus qualitatem opportunissimum est *vernum* teste *Hippoc. 7. aph. 53*, ubi ajr. *Quibus sanguinem de venis detrahere convenit, is vere secunda est vena.* Hinc *autumnale* quod etiam aliquid de calore remittit. Eligenda dies serena, minimeque turbida. Horæ etiam antepomeridianæ aptissimæ, quia tunc temporis peracta concoctio, & solis ortus animam reddit hilariorem. Eligenda dies, in quibus non occurrit violenta quædam constellatio, aut ipsum novilunium vel plenilunium, aut quadraturarum aliqua. Quoad lunam in augmento ejus instituta efficacior, & commodior est, quam in ejusdem decremento, quia natura pristina tunc temporis vires citius recolligit.

V.

Vulgò etiam attenditur ad signa *Zodiaci*, ex quibus pro administranda v. s. faventia ponunt *arietem*, *libram*, *arcitem* & *amphoram* minus faventia *taurum*, *gemminos*, *leonem*, *virginem* & *caprum* medio modo se habentia *cancrum*, *scorpionem* & *pisces*, sed multis præstantibus viris hæc signa ne minimum quidem valent ad legitimum Phlebotomiæ usum, cum jam aliquot viginti gradus à pristina sua statione recesserint, in quo olim venæsectionis usui fuerunt destinata. Sic pariter partitio corporis humani in diversa *Zodiaci* signa, dum *arietem* capiti, *taurum* collo &c. adscribunt absurda est, & Phantastica, hinc metus in v. s. in dictis signis contrarijs celebrata de nihilo est, cum omnia sint contra rationem & experientiam,

VI.

Non approbet Medicus tabellam hanc infra appositam phlebotomicam *den Juden=Calender* mendacissimam

cissimam & impostoriam principio stolidissimo numerorum nempe delirio & chymericæ calculationi innixam, ac plurium penè manibus, & multorum calculis oberrantem. Sicuti autem Medicus tabellæ hujus fautoribus fungum pro cerebro, ac peponem pro corde relinquat, ita subinde connivere potest, ne ob validam nonnullorum impressionem solus metus idem efficiat, quod in Morione illo aulico, qui per jocum à lictore sic instituto virga percussus gladium tamen esse ratus nihilominus exanimatus cecidit.

TABULA GENERALIS

Secundum quam v. s. pro recepta superstitiosa vulgi consuetudine instituitur, ubi prima dies à novilunio numeranda, ita tamen, ut si novilunium horis ante meridianis incidat, illa dies pro prima accipiatur: si autem horis pomeridianis, insequens pro prima numeretur.

Dies	Dies	Dies
1 }	11 bona alijs mala	21 }
2	12 bona	22
3 } mala	13) mala	23 } bona
4	14) mala	24 }
5 }	15 bona	25
6 bona	16 mala	26 }
7 }	17 bona alijs mala	27 extremè mala
8 } mala	18 bona	28 bona
9 }	19 mala	29 mala
10 }	20	30 mala

§. V.

S. V.

De Officio Medici in, ante, & post v. s.

I.

VT venæsectio ritè instituaturs, quædam ante, quædam in, & quædam post eam consideranda. præparatio eam præcedens consistit in hoc, ut 1. præcedentibus aliquot diebus vires crapula aut forti exercitatione non opprimantur. 2. Primarum Viarum præcedat evacuatio morbo inducias ferente, vel si ventriculus ciborum ingluvie, aut crapula obrurus vel alvina regio excrementis onusta. 3. Animus patientis excitetur, ne per mœrorem vel consternationem motus sanguinis impediatur. 4. Pateriens reficiatur, cui præsertim eximius oris ventriculi sensus per succum acidiusculum limon. Granat. vel ovum recens sorbile hausto desuper vino generoso, vel jusculum expeptum non tamen longè à venæsectione assumptum, 5. Moderata fiat deambulatio & commotio membri, in quo v. s. instituitur. Sic præsertim altiores & profundiores habentes venas brachium prius commoveant, frictions in eo instituant, vel grave quoddam pondus manu gestent.

II.

PRæterea 6. Si in manibus vel pedibus instituaturs Phlébotomia partes hæ in aquam calidam imponendæ, ut probè incalescant, rubescant, & venæ magis conspicuæ evadant. 7. Venæ brachij ordinariè anteprandium nisi aliud suadeat necessitas: sublinguales & pedum 3. vel 4. horis post prandium secari solent. 8. Non fiat v. s. statim à somno: sed hora ante pomeridiana eligenda nona Nempe vel 10. ma &c. 9. Situs ægri supinus sit sedens vel decumbens in valde languidis vel debilibus, aut nimium mericulosis, vel animi deliquio obnoxijis.

IN ipsa v. s. 1. pars incidenda prona collocanda. 2. Eadem pars liganda tribus supra locum incidendum digitis (in sublingualibus ac vena frontis collum moderate constringendum) ligaturâ nunc leviori venâ satis apparente, nunc strictiori in casu contrario, nunc dupla, ita ut una etiam infra locum incidendum instituaturs vena existente tremula ac inconstanti. 3. Vena oculis haud apparens mollitie & digitorum attractu præterfluentem sanguinem sentiente exploranda, notanda ac modestè ferienda, pertransversum in venis brachij & sublingualibus: per rectitudinem in vena frontis & reliquis. 4. Major fiat apertura, ubi sanguis copiosior & crassior evacuanus ut in Melancholicis & pituitosis: minor, ubi subtilior, tenuior & magis biliosus. Instrumentum Phlebotomicum venarum varietati, situi & foramini nunc ampliori, nunc minus amplo faciendo respondeat. Tutissimè aperitur vena scalpello mit der *Tanzett* hinc mit der *Gluedten* oder *Schnapperlein*.

IV.

PRæterea 5. antequam vena aperiatur, cavendum tætu præcipuè ante ligaturam explorando, ne vel arteria sub basilica latens seceretur, & sanguis arteriosus, tenuis, rubicundus saltatim eggreuiatur cum maxima virium debilitate ac metu aneurismatis vel nervus sub mediana, vel tendo sub utrisque, unde dolor ingens, tumor, stupor, resolutio, convulsio &c. 6. Venâ apertâ superius vinculum laxandum, sanguinis segnior fluxus pugno arctius adducto vel compresso halitu aut excitatâ tussi vel screatu promovendus. 7. Sanguis viribus constantibus una vice: eis non constantibus iteratis vicibus oppresso interdum venarum osculo emitendus. 8. Si sanguis crassus, niger, putridus effluat, fluxus minus impediendus & sistendus quàm si subtilior, tenuior & colore magis rubicundus virium tamen semper habitâ ratione.

V.

Insuper. 9. dum sanguis emittitur , 3. saltem pelvis
 culis stanneis , terreis vel vitreis excipiendus , repo-
 nendusque loco , quo nec ventus , nec fumus , nec pulvis
 aut sol eum afficere possit. 10. Imminens quando-
 que animi deliquium ex timore vel majori evacuatione
 oriundum & cognoscibile ex remissione sanguinis fluxu ,
 pallido faciei colore , oscitatione , oculorum vertigine ,
 aurium tinnitu , pulsus mutatione , singultu , nausea &c.
 tum prohibendum vena digito subinde obturata , sal ori
 indendo , labia eodem fricando , vel aquam frigidam ore
 gestando , camq; sæpius expuendo , tum præsens removen-
 dum supino decubitu , ac injecto ex insperato in faciem
 aqua frigida , vel acet. ros. suaveolentibus nari adhibi-
 tis , exhibitione jusculi , vel vin. generos. cum confect.
 alk. vel julep. vit. parati ex 2. vitell. ov. cum unc. 6. vin.
 alb. & sacch. fin. unc. S. & 3. gutt. ol. dest. cinam. vel Co-
 chl. aqua cinam. buglos. vel cum vin. parat.

VI.

Si loco venæ casu aperiatur arteria , Illico foramen
 claudendum ac lamina saturni , vel numus argenteus
 inter 2. linteola apponatur cum forti ligatura , vel ap-
 plicetur Catapl. stegnot. Galen. ex *thur. alo. pil. lepor.*
cum album ov. hinc membrum diu extensum servandum
 ac in opposita parte pro revulsione vena secanda , si ner-
 vus vel tendo lædatur , mox *ol. destillat. therebint.* vel
ol. destill. cer. calidum vulnuscule instillandum vel ac-
 cipiendo ad unc. 1. *ol. dest. thereb. spirit. vin. drach. 1.*
& euphorb. dr. S. appposito desuper emplast. ex *thereb.*
cer. & modico Euphorb. si vena pertusa intumescat , appo-
 natur *ol. yrus. vel ruta oleo cocta* vel *vin. calid. cum sal.*
mixt.

VII.

Post sanguinem sufficienter emissum vinculum eno-
 dandum , manus dilatanda , brachium extendendum ,
 vul-

vulnus detergendum ac deligandum superimposito gossypio oleo tincto, si v. s. ex eodem vulnere ea die reitenda. Wann man die Ader noch sprengen soll / vel splenio vino madido, si vena magis coarctanda veletiam numo argenteo inter 2. linetola applicato, si sanguis difficulter sistatur, quo in casu etiam prodest *crepit. lup. vitriol. ust. gossyp. ust. lanug. cydon &c.* Facta deligatione brachium in media figura detinendum, quiescendum, omnisque tam animi, quam corporis contentio vitanda. Vulgus post v. s. somnum tota die prohibet, tum ne foramen nondum coalitum in somno aperiatur, tum ne calor exiguus interiora petens in somno suffocetur, sed quia primum diligenti adstantium cura & probe facta deligatione præcaveri potest: posterius verò verum non sit, nisi forsitan immodica fuerit sanguinis evacuatio. aut timiditas accesserit, quæ animi deliquium inferre possit, ideo nihil obstat quin saltem post cibum vel paucis à v. s. horis somnus iniri possit.

VIII.

HOra una aut altera elapsa alimentum euclymum temperanter sumendum, ne coctio lædatur, & ansa novæ vitiosorum humorum saburræ administretur. Brachium eo die vehementi motu haud agitandum, vitetur aer intemperatus, moderentur animi Pathemata, animus sit hilaris, tranquillus, seponantur labores, & seria negotia, ac iudicium sanguinis pro conservatione ulteriori sanitatis non negligatur.



S. IV.

De Officio Medici in sanguine per v. s. emisso judicando.

I.

QUoad judicium de sanguine Imisso ferendum , officium Medici est considerare ejus colorem, consistentiam, ac serum. Optimus erit sanguis, qui benè fibrosus, æqualis ac unius substantiæ epatis parenchyma repræsentat, ruborem cum splendore floridum exhibens supernatante serosa materia in debita ac proportionata quantitate & qualitate.

II.

QUoad colorem, *ruber & floridus* pauca aqua superflus bonam valetudinem indicat. Interim in acutis sanguinem impensè coloratum morbi maligni signum esse plures asserunt, hinc etiam teste *Baglino* olim Romæ observatum, omnes ferè ab acutis morbis evasisse, quorum sanguis v. l. extractus crusta alba atque glutinosa præditus erat, econtra mortuos, quorum sanguis valdè rutilans erat cum superficie nimium rubicunda. *Ruber & spumofus*, nisi spuma per accidens ex defluxu sanguinis excitetur, copiam, fervorem, Orgasum ac ebullitionem sanguinis denotat. *Nigricans* vel maculis *nigris* spectabilis ejus per lentam Phlogosim adustionem ac humorem melancholicum, *albus* pituitam, & si simul *spumofus* multam ejus progeniem tussis, raucedines, & Catharrhos excitantem innuit. *Flavesces*, *Viridis* flavam aut reorridam bilem, *lividus*, & *caruleus* dolores circa lienem, ac humoris Melancholici, aliorumque peccantium abundantiam. *Variegatus* instar marmoris insignem humorum in M. S. confusionem putredini obnoxiam significat. Color *cinerens* extremam adustionem significat.

III.

III.

Quoad *consistentiam* sanguis , qui *lentè* effluit (quo nonnunquam etiam provenit , vel ob foramen non satis amplum , vel sanguinis copiam aut paucitatem , vel timorem , aut venas flatu turgidas) & picis instar digitis adhærescit , uti & fundo pelvicularum , ac celerrimè concrescit , concretusque difficulter finditur *crassior* est ac obstructions indicat. *Tenuior* e contra , qui tardius concrescit , faciliusque finditur , & ad Bacilli tactum diffluit ; hic imperfectam Hæmaphosim , viscerumque eidem inservientium debilitatem significat. Qui *Variiegatus* multum pelliculam duntaxat de se emittit tremulam & mobilem sub eâ continens substantiam fibris prorsus destitutam , vel minùs coherentem , ut attactus in partes diffuat , *putridus* est , ac sanguinis corruptelam denotat. Qui *crustâ* , *albâ* , *glutinosâ* & *viscida* & quandoq; *densa* ac *diaphana* ruptu & fissu difficili præditus est , *crudior* est denotans portiones fermentabiles in M. S. in statu cruditatis existentes , perfectamque coctionem nondum adeptas.

IV.

Quoad *serum* si illud *modicum* & colore *pallidum* conveniens est ac naturæ proportionatum. *Nimis copiosum* massâ sanguinis veluti Insulâ aqua circumdata eidem supernatante arguit , vel prægressum potum liberaliorem vel obstructionem aut imbecillitatem renum , vel viscera sanguificationi dicata infirma , vel insufficiens tem per urinas aut insensibilem transpirationem excretionem : *Paucissimum* aut *nullum* causas contrarias indicat. *Nimis flavescens* bilem vel salium lixivorum copiam arguit. *Ceruleum* & *lividum* l plenis affectuum comes. *Album* & *lacteum* vel alimentaintempestivè & præproperè antev. l. assumpta , & in chylum conversa , vel viscerum Hæmaphosi dicatorum , & sanguinis intemperiem ac debilitatem innuit. Sanguis *malè olens* licet

E 3

rarus

rarus sit, putredinis ac corruptionis index ac mortis prodromus. Probitas sanguinis in pedis vel manûs sectione in calidam effusi dignoscitur tum ex laudabili ejus colore, tum ex fibris sanguine, virgula conquassato apparentibus, & quidem inter se cohærentibus, neque tractu faciliè disrumpendis.

§. VII.

*De Officio Medici in præscribendis remedijs
post Judicium v. s. pro cura vernali
vel autumnali.*

I.

Sanguine probè considerato officium Medici erit, pro varia ejus constitutione curam prophylacticam instituere, & si humores pituitosi, biliosi, melancholici, putridi abundant, eos per epiciprasim evacuare per decocta, vel nodulos laxativos &c. si obstructions adsint, eas tollere per brodia alterantia, de obstructione. Si fervor bilis aut sanguinis, eum temperare per usum acidularum, aut seri lactis vel Brodiorum alteratorum, si debilitas viscerum sanguificantium, ea roborare, prout ex sequentibus magis apparebit Remediorum formulis.

Brodiū alterans. *R. herb. acetos. endiv. cichor. petrosel. cum tot. charesol. fl. Borrage. pimpinell. sanguisorb. anq. pl. M. S. species zur Kräuter-Brühe / darvon ein gute Hand-voll in einer Fleisch-Brühe zu kochen / alsdann durchzuseihen / vnd eintweder mit einem Limoni-Safft säurlich zu machen / oder folgendes Pulver darein zertreiben.*

R. pulv. epat. rub. vel chryst. tart. unc. S. subinde etiam addi potest aliquid de sal. absinth. vel alijs salibus digestivis. S. Pulver zur Kräuter-Brühe / darvon

von 3. gute Messer = Spiz voll darein zu thun. Con-
 tinuentur hæc brodia ad unc. vi. per 14. circiter dies.

Species. provino. R. Herb. recent. acetos. charefol. dra-
 cunc. hort. pimpin. sanguisorb. fl. Borrag. meliss. anq. pl.
 absinth. parum M. S. species oder frische Kräuter zum
 Wein / darvon 2. Hand voll in ein Maß- Krueg mit
 weissen Wein darein zu thnn / ein Zeit darinnen stehn
 lassen / vnd jederzeit den ersten Trunct den May hinc
 durch zu thun.

Nodus laxativus. R. fol. fenn. s. unc. S. agar.
 crud. incis. & conquass. rad. mechoac. crassè pulveris. an
 unc. S. z. z. incis drach. 1. S. herb. card. b. agrim. ce-
 terach. sumit. absint. fl. borrag. anth. an. p. 1. cort. cit.
 incis. drach. 1. S. M. incis. & contus. dentur ad nodul.
 ex sind. alb. S. Kräuter = Laxier = Sackl auff anderthald
 Maß weissen Wein / vnd ein halb Maß Brunnen = oder
 destillirt Eichhor = oder Boratsch = Wasser anzusetzen /
 darvon Morgends ein Tragele zu trincken / nachdeme
 man zuvor etlich Löfel voll Fleisch, Brühe oder Dotter =
 Suppen gemohmen.

Alius. R. rad. cichor. dr. ij. fanic. ennul. polyp. q. an.
 dr. ij. herb. absinth. rom. card. b. chamed. cent. min. adj-
 ant. ut an. p. 1. fol. fenn. s. unc. 1. S. Rhab. el. agar.
 tröch. an. dr. ij. Gial. dr. ij. passul. min. unc. 1. cinam.
 vel galang. min. dr. j. sem. anis scrup. iv. crem. tart. dr.
 ij. s. M. incis. & contus. ad saccul. ex sind. rnb. S. Kräu-
 ter. Laxier = Sackl / daran anderthald Maß weisser Wein
 vnd ein halb Maß Wasser siedheisser daran zu gieffen /
 vnd in einem warmen Orth 12. oder 24. Stund stehn
 zu lassen: Alsdan in ein Keller oder Gemölben zu thun /
 vnd täglich Morgends ein Tragele oder was minders
 darvon zu trincken.

Decoct. laxativum R. pulp. tamarind. unc. 1. Rhab.
 fol. fenn. s. an. dr. vj. passul. min. unc. iii. sem. fanic. con-
 tus dr. i. S. coq. in aq. font. lib. iv. ad lib. ii. Col. detur
 ad usum. S. Laxier = Trand das Blut zu reinigen / dar-
 von

Von Morgens ein Fraggel / oder des Tags zwey
 mahl etwas mehr als ein halbes Fraggel zu nehmen.

Pulvis diggestivo -- laxativus. *R. crem. tart. Vel pulv. epat. rub. scr. i. sal. absinth. gr. ℥j. scam. sulph. gr. ℥iij. x. xij. Sc. ol. dest. mac. gut. ij. M. f. pulv. dentur 4. dos.*
 S. Aufflesende Laxier-Pulverlein / darvon täglich
 oder ein Tag umb den anderen Morgens nüchter in
 einer Brühe / oder Glas Saur-Brunnen ein Glas
 schen darvon nachzutrinken eines zu nehmen.

Alius *R. fol. senn. f. tart. alb. an. unc. i. sem. anis. tharyoph. cinam. galang. an. dr. j. diagrid. dr. ij. M. f. pulv.*
 S. Blut-reinigendes Laxier-Pulver ein halb
 oder ganzes Quint schwer darvon zu Zeiten zu neh-
 men. potest etiam vino infundi & assumi.

Serum lactis. *R. ser. lact. cum succ. cit. Vel tamarind. Vel crem. tart. Vel acet. parat. depur. & clarif. unc. ℥j. ℥iij. x. lib. i. &c. essent. cit. q. f. pro grato odore. detur per 14. dies Vel 3. septim.*
 S. Sais-Zutten des Morgens nüchtern zu
 trincken / vnd ein Stund darauff spazieren zu gehen.

Serum lactis magis compositum. *R. rad. cichor. Scorz. herb. endiv. acetos. fumar. cuscut. cochlear. beca- bung. charesol. pimpin. sanguis. fl. Borrage. an. q. pl. M. S.*
 Species zur Kräuter-Sais-Zutten / darvon 1. oder 2.
 Hand voll in einem Trinckl Sais-Milch zu fieden /
 vnd mit einem Essig oder Limonis Saft zu rennen /
 vnd durchzuseihen.

Serum lactis Fonscae magnatibus familiare & gustu
 gratum. *R. Tamarind. unc. iij. aq. frag. (Vel alterius destillat. Vel aq. font. lib. ℥.) terantur in mort. lapid. ut nu- cles denudentur, & auferantur aquam sensim affunden- do: hinc R. lact. capri lib. ℥. ebull. tum affund. distutum tamarind. coque simul parum sine agitatione olla in vase terreo vitreaco, donec partes cascosas sequestrentur hinc re- frig. col. per lint. hinc depur. 2. album &c. ac ultimò fil- tretur per chart. aromatiz. ess. cit. q. f. ad grat. odor.*

C A P U T III.

D E

Officio Medici in affectibus re-
quirentibus arteriothomiam, cu-
curbitulas, scarificationem, hirudines,
Vesicatoria, & fonticulos.

S. I.

*De Officio Medici in adhibenda arteriotho-
mia, & cucurbitulis sine & cum scari-
ficatione.*

I.



Icet aliàs ex communi Practicorum
experientia assuetum tantum sit, aperire
venas, factum tamen, ut etiam aperi-
rentur *arteria*, sic *Galen.* eorum incisio-
nem commendat in capitis calidis affe-
ctibus ut v. g. in diuturnis capitis doloribus calidis, &
spirituosis ut cephalalgia, hemicrania, in calidis & acri-
bus oculorum defluxionibus ac ophtalmijs contuma-
cibus, in vertiginosis, phreniticis, in fluxionibus à tem-
poribus ad dentes, & à dentibus vicissim ad tempora,
præsertim si adsint dolores temporum fixi cum pulsu ar-
teriarum notabili.

II.

UT autem Medicus hoc in passu cautus sit, ac ritè suo
fungatur officio, cum res periculo non careat, tum
ob metum insignis hæmmorrhagiæ, tum ob difficilem
ratio-

ratione pulsus consolidationem , & aneurismatis super-
ventum , observabit. 1. *Arteriothomiam* nonnisi in
difficillimis , & inveteratis morbis , qui alijs non ce-
dunt auxilijs , esse exercendam , & nonnisi urgente ne-
cessitate , ac præmissis universalibus. 2. Arterias
tantum minores aperiendas esse , ut v.g. propè aures vel
in temporibus , cum in majoribus prædicta pericula
magis metuenda sint. 3. Eam non instituendam in
debilibus , quos præstat alijs auxilijs curare , quàm
partibus sanguine & spiritu privatis in certum pericu-
lum deducere. 4. Tantum ex secta arteria emitten-
dum sanguinis , quantum effluit , nisi sit nimium , hinc
vulnus consolidandum appposito Emplast. *ex alo. thur.*
sarcocoll. Bol. arm. pil. lepor. cum album. ov. Except. vel
terra vitriol. dulc. cum terr. sig. album. ov. except. 5.
Arteriothomiam inveteratos , aliòsque præternaturales
affectus citius curare quàm v. s. tum quia arteriæ om-
nem omnino distribuunt sanguinem , sicque natura om-
nem sarcinam per arterias expellit , & quidem multò
velocius , tum quia à flatulento & calido sanguine ar-
tetioso plurimi produciuntur , & foveantur morbi.

III.

Cucurbitula vel applicantur cum scarificatione incisâ
cute vel integræ sine scarificatione. Sine hac locum
habent 1. in nimio fluxu mensium infra mammas appo-
sitæ ex Hippoc. s. aph. 50. *mulieri si placet menstrua si-*
stere , cucurbitulam quàm maximam ad mammas appone.
2. Ad femur & crura pro ciendis mensibus , in quem
finem etiam frequentius scarificatæ simul , prosunt. 3.
Contra urinæ suppressionem renalem , & in calculo jam
in ureterem delapso ubi juxta ductum uterum appli-
catæ , & versus inguina tractæ calculum subindetrans-
ferunt , dolores leniunt . & urinæ fluxum
citant.

IV.

I V.

PRæterea 4. locum habent in Hæmorrhagia narium
 hypochondrijs applicatæ sed cautè, ne sequatur in-
 flammatio. Item supra pedes ex observat. *Forest.* usi-
 tata etiam admodum, & proficua in hoc casu ventola
 magna ad nucham applicata. 5. Valent ad dolorem
 stomachi, & intestinorum à flatibus oriundum, quo in
 casu, teste *Galen.* incantamenti instar subinde juvant.
 7. Ad motum ciendum stagnanti sanguini, ut dum in
 apoplexiâ futuræ coronali applicantur. Affigi solent
 aqua calida prius madidæ, & ad ignem candelæ cale-
 factæ præmissâ frictione partis per lintea calida.

V.

CVcurbitulæ cum scarificatione, cum sanguinem
 ex cute evacuent, eoque effuso alius è vasis majo-
 ribus in capillaria effundatur, hoc modo totum quoque
 corpus evacuant, sicque haud immeritò v. s. vicariæ
 appellantur, & applicari solent. 1. Vbi v. s. locum
 non habet, vel ratione virium ægri ut in pueris, gravi-
 dis, senibus aut morbo longinquo vel acuto fractis, cum
 non confertim sed paulatim & sensim evacuent, vel ra-
 tione lipothymix imminentis, vel ratione difficultatis
 secandi venas. 2. In partibus gangrænâ affectis pro
 humoribus impactis, & corruptis eliciendis. 3. In
 partibus acri fluxione tentatis. 4. Pro veneno a cane
 rabido, aut alijs animalibus venenatis immisso extra-
 hendo. 5. Pro mensibus ciendis. 6. Pro oculis flu-
 xione tentatis. 7. In febribus malignis petechialibus.

VI.

LOca frequentiora applicandarum cucurbitularum
 sunt in dorso regio interscapularis & lumbi. In
 brachio humero: in pedibus femori & suris affigi so-
 lent. Quantitas sanguinis extrahendi variat pro morbi
vehe-

vehementia, & causæ morbificæ ratione. Parva, & minima est ad unc. ij. vel iij. mediocris ad unc. iv. v. summa ad unc. x. xij. Ubi morbi magnitudo urget, applicandæ cucurbitulæ copiosiores & majores, & jam dum sanguine repletæ iterum atque iterum removendæ ac denuo post repetitas scarificationes imponendæ, & foramina altius infligenda: in minori affectu minores & paucæ cucurbitulæ sufficiunt; nec eas cum scarificatione repetere opus est.

VII.

Scarificatio nunc est superficialia, nunc profundior. Quando crassior ipsa cutis, sanguisque evacuandus profundius delitescit, perficitur phlebotomo seu scalpello parte prius fomentata aquâ tepidâ, aut propè fornacem calefacta admotis postmodum cucurbitulis vel solum calefactis, vel juxta Belgas cum flamma, quæ potentius quidem trahunt, sed majorem ægris causant timiditatem. Eadem peracta loca scarificata abluenda aquâ tepidâ, & plagulæ paucæ sevo obliniendæ.

VIII.

Sicuti scarificationem menstruatim ex consuetudine tantum institutam tam prodigaliter vitæ nostræ inestimabilem thesaurum, sanguinem nempe profundentem Medicus nullatenus approbet: ita moderatum ejus usum urgente præsertim necessitate minimè damnet, cum experientia testetur: multos provectæ ætatis homines sine ullo damno hoc præsidio genere usos fuisse, neq; verum est, ut vulgo dici solet, illum scil. qui semel scarificaverit, per totam vitam illud continuare necesse habere, nisi in vitæ periculum se præcipitare velit, cum experientia contrarium testetur, hinc etiam *Mab. in hist. de feb. petech.* testatur puerum 8. annorum crebrioribus ophthalmijs, & fluxionibus oculorum obnoxium suasu periti cujusdam Medici scarificationibus per singulos menses bis usum fuisse, easque ad 10. ætatis annum feliciter

liciter continuasse : cessantibus autem his affectibus abhinc cessasse etiam ab ipsarum usu absque ulla morborum invasione.

S. II.

De Officio Medici in precipienda applicatione Hirudinum.

I.

Hirudines seu sanguisuga (dieegel non secus , ac scarificationes capillaria pariter venarum , & arteriarum aperiunt vasa , sicque sanguinem evacuant , eas tamen in hoc antecellere videntur , quod paulatim & sensim evacuando minorem creent molestiam : plus insuper afferant emolumenti , cum hirudines sanguinis sint appetentes : cucurbitulae vero saepe loco sanguinis aquosos tantum , & serolos humores evacuent.

II.

Applicari solent hirudines , vel totius corporis evacuationi gratia , vel ob morborum membri alicuius privati. Quoad primum veteres praesertim in gravidis , pueris , senibus acuto morbo detentis venæsectionis usu contraindicato , applicabant eas ad venas majores ut medianam , basilicam &c. Quoad alterum hirudinibus usi fuerunt tanquam vero topico remedio , hinc praemissis universalibus imponebant has in omni arthritide supra locum affectum , coxae in doloribus Ischiaticis , in abscessibus , cutis fæditatibus , malignis tumoribus , vulneribus , moribus venenatis , item ad illas partes , ubi v. l. & cucurbitulae nequeunt applicari ut v. g. naribus , labiis , pudendis &c.

III.

Hodie usus earum non adeo frequens, cum, si sanguis universaliter sit evacuandus, id fiat per v. s. si particulariter, per scarificationem, nisi applicatio ad venas hæmmorrhoidales, quæ frequentissima ad imitationem naturæ in nonnullis corporibus eas sponte & periodicè summo cum sanitatis emolumento aperientis. Ex Hippoc. enim in *epidem.* ij, quibus Hæmmorrhoides profluunt, neque pleuritide, neque pulmonis phlegmone, neque phagadæna, neque furunculis, neque terminthis, neque lepra, neque vitiliginibus albis corripuntur, immò ex eodem 6. aph. 4. *Melancholicis & nephriticis hæmmorrhoides supervenientes bonum sunt, & 6. aph. 21. insanis si varices, vel hæmmorrhoides appareant, insania fit solutio.* Præterea præservare dicuntur à morbis à Melancholia vulgo derivatis, ac dantur etiam exempla plurium virorum longævorum ex periodico hæmmorrhoidum fluxu, ut adeo venæ Hæmmorrhoidales non sine ratione quibusdam dicantur *vena aurea.*

VI.

Cum igitur natura sponte sua venas Hæmmorrhoidales cum emolumento referet, æquum est, ut ars imitatrix id ipsum efficiat, quare earum apertio cum utilitate præscribenda erit à Medico in mania, melancholia, affectione hypochondriaca, scorbutica, palpitatione cordis, scirrhus lienis, affectione arthritica, Nephritica, affectibus etiam Pectoris, cum suppressus illos excitet teste Hipp. 6. aph. 12. dum ait. *diuturnas curanti hæmmorrhoides, nisi una quæpiam servetur aperta periculum aqua inter cutem aut tabis impendet.* Item in suppressione mensium, dum sanguinem in vasis uteri propter copiam & crassitiem infarctum ad orificia venarum sedis trahunt vi vacui.

V.

Sicuti autem ex *Galen.* non adeò tutum est, naturam evacuationi per hæmorrhoides assuefacere, cum periculosus sit excessus seu sanguis supra modum excernatur, seu supprimatur, ita, licet earum apertio in multis magnis morbis proffit, nunquam tamen eadem temerè tentanda, sed diligenter advertendum, num priùs fluere consuetæ fuerint, & modo suppressæ morborum causa existant, vel sanguis alias affectet vias & exitus, vel an natura eo tendat, quod per earum intumescen-
tiam, dolorem, pruritum, vel aliquot guttulas sanguinis effluentis innotescit, quo in casu eatum apertio majori cum emolumento celebrabitur.

VI.

Pars, cui applicandæ hirudines linteis aquâ nitrosâ madidis abstergenda, hinc aqua dulci eluenda, & siccanda, denique aliquot guttulis sanguinis columbini irroranda, vel saccharo pulverisato fricanda: postmodum hirudines, & quidem non venenosæ, sed præparatæ, & ritè electæ, seu per fistulam, seu per cucurbitulam, seu manu ipsâ mediante linteo albo, & mundo comprehensæ parti applicantur, & quidem in ano posteriùs coccygem versus in affectibus lienis: exterius vero magis, ubi venam cavam deplere animus. Applicatæ hirudines priùs non removendæ, nisi per se decidunt, maturato tamen, si placet eorum casu per asper-
sionem nîtri, salis vel cineris. Postquam ceciderunt pars spongia aquâ calidâ imbuta fovenda, vel in vapore aquæ continenda, ut sanguis per foramen apertum fluere possit per 2. vel 3. horas pro viribus ægroti collo-
cando v.g. patientem supra solium ferventis aquæ, cui vasculum innatet sanguinem destil-
lantem recipiens.

VII.

VII.

EVacuandus sanguis ad unc. iv. v. si mediocriter agendum: ad unc. x. si ad summum. Si foramen casu ante tempus coalescat, fluxus promovendus, vel per alias substitutas hirudines, vel cucurbitulam ano affixam, cujus ope sanguis in debita copia excerni possit, si nimium fluat, sistitur *linteo combusto* parti benè absterse applicato vel *Gallis ust.* aut *gossyp. combust.* vulnusculum quandoque consolidatu difficile. *theriac.* vino commista crebrius detergendum, hirudo, si fortè casualiter anum irrepserit, digito statim eruenda, vel aqua salsa calida clysteris modo aliquoties injecta eluenda & elicienda,

S. III.

De Officio Medici in precipienda administratione Fonticulorum.

I.

C*Auteria, Fonticuli seu Fontanella Fontanell* licet per se tantum pus plorent ex sanguine & nutrimento torrido loci fonticulo exulcerati in pus mutato, nihilominus tamen præter hoc etiam varia falia, sanies ac sordes vitio vel læsæ in sanguine fermentationis, vel depravatæ cujusdam partis nutritionis emergentes simul evacuant, & revellunt, idque non raro cum sensibili in morbis Chronicis præsertim ex coluvie serosa, ac lymphæ vitijs natis ægrorum levamine materia ichorosa, & serosa acri sale imbuta sensim educa.

II.

Conveniunt igitur Fonticuli in cephalæa, epilepsia, præservatione ab apoplexia, & affectibus soporosis, vertigine, paralyti, læsione visûs, auditûs, defluxionibus *Catarrhalibus* ad oculos, nares, palatum, dentes, fauces,

fatales, pulmones, unde etiam in Thoracis affectibus ut Raucedine, asthma, tussi perniciem minitantibus commodè excitantur, uti etiam in Phrysi incipiente prophylacticè pro humorum salforum, & acrium affluxu à capite divertendo. Præterea in morbis lieni vulgo adscriptis teste experientia ut mania, Melancholia, palpitazione cordis, affectione hypochondriaca, scorbutica, affectibus Hæmmorrhoidum summum afferunt levamen, ut si hujus tetri humoris motum è cerebro ad inferiores partes ignobiles revellere volueris fontanella in lævo crute aperienda sit,

III.

Licet cauteria maximè prosint, ubi serum seu latex plus nimium abundat, cum archæus à restagnante latice oppressus ab evacuatione per cauteria melius vivificatus vires insperato reassumat, sicque etiam in hydrope videantur esse proficua, tamen cautè his utendum. Nam ex Hippoc. 6. aph. 8. *aquâ inter cutem laborantibus exorta in corpore ulcera non faciliè sanantur*; hinc ijs utendum, ubi crura nondum sunt tumida. Præterea conveniunt in affectu Ischiatico, in affectibus uterinis vitio mensium exortis, fluore albo, passione hysterica, pedibus ulcerosis pro affluxu intercipiendo, ac uno verbo omnibus alijs affectibus, in quibus vel totalem cruoris massam vel laticem minuere, aut revellere, vel derivare decretum est.

IV.

IN horum administratione observet Medicus. 1. Fonticulos sensim, & sensim operari, sicque magis tantum convenire in morbis Chronicis. 2. Cum ustio sit inter remedia extrema, non deveniendum esse ad fonticulos, nisi ubi præsidia mitiora nihil profecisse videmus, aut non profutura existimamus. 3. Corpus prius per purgationem, & v. s. si opus disponendum, & præparandum esse. 4. Ratione anni temporum, &

morbus inducias ferat, verum esse omnium maxime aptum. & quidem declinante lunâ. 5. Ratione ætatis pueros tenellos, & senes decrepitos non facile tolerare fonticulos, nisi urgeat morbus valde gravis ut Epilepsia, apoplexia, Catarrhus suffocativus, 6. Eosdem minus convenire emaciatis, & morbo depressis magis verò obesis, edacibus &c.

V.

Quo ad loca fonticulorum demonstrantur hæc à scopo, vel evacuationis, vel revulsionis, vel derivationis observata tamen ubique rectitudine vasorum partis affectæ cum loco fonticuli. Sic v. g. in nucha inter 2. & 3. vertebam loco molestissimi veterum setacei poni solet pro capite & oculis. In brachio, & quidem in Interstitio inter musculum deltoideum, & bicipitem 5. Digitis à flexura pro affectibus capitis, vertigine, apoplexia, affectibus oculorum, aurium, faucium & laryngis &c. In cruribus vel supra vel infra genu in parte interna, ubi fasciæ crurales ligantur in affectibus uteri, mensium, lienis, Hæmmorhoidum malo Ischiatico, aliarumque partium mediæ & infimæ ventris R. R. etiam in bregmate, seu sincipite aliquod ponunt pro humoribus à cerebro ad exteriora evocandis, item intra scapulas. Item intra septimam thoracis vertebam intra costas pro vomica pulmonum, sed hi minus usitati.

VI.

EXcitatur fonticulus vel *ferro*, dum simpliciter cutis elevata scalpello inciditur foramen debitæ magnitudinis faciendo quod ad suppurationem deductum fonticulum suggerit, vel *igne actuali* per ferramentum ignis ad debitam profunditatem intruso, vel *igne potentiali* seu medicamento *corrosivo*, vel alcalino ex cineribus, quod tamen non ita commodum, quia facile liquecendo locum

locum exulcerationis mutat, vel acido v. g. per chry-
stallos lunares quantitate pisi, vel butyr. antimon. ad
gut. v. vel vj, pennæ anserinæ loco, ubi excitandus est
fonticulus impositæ, vel globulo ligneo hora una ante
fonticuli parationem aqua forti imprægnato.

VII.

EXcitato fonticulo eschara & caro mortificæa butyro
vel unguento diggestivo separanda, & si exciderit,
ac ulcus satis dilatatum fuerit, globulus ex ligno Hede-
ræ, vel cera vel radice Ireos, vel pisum majus, aut
galerus argenteus aut inauratus imponendus superim-
posito Empl. diapalm. vel sparadrapo: hinc locus de-
deinceps lamina **Fontanell-Blech** subdito minuto pul-
vinari arctius constringitur, quo profundior fiat fon-
ticulus. Si non sufficienter ploret, globulus indi po-
test ex *rad. gentian.* vel fortior ex *rad. Elleb. nig.* vel ex
hedera inuncta *Bals sulph.* vel ex cer. & pauco Mercur.
præcipit quo etiam nihil melius sordidos, & putridos
fonticulos mundificat, vel ex *cera & Cantharid.* caro in
fonticulis luxurians optimè absumitur insperso *alumi-
ne ust.*

VIII.

Fonticulus nunc excitatur unus tantum, nunc simul
duo in affectibus præsertim contumacibus, ubi Pra-
cticorum aliqui asserunt ein **Fontanell** sein **Fontanell** /
quo in casu communiter observant, ut vel decussatim
applicentur, id est, v. g. unus in brachio dextro: alter in
crure sinistro vel vicissim. Præstant subinde etiam duo
in quovis latere, ne unum magis exinde debilitatum
totum humorum impetum eo trahat, ac hemiplexia
quandoque excitetur. Ad cauterij diu jam gestati
clausuram non facile Medicus consentiat, nisi vel æger
ætatis magnum habeat adminiculum, vel membrum
fonticuloni gerens gracilescat, vel fluxione copiosiori
tentetur, ac ulcus evadat sordidum, aut malignum,

vel si supra articulum descendat, vel sponte exliccetur &c.
Tum vicariæ singulis mensibus subrogandæ evacuationes, seu per purgationem, seu per sudorem, seu per alia loca.

S. IV.

De Officio Medici in præscribendis remedijs pro usu, & administratione fonticulo- rum usitatis.



Lapis septicus ruptorius. R. ciner. clavellat. calc.
Vit. ciner. sag. Vit. an. p. aq. f. lixv. fort. & in-
spiss. ad formam lapid. S. Corrosiv. Stein-
zum Fontanell.

Lapis infernalis, seu chrystall. lunar. R. limat. ar-
gent. unc. ij. aq. fort. duplum vel triplum, solu. solutio ab-
strahatur in cucurbita, caput mortuum, quod formam
salis representat, calcinetur in crucibulo amplo, donec ma-
teria non amplius ebulliat, hinc ignis parum augeatur, ac
materia effundatur in Vas calidum. Refrigerata quasi la-
pidem representat, sed friabilem asserendum in loco ca-
lido & sicco. S. ut supra.

Lapis causticus Heurnij sesqui horæ spatio cutem per-
forans. R. Vitriol. ust. un. ij. sal. armon. unc. i. calc.
Vit. ciner. è face Vin. an. unc. iij. tritis atque permixtis
affunde lixivium ficulneum, vel tithymalinum, quod sub-
inde colatur, dum istorum materia ferè dissoluta sit. Li-
xivium dein in olla nova aperta coquitur, ac ferdescit, dum
crassescat ac lapidescat. Recondatur in loco sicco in am-
pulla Vitrea & obturata.

Unguent diggestivum. R. thereb Venet. unc. S. Vitell.
ov. dr. ij. croc. orient. scr. S. M. S. Maturier. Salbl in
Anfang des Fontanells zu gebrauchen/bis der Duzen
heraufgefallen.

paradrapum. R. cer. flav. unc. ij. ol. oliv. unc. i. S.
thererb. unc. i. fluant in sigillo inspergenda ceruss. dr. S. ob-
serva



servando, ne materia nimis ferbeat. S. Durchzug oder Fontanell's Pflaster.

Aliud. R. ol. ros. unc. ij. S. cer. alb. Sol citrin. unc. ij. scd. cerd. dr. x. M. F. sparadrap.

Aliud. R. ol. oliv. lib. 1. min. lb. S. coq. super lento igne semper agitando, donec incipiat fusco colore tingi: hoc facto in alio cacabo liquefiat cer. citrin. lb. S. M. cum priori materia, & coq. omnia ad justam consistentiam, amotis ab igne add. camph. rasa unc. S. sege. donec camphora liquefiat, nec odor evanescat. Vltimo scindantur ex charta papyracea longa 3. transversorum digitorum lata, ducantur per dictum cerat. liquid. & f. cum forfice emplast. debita magnitudinis.

Aliud viride. R. seu. hirc. cer. cit. an. unc. 1. S. ol. ros. dr. Gij. coloph. unc. S. Virid. ar. scrup. 1. M. iningatur tela quartarium ulna lata & 6. longa. Quidam loco sparadrapati utuntur Empl. Norisbergensi. alij sola. ce a alba, & si fonticuli sordes. & putredinem contrahant addisâ cerâ Viridi.

Globuli caustici fonticulos apertos servantes, earumque fluxum promoventes. R. Virid. ar. gr. xx ij. rad. gent. canthar. pulv. an. gr. xvj. cum. cer. alb. dr. 1. S. f. globuli ut Pisa majores. S. Condere Fontanell's Kägelen) solche offen vnd mehr stießend zu machen.

Cerat. sculteti fonticulos ab omni symptomatum injuria vendicans. R. cerat. de ceruss. seu alb. cost. unc. xij. pulv. ceruss. unc. i. thur. tragac. an. dr. Gij. In flor. benz. an. dr. G. stirac. liq. ol. spica odorat. an. dr. ij. sapon. Ven. unc. ij. cer. unc. ij. M. S. Besonderes Fontanella Pflaster / solches von allen Zufall zu bewahren.

Aliud magni Ducis Hetruriae. R. succ. heder. lib. 1. nuotian. unc. i. thereb. resin. pin. ung. ros. mes. cer. cit. an. un. i. pulv. cyper. odorat. drach. ij. S. ceruss. ol. un. i. M. f. cerat. S. ut supra.

§. V.

*De Officio Medici in præcipienda applica-
tione Vesicatoriorum.*

I.

Quod fonticuli pedetentim, hoc Vesicatoria faciunt confertim, adeoque ferè urgentiori in malo, & ubi præsentaneum magis indicatur auxilium, hæc ipsa in usum vocantur. Exserunt vim suam tum revellendo, tum evacuando, & quidem tum excitando dolorem, quatenus acribus suis particulis, fibras, irritant, unde ex fibrarum concitatio tremulatione & fibratone provocatur eo, ac citius fertur spirituum impetus, unde in loco prius male habente per spirituum & dolore vesicante alio avocatorum motum fit alteratio & successiva correctio causæ morbificæ, atque ita per accidens prioris symptomatis curatio, tum evacuando, quatenus salinæ Cantharidum particulæ hinc inde pungunt, vellicant, & rorem partitis nutritium, aut etiam M. S. penetrant, attenuant, & colliquefaciunt, sicque etiam particulas Heterogeneas, & excrementitias eidem non ritè permiscibiles ibidem ex arctatis poris & constrictis meatibus hærentes evacuant.

II.

Quam maximè igitur conveniunt vesicatoria in diathesi sanguinis crassa, viscida & ad coagulationes, & stagnationes disposita, ac affectibus inde oriundis, veluti in cephalalgia, apoplexia, & affectibus soporosis, paralyti, epilepsia, in morbis convulsivis, & affectibus nervosis sine febre ad ardentem inclinante, in oculorum Pathematibus ut suffusione, gutta serena, Ophthalmia &c. In dolore dentium, in Cattarrhis ac defluxionibus irruptionem comminantibus in pulmo-

nes,

nes vel aliam nobiliorem partem, vel in nares, oculos, fauces, pectus &c. in doloribus fixis, chronicis, & acriter partem aliquam divellentibus, ut v. g. dolore Ischiatico. Item in Petechijs, vel varriolis retrocedentibus.

III.

IN febribus continuis & malignis non promiscuè statim applicanda, sed observandus status sanguinis. Sicuti enim in diathesi ejus crassa, viscida & ad coagulationes, stagnationesque disposita, quæ exilissimopulsu, extremitatibus frigidis, anxietate, ad morbos soporosos propensione, aliisque coagulationis indicijs stipata est, maximè proficuos afferunt effectus, & quidem multò magis, si tempus hyemale, temperies ægri ad humidum inclinans, habitus pinguis &c. Ita e contra in constitutione sanguinis acri, & colliquativa, ubi febris plùs minùs ardens, ac magna adest sanguinis agitatio, & impetus, quàm maximè nocent, dum accedunt convulsiones, deliria majora, febris maximum incrementum, ac tandem mors, eoque magis, si habitus ægri gracilis ac tempus adsit æstivum, hinc delitantes cum febre acuta, & lingua arida ex usu vesicatoriorum pleorique moriuntur, & quidem convulsi,

IV.

EX observatione *Georg. Bagliv. de usu & abus. vesicant. c. 3.* in Plevritide, ubi circa quintam vel seprimam; vel alijs intermedijs diebus apparet magna spirandi, & expectorandi sputi difficultas patientem in summum vitæ discrimen conjiciens, irritis alijs Vesicantia tibijs, vel cruribus admota non solum expectorationem (quæ primaria crisis morborum pectoris) promovent ad stuporem ferè, sed etiam spirandi difficultatem leniunt cum morbi mutatione in melius acri cantharidum sale incipientes coagulationes sol-

vente ac humores pristinae circulationi restituerent. Idem sentire videtur, Hippoc. l. 2. progn. 67. dicens. in Pulmonibus, quicumque tumores sunt ad crura boni, nec potest aliud quidquam melius accidere, praesertim si mutato spūto sic appareant. Fatetur praedictus author ex centenis ejusmodi aegrotantibus vix paucissimos objisse praefata methodo tractatos, ac insuper observasse post adhibita in plevritide vesicantia diarrhaeam, si aliqua aderat, imminutam vel prorsus suppressam esse, atque subinde copiosiore[m] successisse Urinam.

V.

Locus applicationis vesicatoriorum est vel universum caput juxta Willisium, quod tamen raro practicatur, nisi in apoplecticis, vel pone aures in cephalalgia, dolore oculorum, dentium, aurium, vel ad nucham seu intra scapulas in iisdem affectibus, uti & soporosis minoribus, aut supra carpum in parte Musculosa brachii & in cruribus seu prope inguina, seu quod frequentius 4. digitis supra malleolum interiorem in febribus malignis, affectibus soporosis maioribus &c. Prout animus vel revellendi, vel derivandi, vel evacuandi, parantur vel ex Emplast. vesicator. vel ubi fortius agendum in subiectis praecipue durioribus ex ferment. veter. aceto forti & pulvere cantharid.

VI.

Applicata vesicatoria parte prius aceto calido fricata & rubificata (plus minus prout levius vel fortius agendum, cum acidum figat sal. vol. Cantharidum) 7. 8. vel ordinarie 12. horis relinquenda, hinc removenda, vesicas forficè inscindendas, locumque leniendum folio brassicae per aquam bullientem prius tracto, vel in eam intincto, & butyro non salito incrustato, vel diachylo simplici singulis 8. horis illud renovando. si animus, diutius vesicatoria in fluore conservandi, cum alias vix ultra 4. vel 6. dies ita humida observentur, utile est

est Empl. delperm. ran. vel albi coct. 3. partes & unam Emplast. vesicator exactè mistas applicare vel Empl. diachyl. cum pingued. leporin. vel addere parùm pulv. Cantharid. Si verò locus exulceratus nimis doleat, aut inflammationis metus adsit, aut animus consolidandi, optimum ulum præstat Emplast. de sperm. ran.

VII.

Vesicatoriis applicatis sitis, & linguæ ariditas supervenit: subinde etiam observantur motus tendinum veluti subsultorii, & convulsivi, quandoque sudores plùs minùs copiosi, pulsus etiam veluti obscurantur, quæ tamen omnia, si res benè succedat per triduum circiter durant, usque dum acres cantharidum sales sanguini inhærentes eliminati: subinde n-ictum sanguineum, vesicæ inflammationem, urinæ ardorem, aliaque gravia excitant symptomata præsertim dorso applicata, vel in gracili habitu, æstivo tempore, sub ardore caniculæ non nisi multis emulsionibus ex seminibus frigidis maioribus cum aliqua sem. fanic. cantharidum alexi pharmaci quantitate curabilia. Subinde ulcera à vesicatorijs excitata desinunt in gangrænâ, vel in difficillimam eorum cicatrizationem, præsertim si maligna aëris accedat constitutio vel in subiectis cachecticis, atro-Melancholiis, valerudinariis, & lue gallica detentis, quo in casu pro mundificatione commendatur mel. ros. si bis vel ter de die eodem obliniantur, & pro cicatrizatione inspersus pulvis tutiæ in subtilissimum alcool. redact. vel fila carpta in decoct. alum. crud. ebullita, exsiccata, atque hinc applicata.

VIII.

Vesicatoria non conveniunt, sed contraindicantur à summa virium resolutione, in gravidis, instante fluxu menstruo, in urinæ ardore, incontinentia, mictu sanguinis, ulcere sphincteris vesicæ item ijs, qui lue venerea semel laborarunt, cùm ab adhibitis vesicantibus

summo opere lædantur, in quocunque tandem morbo adhibeantur, hinc non nisi in maximis coagulationibus & morbis soporosis præscribenda. Item non conveniunt, ubi acrior & colliquativa sanguinis constitutio præsertim in habitu gracili &c. in febribus acutis nonnulli aliqua signa coctionis expectant, antequam applicentur; in chronicis verò morbis nervosi generis phases lunæ, ut die uno vel altero ante novi-vel plenilunium applicentur. Lethale signum est, si in gravioribus morbis nullam faciant operationem vesicationis, cum etiam in cadavere nihil operentur.

§. VI.

De Officio Medici in præscribendis Vesicatorijs.

Emplast. Vesicator. R. emplast. Vesicat. aught. Stan. dr. 1. S. ij. unc. S. detur ad chart. S. Pflaster vor ein vesicatori auff ein Leder / in der Grösse eines grossen Thalers oder Handflache aufzustreichen / und aufgelegter mit Heft-Pflasteren wohl zu verwahren.

Aliud pro 4. vesicator. R. emplast. vesicat. aught. unc. 1. vel R. empl. de melil de mucilag. an. unc. S. canthar. pul. dr. ij. M. S. Vesicatori-Pflaster auff Hand und Fuß / wie bewust aufzulegen.

Aliud in Dolo redentium valde proficuum, R. cantharid. prep. pul. dr. ij. therebinth. dr. j. m. rrb. mast. camph. an. gr. xv. ol. ros dr. ij. cer. dr. ij. M. f. Emplast. S. Zahn-Vesicatori-Pflaster darvon / so vil vönnöthen / hinter die Ohren / oder auff das Genüß aufzulegen.

Cataplasma pro 2. Vesicat. R. canth. prep. scrup. ij. enphorb. scr. j. ferment. accerrimi unc. 1. acet. squill. q. S. M. f. past pro 2. vesicat. S. Blater-ziehende Pflaster für 2. Vesicatori.

Aliud

Aliud. R. *canth. præp. scr. iv. sinap. pyreth. an. scr. j. ferment. dr. vj. acet. squill. q. S. M. f. mass. inducenda sorio pro 2. vesicat.*

Aliud pro uno. R. *ferment. parum, caricam ping. No. 1. canth. præp. gr. vj. cum acet. squillit. S. q. M. f. mass.*

C A P U T IV.

D E

Officio Medici in affectibus indicantibus balnea & acidulas.

§. I.

De Officio Medici in considerandis differentijs Balneorum tam in genere quam specie.

I.

Balneum. 1. aliud est *aëreum*, quod *laconicum* Schwitz- Baad vocant; aliud *aqueum*, de quo in præsentî, aqueum 2. Aliud est *naturale* & simplex: aliud *artificiale*, quod arte ex incoctis pluribus ingredientibus ad diversos fines ordinatur. 3. Naturale, vel est *Balneum aquæ dulcis*, vel solius, vel additis subinde simul butyri, olei, lactis &c. ad maiorem humectationem, qui liquores subinde etiam seorsim apud ditiores balneum constituunt in doloribus partium nervosarum, dolore Iliaco, Nephritico convulsione à siccitate, urinæ suppressione &c. vel *Balneum aquæ mineralis* virtute mineralium imprægnatæ. 4. Balneum minerale, vel est *actu frigidum* vel *calidum* e sua

sua ſcaturigine profluens, ut ſtatim ſine alio ignis admixtulo uſurpari poſſit, propriè *thermale* dictum, quale v. g. fabarienſe, ſeu piperinum *das Pfeffers Baad/ Caſtaneenſe Das Rasteiner Baad/ Badenſe Baden Baaden &c.* utrumque pro varietate ingredientium mineralium, quorum vires & naturam æmulantur, aureum, argenteum, ferratum, plumbeum, ſalſum, nitroſum, aluminosum, ſulphureum, bituminosum vel ex variis hiſce mixtum.

II.

Probantur aquæ minerales eas probè conſiderando, vel quatenus manent integræ contemplando ſaporem, odorem, colorem, qualitatem tactilem, contenta, vires atque effectus, perpendendo quoque ſimul extra aquam loci naturam, oſtium ſcaturiginis, canales, ahenum &c. vel quatenus conſumuntur ſeu per ſolſolutionem, ſeu per evaporationem in loco calido, ſeu deſtillationem, ſeu decoctionem, vel examinantur per præcipitationem ponderando ac trutinando poſtmodum reſiduum præcipuè |gultu & olfactu. Ut autem aquæ mineralis probatio ritè inſtituatur, eadem haurienda recens ac pura ex ſcaturigine, & quidem m. vel v.

Aquæ ſulphureæ v. g. tam calidæ quàm frigidæ di-gnoſcuntur 1. Ex odore ſulphureo notabiliter nares feriente. 2. Ex pinguedine quadam in ſuperficie innatante. 3. Quòd in deſluxu talium aquarum, dum aëris injuriæ ſubjiciuntur, cernatur corpus aliquod viſcoſum, album & læve inter ſe cohærens ſimile lacti ſulphuris. 4. Quod omnes tales aquæ argentum in ijs ſuſpenſum inſtar communis ſulphuris jam citius, jam tardius denigrent. 5. Quod æſtuentes præbeant flores ſulph. inflammabiles in cryptis reperibiles.

III.

BAlneum aquæ dulcis. 1. Mundificat, & ſordes ſtrigofas à ſudore, pulvere & excrementis Maſſæ ſanguineæ

guineæ ad peripheriam latis abstergit atque eluit, hinc in scabie præsertim sicca, satore alarum, inguinum & pedum, aliisque impuritatibus corrigendis, atque abigendis utile. 2. Poros aperit, per eos sese insinuat transpirationem promovet, & excrementa in ambitu corporis hærentia discutit. 3. Totum corpus refrigerat, ac viscerum, & epatis præsertim fervorem, atque intemperiem calidam corrigit: humectat quoque ac serum restituit, hinc aridis, squallidis, strigosis ac tabidis maximè convenit, & præsertim Melancholicis à totius corporis habitu talibus. 4. Fibras tensas laxat, emollit, ac paregoricum est, hinc quoque utile in doloribus colicis, nephriticis, facilitando partu ultimo præsertim mense gestationis usurpatum.

IV.

BAlnea *mineralia*, & præsertim *Therma* agunt in nostrum corpus calefaciendo, humores pituitosos, congelatos quasi, aut ad minimum gelatinosos, & segnes calore suo colliquando, fluxiles, & ad motum quemcunque non solum circularem, sed & fermentativum, dum activas eorum particulas caliditate sua excitant, inutiles dissipant: singulariter verò spiritus vitales serenant, ac à particulis excrementitijs expurgant, aptos reddendo, superfluas quoque serositates extirpando, ut natura postmodum sic adjuta mediante circulatorio sanguinis motu, & sedes movere, & urinam pellere, ac sudores elicere valeat; Partium etiam laxitatem, remissumque fibrarum tonum contrahendo, firmando ac roborando, ut adeo pateat, aquas thermales potissimum convenire caeochymia pituitosa ac serosa, affectibusque frigidis pituitosis & serosis sine omni intemperie calida, hinc etiam in universum mulieribus magis quam viris salutare existunt, utpote frigidioribus, & magis pituitosis,

quacunque, & omnibus affectibus cutaneis, omnem cutis immunditie, inveteratis atque exedentibus, scirrhis, fistulis, vulneribus & læsionibus minus curatis, lepra incipiente Arabum, tumoribus Pedum ædematosi &c.

VII.

Autem in paulò ante memoratis affectibus aptissime conveniunt: ita nocent Contra Phisicis, yicis, Vomicæ, aut alio abscessu interno laboribus, corporibus etiam nimium repletis sanguine, Erythymia ob humorum colligationem, ac funvarios excitantem morbos, cattarrhosis etiam, fluxiones patientibus, ictericis quoque, hyicis, viscerum scirrhus, vel ulcere detentis, obnoquoque suffusioni, Erysipelati, ac abundantibus acribus, biliosis, scorbuticis &c. Præter etiam à quàm plurimis excluduntur, quia ex thermarum sæpius inveniuntur catamænia, vel sunt purgatio aut alvi fluxus fætui nocivus, difficietiam thermarum fontes adeunt, quin aliqua creetur, quæ tamen omnia intelligenda de gratiam longo tempore nempe 7. vel 8. mensium, vel ibus, macris, vel jam ante abortui obnoxijis, experientia contrarium testetur, gravidas primis mensibus thermas sine ullo damno usurpasse, licetutela hîc opus, & mulieres tales constitutionis rosæ, aut serosæ sint, necesse sit. Metuitur quiminia prolis accretio, vel ejusdem suffocatio, amen contrarium exempla probent, & absque hoc innatet fætus.

VIII.

Veniendo tandem ad aquas minerales in specie hîc loci circa tractum Oenipontanum reperibiles, carquidem thermis propriè sic dictis, & per se calidis,

dis, & æstuantibus, ut ignis ad miniculo non indigeant,
 sulphureas tamen frigidas, & limpidas habemus, & pri-
 mò quidem extra civitatem Hallensem *Balneum ad S.
 Crucem*, **das Baadbenm H. Creutz** / quod ætate præ-
 sertim haud exiguum sulphuris odorem spirat, fortius
 est, *Minsterense* infra Schwazium, **das Münsterer
 Baad**. His efficacius, & ad Thermas proximè acce-
 dens, utpote tepidum, & nonnihil fumosum, quod in
 monte *Brenner* inq̃isitur, **das Brenner Baad** in affe-
 ctibus præcipuè externis ulcerosis nempe fistulosis ma-
 ximè præcellens. His balneis sulphureis omnes prædicti
 effectus plùs minùs conveniunt, in subjectis tamen ma-
 gis pituitosis, & serosis quàm calidis, siccis & biliosis.
 Minùs etiam comòdè hæ aquæ potantur viscera interna
 nimis calefacientes, siccantes, & sitim tantaleam exci-
 tantes. Balneum etiam minerale habemus in *Seelrain*
 ad fontem rubrum, **das Seelrainer Baadbenm røthen
 Brunnen** copioso croco martis imprægnarum. Hoc
 mulieribus eorùmq̃ affectibus præcipuè dicatum u-
 tilissimum in suppressione mensium, nimio eorum fluxu,
 obstructionibus viscerum, & uteri passione hysterica,
 abortùs præcautione, debilitate & laxitate uteri, fluore
 albo &c. interim minùs convenit admodum calidis
 gracilibus, siccis & biliosis. Aliud Balneum frequen-
 tatur in *Valle Volders*, **das Baad im Volder Thal** ni-
 tro, alumine, vaporibus Martialibus, & paucissimo
 sulphure imprægnatum, hinc calefacit, siccit, roborat,
 effectusq̃ue jam ante in genere propositos edit. Tem-
 peratiora, mitiora subiectis debilioribus, ac calidiori-
 bus magis apta balnea sunt: illud quod est in *Egger-
 bach* / & illud in *Pamtkirchen* infra halam nephriticis,
 & hypochondriacis multum proficua. Reliqua Bal-
 nea in dem *Venusberg* / in dem *Offenloch* / in dem
Kerschen Thal minùs de mineralibus participant,
 sicq̃ue magis ad dulces accedunt,

S. II.

De Officio Medici in, ante & post Bal- neorum usum.

I.

UT balnea utiliter instituantur ; quædam ante
 quædam in, & post illius usum observanda sunt
 Medico. 1. Igitur pro exigente necessitate cor-
 pus purgandum, & quidem magis per Epicrasim lenio-
 ribus ut v. g. nodulo laxativo quàm fortioribus & dra-
 sticis ac vena, si opus fuerit, secanda. 2. Quo ad tem-
 pus anni, commodissimum præbent menses non eRRa-
 ti, quia & dies magis protracti, tempus hilarius, ac homo
 ipse ad omnes curas magis dispositus, hisque tempori-
 bus nocentissima illa antiperistasis, ne ex balneo calido
 exeuntes lædantur frigido immediato præcaveretur. 3.
 lunà decreſcente, si fieri possit, illud inchoandum.

II.

Ratione temporis diei optimum est tempus matuti-
 num: non exclusis tamen horis pomeridianis. An-
 teprandium jejunè si fieri possit balneandum: secus ju-
 sculum ex decocto. carnis vel Gallinæ in aqua thermali
 concedendum. Post prandium aquis non insidendum
 nisi 3. vel 4. horis à prandio, ne lædatur digestio, &
 variæ cruditates generentur. Consultum est, manè
 hora quarta vel quinta surgere, balneum frequentare
 hora quarta vel quinta, ac post prandium hora tertia.
 In principio nec calidè, nec profundè insidendum, ita
 tamen, ut calor successivè aliquàlter intendi possit, ca-
 vendo tamen, ne quid nimis. Ex intensiori enim calo-
 re balnei succedunt vigilæ, sitis, dolor capitis, deflu-
 xiones, lassitudines, appetitus prostratus asthmata &c.
 dignoscitur autem calor intensior, si corpus ad introi-

G

tum

enim quasi aduratur, si facies more Galli indici ex candescens rubeat, aut corpus ipsum quasi sudore diffluat, intendatur siccis &c.

III.

Inseffus non sit nimis profundus, ac pluribus ad umbilicum tantum usque suadet, in quo tamen certa haud potest dari regula: Profundius enim insidere possunt seniores, Melancholici, Phlegmatici, ventriculum frigidiores habentes, qui etiam maiorem calorem ferunt, vel affectibus colli, scapularum vel brachiorum detenti: minus Juvenes Choleric, æstuantem habentes ventriculum. Labrum semper sit mundum, regendum mediâ parte versus collum asserculis ligneis: ex altera verò parte tapete, vel alijs integumentis, caput etiam linteis mundis circumligandum, & à calidis balnei ascendentibus vaporibus defendendum. Si aqua mineralis non per se sit calida, per trihorium prius spumosa ebullitione coquatur, & singulis in sessionibus renovetur.

IV.

Longitudinem & horas Balneandi quod attinet, communiter balneum primo die per horam: altero per duas vel unam & dimidiam, & sic singulis diebus per horam, vel dimidiam crescendo pergitur usque ad horas 5. 6. 7. tum per 12. 15. vel etiam 20. dies in eodem consistendum, vel cōusque, donec quis se alleviatum senserit, & balneum quasi nauseaverit, quod signum perfectæ curæ, atque hinc denuo eo, quo ascensum est modo & tempore descendendum. Anteprandium semper plus temporis insumendum adeo, ut si de die per 5. horas balneetur balneum manè per 3. cum dimidia: vespere per 2. & dimidiam partem horæ balneandum sit, alij sequentem observant tabellam.

In-

Instructio fundamentalis

*Qua ratione hora ingressus balnei sint ob-
servanda.*

Die. Horis antemeridianis. Horis pomeridianis.

Modus ascendendi, & descendendi.	1	-	-	1	-	-	-	-	$\frac{1}{2}$
	2	-	-	$1\frac{1}{2}$	-	-	-	-	1
	3	-	-	2	-	-	-	-	$1\frac{1}{2}$
	4	-	-	3	-	-	-	-	2
	5	-	-	3	-	-	-	-	2
	6	-	-	3	-	-	-	-	2
	7	-	-	3	-	-	-	-	2
	8	-	-	4	-	-	-	-	3
	9	-	-	4	-	-	-	-	3
	10	-	-	4	-	-	-	-	3
	11	-	-	4	-	-	-	-	3
	12	-	-	4	-	-	-	-	3
	13	-	-	4	-	-	-	-	3
	14	-	-	4	-	-	-	-	3
	15	-	-	3	-	-	-	-	2
	16	-	-	3	-	-	-	-	2
	17	-	-	3	-	-	-	-	2
	18	-	-	$2\frac{1}{2}$	-	-	-	-	2
	19	-	-	$1\frac{1}{2}$	-	-	-	-	1
	20	-	-	1	-	-	-	-	$\frac{1}{2}$
	21	-	-	1	-	-	-	-	$\frac{1}{2}$

summo periculis dantur, in quocunque tandem morbo adhibeantur, hinc non nisi in maximis coagulationibus & morbis soporosis præscribenda. Item non conveniunt, ubi acrior & colliquativa sanguinis constitutio præsertim in habitu gracili &c. in febribus acutis nonnulli aliqua signa coctionis expectant, antequam applicentur; in chronicis verò morbis nervosi generis phases lunæ, ut die uno vel altero ante novi-vel plenilunium applicentur. Lethale signum est, si in gravioribus morbis nullam faciant operationem vesicationis, cum etiam in cadavere nihil operentur.

§. VI.

De Officio Medici in præscribendis Vesicatorijs.

Emplast. Vesicator. R. emplast. Vesicat. augustan. dr. i. S. ij. unc. S. desur ad chart. S. Pflaster vor ein vesicatori auff ein Leder / in der Grösse eines grossen Thalers oder Handflache auffzustreichen / und aufgelegter mit Hefft-Pflasteren wohl zu verwahren.

Aliud pro 4. vesicator. R. emplast. vesicat. august. unc. i. vel R. empl. de melil de mucilag. an. unc. S. canthar. pul. dr. ii. M. S. Vesicatori-Pflaster auff Hand und Fuß / wie bewust auffzulegen.

Aliud in Dolo redentium valde proficuum, R. cantharid. præp. pul. dr. ij. therebinth. dr. j. m. rrrh. mast. camph. an. gr. xv. ol. ros dr. ij. cer. dr. ij. M. f. Emplast. S. Zahn-Vesicatori-Pflaster darvon / so vil vonnöthen / hinter die Obren / oder auff das Genüß auffzulegen.

Cataplasma pro 2. Vesicat. R. canth. præp. scrup. ij. euphorb. scr. j. ferment. accerrimi unc. i. acet. squill. q. S. M. f. past pro 2. vesicat. S. Blater-ziehende Pflaster für 2. Vesicatori.

Aliud



Aliud. R. *canth. præp. scr. iv. sinap. pyreth. an. scr. j. ferment. dr. vj. acet. squill. q. S. M. f. mass. inducenda*
corio pro 2. vesicat.

Aliud pro uno. R. *ferment. parum, caricam ping.*
No. 1. canth. præp. gr. vj. cum acet. squillit. S. q. M. f. mass.

C A P U T I V.

D E

Officio Medici in affectibus in-
 dicantibus balnea & acidulas.

§. I.

*De Officio Medici in considerandis differen-
 tijs Balneorum tam in genere quàm
 specie.*

I.



Balneum. 1. aliud est aëreum, quod
laconicum Schwitz-Baad vocant; a-
liud aqueum, de quo in præsentî, a-
queum 2. Aliud est naturale & sim-
plex: aliud artificiale, quod arte ex
incoctis pluribus ingredientibus ad diversos fines ordi-
natur. 3. Naturale, vel est Balneum aquæ dulcis, vel
solius, vel additis subinde simul butyri, olei, lactis &c.
ad maiorem humectationem, qui liquores subinde etiam
seorsim apud ditiores balneum constituunt in doloribus
partium nervosarum, dolore Iliaco, Nephritico con-
vulsione à siccitate, urinæ suppressione &c. vel Balneum
aquæ mineralis virtute mineralium imprægnatæ. 4.
Balneum minerale, vel est actu frigidum vel calidum è
 sua

sua ſcaturigine profluens, ut ſtatim ſine alio ignis admixtulo uſurpari poſſit, propriè *thermale* dictum, quale v. g. ſabarienſe, ſeu piperinum *das Pfeffer-Baad/* Caſtaneenſe *Das Kaſteiner-Baad/* Badenſe *Baden-Baad* &c. utrumque pro varietate ingredientium mineralium, quorum vires & naturam æmulantur, aureum, argenteum, ferratum, plumbeum, ſalſum, nitroſum, aluminofum, ſulphureum, bituminofum vel ex variis hiſce mixtum.

II.

Probantur aquæ minerales eas probè conſiderando, vel quatenus manent integræ contemplando ſaporem, odorem, colorem, qualitatem tactilem, contenta, vires atque effectus, perpendendo quoque ſimul extra aquam loci naturam, oſtium ſcaturiginis, canales, ahenum &c. vel quatenus conſumuntur ſeu per ſolſolutionem, ſeu per euaporationem in loco calido, ſeu deſtillationem, ſeu decoctionem, vel examinantur per præcipitationem ponderando ac trutinando poſtmodum reſiduum præcipuè gultu & olfactu. Ut autem aquæ mineralis probatio ritè inſtituatur, eadem haurienda recens ac pura ex ſcaturigine, & quidem m. vel v.

Aquæ ſulphureæ v. g. tam calidæ quàm frigidæ diſtinguuntur 1. Ex odore ſulphureo notabiliter nares feriente. 2. Ex pinguedine quadam in ſuperficie innatante. 3. Quòd in deſluxu talium aquarum, dum aëris injuriæ ſubjiciuntur, cernatur corpus aliquod viſcoſum, album & læve inter ſe cohzrens ſimile lacti ſulphuris. 4. Quod omnes tales aquæ argentum in ijs ſuſpenſum inſtar communis ſulphuris jam citius, jam tardiùs denigrent. 5. Quod æſtuentes præbeant flores ſulph. inflammabiles in cryptis reperibiles.

III.

Balneum *aquæ dulcis*. 1. Mundificat, & ſordes ſtrigoſas à ſudore, pulvere & excrementis Maſſæ ſanguineæ

guineæ ad peripheriam latis abstergit atque eluit, hinc in scabie præsertim sicca, fatore alarum, inguinum & pedum, aliisque impuritatibus corrigendis, atque abigendis utile. 2. Poros aperit, per eos sese insinuat transpirationem promover, & excrementa in ambitu corporis hærentia discutit. 3. Totum corpus refrigerat, ac viscerum, & epatis præsertim fervorem, atque intemperiem calidam corrigit: humectat quoque ac serum restituit, hinc aridis, squallidis, strigosis ac tabidis maximè convenit, & præsertim Melancholicis à totius corporis habitu talibus. 4. Fibras tensas laxat, emollit, ac paregoricum est, hinc quoque utile in doloribus colicis, nephriticis, facilitando partu ultimo præsertim mense gestationis usurpatum.

IV.

BAlnea *mineralia*, & præsertim *Therma* agunt in nostrum corpus calefaciendo, humores pituitosos, congelatos quasi, aut ad minimum gelatinosos, & segnes calore suo colliquando, fluxiles, & ad motum quemcunque non solum circularem, sed & fermentativum, dum activas eorum particulas caliditate sua excitant, inutiles dissipant: singulariter verò spiritus vitales serenant, ac à particulis excrementitijs expurgant, aptos reddendo, superfluas quoque serositates extirpando, ut natura postmodum sic adjuta mediante circulatorio sanguinis motu, & sedes movere, & urinam pellere, ac sudores elicere valeat; Partium etiam laxitatem, remissumque fibrarum tonum contrahendo, firmando ac roborando, ut adeo pateat, aquas thermales potissimum convenire cacochymix pituitosæ ac serosæ, affectibusque frigidis pituitosis & serosis sine omni intemperie calida, hinc etiam in universum mulieribus magis quam viris salutares existunt, utpote frigidioribus, & magis pituitosis.

V.

A Generalibus ad specialia deveniendo conveniunt Thermæ in Paralyſi, modo affectus non ſit nimis radicatus in cerebro, peſſimè diſpoſito, ac ſpiritus animales adhuc ſint activi, nec omnino ſuperabundanti humiditate abſorpti, aut nimia viſciditate irretiti, item quàm maximè in Paræſi, quæ etiam balneatione acicularum tollitur in Chyragra, Podagra &c. non conveniunt, & quidem nec in Paroxiſmo, in quo motus veluti criticus, neque extra eum cùm cauſam ac radicem ejus in ſtomacho ac liquore gaſtrico hærentem non tollant, hinc teſte Timæo, Thonero, pluribusque alijs vix ullus horum uſu ab inſultibus Podagricis liberatus: plures tamen in vitæ periculum, vel graviora incommoda præcipitati fuerunt humoribus, vel magis attenuatis, fluxilibusque redditis, vel ijs ad partes nobiles ex robore articulis conciliato reſluentibus, vel articulis magis exinde laxatis, emollitis, & ad receptionem magis diſpoſitis.

VI.

Proſunt ulterius Thermæ quàm maximè in mulierum ſterilitate orta ex intemperie frigida, & humida, in chloroſi, in menſium ſuppreſſione vaſis uteri obſtructis à mucilagine pituitoſa, vel dependente à cruditate M. S. In nimio etiam eorum fluxu, ſcioriatum à nimia ſanguinis fluxibilitate ſeroſa, aut nimia ejus aquoſitate: non verò ſi à ſanguine bilioſiori, & acriori, item in fluore albo, nephritide, Iſchuria laxando, emolliendo ſpaſmos, ac contracturas ureterum ſiſtendo, ſicque vias, & meatus Patentiores reddendo, ut calculi, atque alia poſtmodum excerni valeant Item in urinæ incontinentia, ubi unicum & ſummum ſunt remedium. Quoad affectus externos conveniunt Thermæ in corpulentia nimia tum potatæ, tum pro Balneo adhibita in ſcabie

bie quacunque, & omnibus affectibus cutaneis, omni tandem cutis immunditie, inveteratis atque exedentibus ulceribus, fistulis, vulneribus & læsionibus minus ritè curatis, lepra incipiente Arabum, tumoribus Pedum ædematosi &c.

VII.

Sicuti autem in paulò ante memoratis affectibus ap-
primè conveniunt: ita nocent Contra Phisicis, Empyicis, Vomicæ, aut alio abscessu interno laborantibus, corporibus etiam nimium repletis sanguine vel cacochymia ob humorum colliquationem, ac fusionem varios excitantem morbos, cattarrhosis etiam, ac varias fluxiones patientibus, ictericis quoque, hydropicis, viscerum scirrho, vel ulcere detentis, obnoxijs quoque suffusioni, Erysipelati, ac abundantibus humoribus acris, biliosis, scorbuticis &c. Prægnantes etiam à quàm plurimis excluduntur, quia ex usu thermarum sæpius inveniuntur catamænia, vel supervenit purgatio aut alvi fluxus fætui nocivus, difficulter etiam thermarum fontes adeunt, quin aliqua molestia creetur, quæ tamen omnia intelligenda de gravidis jam longo tempore nempe 7. vel 8. mensium, vel gracilibus, macris, vel jam ante abortui obnoxijis, cum experientia contrarium testetur, gravidas primis saltem mensibus thermas sine ullo damno usurpasse, licet cautelâ hic opus, & mulieres tales constitutionis pituitosæ, aut serosæ sint, necesse sit. Metuitur quidem nimia prolis accretio, vel ejusdem suffocatio, cum tamen contrarium exempla probent, & absque hoc aquæ innatet fætus.

VIII.

Deveniendo tandem ad aquas minerales in specie hio
loci circa tractum Oenipontanum reperibiles, car-
temus quidem thermis propriè sic dictis, & per se cali-
dis,

dis, & æstuantibus, ut ignis ad miniculo non indigeant,
 sulphureas tamen frigidas, & limpidas habemus, & pri-
 mò quidem extra civitatem Hallensem *Balneum ad S.
 Crucem*, *das Baad beim H. Kreuz* / quod æstate præ-
 sertim haud exiguum sulphuris odorem spirat, fortius
 est, *Minsterense* infra Schwazium, *das Münsterer
 Baad*. His efficacius, & ad Thermas proximè acce-
 dens, utpote tepidum, & nonnihil fumosum, quod in
 monte *Brenner* insistitur, *das Brenner Baad* in affe-
 ctibus præcipuè externis ulcerosis nempe fistulosis ma-
 ximè præcellens. His balneis sulphureis omnes prædicti
 effectus plùs minùs conveniunt, in subjectis tamen ma-
 gis puitosis, & serosis quàm calidis, siccis & biliosis.
 Minùs etiam comòdè hæc aquæ potantur viscera interna
 nimis calefacientes, siccantes, & sitim tantaleam exci-
 tantes. Balneum etiam minerale habemus in *Seelrain*
 ad fontem rubrum, *das Seelrainer Baad beim ròthen
 Brunnen* copioso croco martis imprægnarum. Hoc
 mulieribus eorùmque affectibus præcipuè dicatum u-
 tilissimum in suppressione mensium, nimio eorum fluxu,
 obstructionibus viscerum, & uteri passione hysterica,
 abortùs præcautione, debilitate & laxitate uteri, fluore
 albo &c. interim minùs convenit admodum calidis
 gracilibus, siccis & biliosis. Aliud Balneum frequen-
 tatur in *Valle Volders*, *das Baad im Volder Thal* ni-
 tro, alumine, vaporibus Martialibus, & paucissimo
 sulphure imprægnatum, hinc calefacit, siccit, roborat,
 effectusque jam ante in genere propositos edit. Tem-
 peratiora, mitiora subiectis debilioribus, ac calidiori-
 bus magis apta balnea sunt: illud quod est in *Egger-
 bach* / & illud in *Pantirchen* infra halam nephriticis,
 & hypochondriacis multum proficua. Reliqua Bal-
 nea in *dem Venusberg* / in *dem Offenloch* / in *dem
 Rorschen Thal* minùs de mineralibus participant,
 sicque magis ad dulces accedunt,

§. II.

De Officio Medici in, ante & post Balneorum usum.

I.

UT balnea utiliter instituantur ; quædam ante quædam in, & post illius usum observanda sunt Medico. 1. Igitur pro exigente necessitate corpus purgandum, & quidem magis per Epicrasim lenioribus ut v. g. nodulo laxativo quàm fortioribus & drasticis ac vena, si opus fuerit, secanda. 2. Quo ad tempus anni, commodissimum præbent menses non errati, quia & dies magis protracti, tempus hilarius, ac homo ipse ad omnes curas magis dispositus, hisque temporibus nocentissima illa antiperistasis, ne ex balneo calido exeuntes lædantur frigido immediato præcavetur. 3. lunà decrecente, si fieri possit, illud inchoandum.

II.

Ratione temporis diei optimum est tempus matutinum: non exclusitamen horis pomeridianis. Anteprandium jejune si fieri possit balneandum: secus jusculum ex decocto. carnis vel Gallinæ in aqua thermali concedendum. Post prandium aquis non insidendum nisi 3. vel 4. horis à prandio, ne lædatur digestio, & varix cruditates generentur. Consultum est, manè hora quarta vel quinta surgere, balneum frequentare hora quarta vel quinta, ac post prandium hora tertia. In principio nec calidè, nec profundè insidendum, ita tamen, ut calor successivè aliquàlter intendi possit, cavendo tamen, ne quid nimis. Ex intensiori enim calore balnei succedunt vigilix, sitis, dolor capitis, defluxiones, lassitudines, appetitus prostratus asthma &c. dignoscitur autem calor intensior, si corpus ad introi-

G

tum

tem quasi aduratur, si facies more Galli indici ex candescens rubeat, aut corpus ipsum quasi sudore diffluat, intendatur siccis &c.

III.

Inseffus non sit nimis profundus, ac pluribus ad umbilicum tantum usque suadet, in quo tamen certa haud potest dari regula: Profundius enim insidere possunt seniores, Melancholici, Phlegmatici, ventriculum frigidiores habentes, qui etiam maiorem calorem ferunt, vel affectibus colli, scapularum vel brachiorum detenti: minus Juvenes Cholerici, æstuantem habentes ventriculum. Labrum semper sit mundum, tegendum mediâ parte versus collum asserculis ligneis: ex altera verò parte tapete, vel alijs integumentis, caput etiam linteis mundis circumligandum, & à calidis balnei ascendentibus vaporibus defendendum. Si aqua mineralis non per se sit calida, per trihorium prius spumosa ebullitione coquatur, & singulis inseffionibus renovetur.

IV.

Longitudinem & horas Balneandi quod attinet, communiter balneum primo die per horam: altero per duas vel unam & dimidiam, & sic singulis diebus per horam, vel dimidiam crescendo pergitur usque ad horas 5. 6. 7. tum per 12. 15. vel etiam 20. dies in eodem consistendum, vel eousque, donec quis se alleviatum senserit, & balneum quasi nauseaverit, quod signum perfectæ curæ, atque hinc denuo eo, quo ascensum est modo & tempore descendendum. Anteprandium semper plus temporis insumendum adeo, ut si de die per 5. horas balneetur balneum manè per 3. cum dimidia: vespèrè per 2. & dimidiam partem horæ balneandum sit, alij sequentem observant tabellam.

In-

Instructio fundamentalis

Qua ratione hora ingressus balnei sint observanda.

Die. Horis antemeridianis. Horis pomeridianis.

1	-	-	1	-	-	-	-	$\frac{1}{2}$
2	-	-	$1\frac{1}{2}$	-	-	-	-	1
3	-	-	2	-	-	-	-	$1\frac{1}{2}$
4	-	-	3	-	-	-	-	2
5	-	-	3	-	-	-	-	2
6	-	-	3	-	-	-	-	2
7	-	-	3	-	-	-	-	2
8	-	-	4	-	-	-	-	3
9	-	-	4	-	-	-	-	3
10	-	-	4	-	-	-	-	3
11	-	-	4	-	-	-	-	3
12	-	-	4	-	-	-	-	3
13	-	-	4	-	-	-	-	3
14	-	-	4	-	-	-	-	3
15	-	-	3	-	-	-	-	2
16	-	-	3	-	-	-	-	2
17	-	-	3	-	-	-	-	2
18	-	-	$2\frac{1}{2}$	-	-	-	-	2
19	-	-	$1\frac{1}{2}$	-	-	-	-	1
20	-	-	1	-	-	-	-	$\frac{1}{2}$
21	-	-	1	-	-	-	-	$\frac{1}{2}$

Modus ascendendi, & descendendi.

Interim tamen hæc tabula non est universalis, sed habenda est ratio naturarum, sexus, ætatis, temperamenti &c. multi enim de die ultra 4. vel 5. horas non tolerant præsertim biliosi, sicci, Melancholici: alij plures ut robustiores, & durioris texturæ homines, ut etiam ad 4. 5. vel 6. septimanas balneum continuare possint. Quilibet pro regula habeat vires, earumque conservacionem, ac balnei tolerantiam, qui enim lædicitur balneo, ac cui appetitus deſicitur, abdomen inflatur, ac alia perversa accidentia, quæ ordinario à balneo non procedunt, patitur, satius est, ut vel abſtineat, vel cautè balneo utatur. Interim nephriticæ, colico dolore laborantes, hysteriæ in principio Balnei alterationem sentientes, non statim deſistere debent, sed cùm certiori spe valetudinis pergere juxta vulgare illud. *Was das Baad bringt/ nimbe das Baad wieder hinweſt.*

V.

Finitâ lotionē corpus detergendum, lecto per diem saltem horam committendum, ac sudor forte superveniens non impediendus, si durante balneatione superveniat excoriatio, pruritus, maculæ, scabies &c. quod tamen non est necessarium, balneum tam diu continuandum, donec cutis lævigata priorem formam receperit, sit autem aqua tepidior, neque diutius eidem immoretur, sed sæpius de die in & exeat, oportet. Consultum etiam est, si nimis diu hoc malum protrahatur, indusia quædam in aqua thernali sæpius intincta, & per se exsiccata peractâ balneatione perpetuo gestare ac m. & v. partes excoriatas vino calido lavare.

IV.

Aër vitetur frigidus, & si talis sit, hypocaustum moderatè calefaciendum, vel corpus sufficientibus vestimentis etiam pelliceis tegendum, neque tamen etiam radijs solaribus exponendum, prandium & cæna semper æqualibus instituantur horis, ac quo parcius commeditur,

ditur; & bibitur thermarum tempore, eo melius est. Extra pastus vini usus vitandus. Urgente siti vel alias etiam circa medium balneandi tempus potus aquarum thermalium frigidarum post prandium, vel calidarum ante prandium cum incoctione sem. fenic. coriand. vel cinam. concedendus est. Longa mensa in prandio nocet: minus in cæna. caveatur à varietate ciborum, à satietate, ab acetarijs, infumatis, fructibus Horarijs, lacticijs, fritis, ex pasta coctis, nimium aromatizatis, saccharatis, salitis, flatulentis, cibi sint boni succi, ac laudabilis concoctionis, & paucorum excrementorum, ut carnes vitulinæ, hædinæ, capreol. leporin. juniores, capon. pull. gallinac. gallin. galli indic. avicul. mont. ex. plscibus trut. thymal. gobij, fundul. lucii minores, hordeacea, ova sorbilia &c. pro potu utendum vino albo diluto, pro cuiusque natura, & consuetudine. Alvus servetur laxa. Vitandi vehementiores corporis & animi motus.

VII.

TAndem etiam accidentium morbosorum usui thermarum subinde supervenientium habenda ratio, & *1. cephalalgia* per clyster. lotiones pedum, laxantia, frontalia, & unguenta &c. *Vigiliarum* per hordeata, emulsionem, pediluvia, frontalia: *Somnolentia* per clysteres acriores, frictiones, caput purgantia, vel cessationem à balneo, si notabilis sit. *Defluxionum* per diætam exquisitam, & aëris correctionem, vel cessationem à balneo, si gravis donec remittat. *Febris* per cessationem à balneo, & abstinentioniam vini. *Sitis* per Julepos accidos, emulsionem &c. *Inappetentia* per evacuationem, appetitum excitantia. *Alvi constipationis* per spinachium, pruna dulcia, poma cocta, ova sorbilia, pilulas Francofurt. vel Emanuel. clyst. vel suppositor. *exulcerationis seu efflorescentia cutis* per continuationem balnei blandioris & tepidioris, vel si etiam maior per v. G. purgationem, sudorifera &c. *mensium* per cessationem, si vehementius fluxus instaret; secus non.

§. III.

De Officio Medici in prescribendis nonnullis balneis artificialibus.

Balneum Thermale expertissimum Pauli Sorbaith.
*R. sulph. vir. apyr. calc. viu. an. lib. i. M. f. pulv. qui aliquot ebullitionibus coq. cum aq. font. mens. viij. hinc ab igne removeatur, ut subsideat & refrigescat per noctem, altero die fiat balneum plenum ex aqua font. calida, ad cuius refrigerium decantetur lixivium pridie ex speciebus extractum remanente in fundo olla pulvere. Post usum balnei ex eiusdem aqua tantundem re-
 affundatur ad olliam, in qua pulvis ille subsedit, serve-
 ritque reliqua balnei aqua in cupa bene recta. Altero
 die eadem aqua calefiat, & altera in olla existens iterum
 ad refrigerium reaffundatur per decantationem rema-
 nente semper in fundo pulvere. Taliter, quater procedi
 potest, hinc nova species recipiende balneum hoc tepo-
 rilton thermis vix cedit, omnihus nervorum, & arti-
 culorum doloribus, matricis affectibus, paralyfi, cal-
 culo &c. accommodatissimum. Ab experientia ar-
 thriticis eximias excoiationes creat, quibus copiosus
 evacuator ichor cum levamine.*

Balneum in Nephritide. *R. herb. veron. pariet. mer-
 curial. malv. cum tot. saxifrag. ononid. an. m̄j fl. cham.
 m. iij Sambuc. m. ii. rad. alt. petrosel. fanic. an. unc. j. S.
 sem. lin. unc. iij. fanugrac. an. unc. j. bacc. Iunip. unc. iij.
 M. incis. dentur S. species juu. Baad.*

Aliud. *R. Stramin. aven fl. calend. an. q. S. M.*

Balneum in scabie. *R. rad. oxylap. unc. ij. ennul.
 camp. malv. an. unc. i. herb. saponar. nepeth. fumar.
 agrim. veron. an. m. ii fl. chamom. m. ii. herb. s. emoll.
 an. m. i. bacc. laur. unc. i i. sulph. viu. nit. alum. an.
 unc. ii. M.*

Aliud

Aliud. *R.* rad bryon. unc. i. oxylap. irid. flor. an. unc. i. ennul. camp unc. ii. herb. fumar. scabios mercurial an. mi. alum. dr. vi. sulph. dr. x. tart. unc. i. S. M. S. Kräuter vnd species zum Baad.

Balneum in fluore albo. *R.* herb. arthemis. calam. puleg. meliss. ment satur. hyssop. serpill thym. orig. absinth. ros. rub. cham. melil. an. mi. rad. c. per. long. calam. aromat an unc. S. Irid. flor. unc i. S. Gumm. ladan. unc. i. sacculo inclus. coq. in S. q. aq. pro Baln. herbæ singulis tribus diebus renoventur ut sinum muliebrem intimius penetret, per syringam annexa vesica suilla aqua intropellatur, vellana eadem aqua benè madida in uteri collum intrudatur.

Balneum in suppressione Mensium. *R.* rad. aristol. lil. alb. arthemis. alth. rub. tinct. aa. unc. iii. sem. lin. unc. vi. fanic. unc. i. carv. cumin. petrosel. an. unc. i. S. bacc. laur. unc. iii. Juniper. unc. vi. herb. malv. melilot. puleg. meliss. mercurial. an. m. ii. fol. sabin. m. iv. fl. cham. m. iii. cent. min. mii. incis & conquass. includ. saccul. qui ex aq. S. q. coq. pro infessu & fotu muliebrum. prodest etiam hoc balneum in partu difficili, fætu mortuo, retentisecundinis &c.

Aliud efficacissimum teste Riverio. *R.* rad. alth. lil. alb. ennul. camp. bryon. cucum agreß. an. lib. ii. fol. malv. violar. Mercurial. puleg. matricar. meliss. an. m. iv. sem. lin. fanograc. leviter contus. an. unc. ii. coq. in aq. S. q. pro Baln. usu hujus balnei aliquando in tertio vel quarto balneoprofluxerunt menses per longum tempus retenti.

Balneum adstringens in procidentia uteri. *R.* fol. beton. agrim. salu. laur. roris. myrt. puleg. orig. fl. stach. arab. balanst. an. mi. rad. consolid. m. unc. iii. bistort. torment. aristol. long. an. unc. S. alum. roch. unc. ii. M. incis. dentur ad chart coq. in aq. fabra pro Balneo.

Aliud. *R.* herb. ment. puleg. orig. hyssop. rut. meliss. serpill. salu. maior. lavend. an. mi. nuc. cupress. ros. rub.

spic. nard. cort. gran. capul. gland. an. unc. j. mespil. im-
mat. acac. an. mj. scob. lig. luniper. quaiac. an. unc. s.
sal. nit. sal. commun. an. lib. s. alum. lib. j. M.

Balneum contra atrophiam Hecticam. *R. Amygd.*
cum cortic. grosso modo contus. lib. ij. farin. hord. lib. ij. in-
dantur sacco ampliori, & coq. in ahen. cum aq. plu. S. q.
tertio die renovetur.

Balneum Hordeaccum Gersteno Baad. *R. Hor-*
dei. crud. si simul abstergendum, vel excorticat. si magis
refrigerandum, & humectandum 2. oder 3. grosse
Masl. saccul. indit. coq. in S. q. aq. pro Baln. Tercio
vel quarto Balneo renovetur hordeum.

Balneum articulos, nervos & ligamenta roborans.
R. herb. absinth. arthemis. orig. hyper. serpill. lavend. an.
mij. roris. maior. an. mj. rad. alth. asar. lil. alb. an.
unc. s. fl. cham. sumit. aneth. an. mij. turrior. abiet. conor.
seu strobil. eiusdem an. mij. sem. lin. fanug. an. unc. s. M.
incis. & contus. pro Balneo.

Aliud in hunc finem parari solet ex solis summatibus,
& baccis luniper.

Balneum formicarum. *R. Formicarum integrum cu-*
bille, quod sacculo inclus. coq. in S. q. aq. pro Baln. adden-
do subinde alias herbas, vel etiam Mineralia. prodest in
Paralyti, dolore Ischiatico. &c.

Balneum antiparalyticum. *R. Alum. sulph. bacc.*
laur. an. lib. j. bacc. & sumit. luniper. an. mij. vel ij. sal. v.
nob. mij. M.

Aliud. *R. Herb. maior chamad. chamapyth. fol. pri-*
mul. Ger. an. mij. roris. sal. an. mij. fl. lavend. primul.
Ger. an. mj. bacc. luniper. mij. sulph. lib. ij. nit. lib. i. M.
pro Baln.

Balneum expertum in sterilitate. *R. Rad. bryon.*
imperat. Valerian. treos. ennuh. camp. an. unc. ij. fol. mai-
or. arthemis. nepet. puleg. mercurial. sal. laur. an. m. s.
bacc. laur. luniper. an. unc. i. coq. in S. q. aq. pro semicup.
alii etiam addunt acerbum formicarum. Sedeat in hoc
balneo noctu cubitum itura per 1. horam: hinc eg-
gressa,

gressa & absterfa calidis pannis in sellam perforatam se-
deat ac fumum excipiat ex *thur. mast. succin. benz. gumm.*
tacamah. gumm. anim. troch. alipt. mosch. &c.

Balneum Carminativum, & anodyn. in Colica. *R.*
Herb. orig. calam. rut. an. mij. fl. chamom. mij. mals. cum
tot. misß. melis. mj. sumit. aneth. mij. sem. lin. unc. ii. fa-
pug. unc. i. aneth. unc. i. S. bacc. juniper. unc. iii. incis. &
conquass. coq. in. S. q. aq. pro Baln.

§. IV.

De Officio Medici in consideranda vi & ef-
fectu acidularum tam in genere, quàm
specie.

I.



A*Cidula* (quæ nihil aliud sunt, quàm vitriolum
martis dissolutum: fit autem vitriolum martis,
quando minera martis dissolvitur, a spirit. sulph.
acido) varijs etiam modis probari solent, ut supra di-
ctum de thermis. Optimus est per præcipationem:
fallax econtra, quæ fit per destillationem, & evapora-
tionem tum quia multum de volatili substantia eva-
nescit, tum quia remanens mediante igne alteratur, ac
aliam acquirit texturam. decoct. Gallar. infusum acidu-
iàs nigrore tingit, si *de marte* participant. Infusa aqua
salsa turbantur, & quasi lactescunt, si *de nitro* quid par-
ticipant. Si quid *de alumine* optimè evaporatione,
dignosci potest. Nobis hic Oeniponti in usu practico
sunt *Bruzenses*, *der Bruger*, *Saurbrunnen* / & *Ægra-*
na seu Ægrenses, *der Eger*, *Saurbrunnen*. Illæ mar-
tiales, vitriolicæ, sulphureæ & aluminosæ: hæ prio-
ribus magis efficaces, licet minùs gratæ nitrosa salina
sulphurea aciditate præpollent.

II.

Vim suam in corpore exercent acidulae suaviter calfaciendo humiditates superfluas abluendo, & exsiccando, salia sylvestria sanguinis contemperando: hinc æstum viscerum corrigendo, Scorias tartareas ex latice & tota massa sanguinea everrendo, & elutriando tum per alvum, tum per urinam & sudores, viscerum, ac vasorum infarctus detergendo, discrasiam viscerum emendando, ac partibus tandem debitum tonum restituendo: Præterea salia acida vitiosa in corpore absorbendo, & per inferiora eliminando. Dum enim potatur aqua acidula fermentum stomachi acuit, atque exaltat, hiuc singulatis fames: hinc ventriculum à quisquilijs elutriat, tonum fibrarum restaurat, & dum ad intestinum duodenum defertur, vi bilis alcalina pars metallicamartis præcipitatur, quæ postmodum iterum apræst ab omni acido præternaturalem alterationem suscipere, acidum in tertium quasi falsum immutare, illud destruere, absorbere, & hinc excrementa nigro colore plerumque tinguntur, ut illud postmodum per alvum: sæpè etiam per urinam & sudorem eliminetur.

III.

EX dictis patet, quòd, sicuti thermæ magis pro sunt in cacochymia pituitosa & serosa, ita acidulae magis in cacochymia biliosa, & Melancholica. Ut autem ad specialia deveniamus, sciat Medicus acidulas prodesse. 1. In affectibus capitis non quidem essentialibus, sed per sympathiam partium inferiorum excitatis à corruptis & vitiosis humoribus ibidem stabulantibus, ut v. g. in Catarrhis calidis, acribus, salis, vigilijs, vertigine, tremoribus, convulsionibus, ac epilepsijs, si fomes morbi sit mesenterium, lien, uterus, ventriculus, vel causæ sint lumbrici. Item in



cephalalgijis, & hemicranijs ex vitio sanguinis, aut chy-
lificationis oriundis. In metu apoplexiæ cautè ijs
utendum. Pareses & contracturas, si non omninò in-
veteratæ fuerint radicitus extirpant tam potatæ quàm
Balneo adhibitæ.

VI.

PRætera quoque auferunt ruborem faciei, oculo-
rumque; singulariter verò fermentum ventriculi
erigunt, unde appetitum procurant, digestionem pro-
movent, ructus ejiciunt, cardialgias, sodas & vomitum
maximè matutinum materiæ pituitosæ, & aquæ quàm
vulgo, das Herk-Wasser appellant, compescunt, in-
flationes ejus sopiunt, & mineram flatuum evacuant;
præterea prosunt inveterum antipraxia, vel R. R. chy-
losi læsa, obstructionibus viscerum, lèteritia, chlo-
rosi, & specialiter in Colica convulsiva vomitibus in-
festante, ac malo hypochondriaco, cujus sunt quasi
sacra anchora, ac alter Rhizotomus.

V.

Item maximè conducunt, in Nephritide, Gonorrhæa
Arrhritide Rheumatismo, Scabie, fluore albo, sup-
pressionem mensium, eorum superfluitate, vermibus
quoque, quorum certissima sunt antithodus, sterilitati-
bus quoque multoties opitulantur, febres omnis gene-
ris intermittentes tollunt non tam Potæ diluendo crudi-
tatem nidorofam, ac infringendo acidum volatile oleo-
sum etiam corrosivum, verum etiam, si in ijs balneetur
præsertim imminente rigore. Malignis quoque feбри-
bus prosunt diluendo, inflammatos spiritus potenter
ligando ac pacando. eosque sua vitriolacea, ac quada-
tenus anodynavi sopiendo, ac causam occasionalem
irritantem emendando,

V I.

Quo ad affectus externos juvant acidulae praesertim omnis generis arthriticos, Ischiaticos, Podagricos, opthalmicos, & singulariter Paralyticos ex colica per modum Balnei adhibita. Tollunt calidè gargarizata scorbutum oris. Virtus quoque illis adscribitur medendi ozæna, vermiculis aurium &c. Balneo usurpatæ conducunt, etiam in pruritu, Scabie, Serpigine, ulceribus sordidis, corrosivis Rheumaticis, Phagadenicis, & disepuloticis, fluore albo, sterilitate, suppressione mensium &c.

VII.

Sicuti autem acidulae in modo dictis affectibus prosunt, ita necesse est, bibentes praeditos esse stomacho robusto, pulmonibusque validis cum omnibus ad Phrysim pulmonalem inclinantibus acidulae insensissimus hostis sint: hydropici quoque ex eorum usu plerumque intereant, nocent quoque magis, quam prosunt, ubi viscera haud integra, ac vel scirrho vel abscessu, aut tuberculis detenta. Omnia igitur prius benè examinanda, causaque morborum perpendendæ antequam a groto acidularis cura praescribatur.

S. V.

De Officio Medici in, ante, & post usum acidularum.

I.

Ante usum acidularum corpus evacuandum non quidem fortioribus M. S. exagitantibus, & turbantribus, partesque solidas lædentibus, sed portione quadam mannata, vel Rhabarbarina, vel pilul. Emanuel. aut nodulo laxativo, &, si opus, licet ut plurimum

rimum necesse non sit, vena secanda. Tempus optimum bibendi acidulas est *Majus*, *Iunius*, *Iulius*, *Augustus* nam

Mensibus in quibus R. non debes bibere VVasser.

Licet urgente necessitate etiam hyeme concedi possint, dummodo vasculum aquæ potabilis adhuc obturatum lente ad fornacem calefiat, vel per noctem in hypocausto calido steterit, vel aquæ calidæ immergitur, vel dum scyphus argenteus retinetur in aqua ferventi, & infunduntur unc. iij. vel iv. pro vice mox exhauriendæ.

II.

IN loco scaturiginis bibens manè hora 4. vel 5. surgere debet, excrementa per meatus convenientes excernere, ac una vel altera hora post solis exortum fontem sine violento motu frequentare, & quidem jejunius nisi esset tenerioris constitutionis, ac humoribus præditus tenuibus, fibrisque satis raris, & exilibus, quo in casu vel jusculum carnis, aut ovum sorbile, si confortantia ex officinis non videantur sufficere, concedi potest: immo in hoc passu, ne ventriculus ita debilis à frigore fontis lædatur, conducibilis est, calidiusculè modo supra dicto lymphas potare.

III.

Bibitutus ac prædispositus, dum ipsum fontem adiit, vel eò vectus est, aquarum potum incipiat inchoando à 2. 3. vel pluribus vitris successivè ebibitis, prout appetitus exigit, ac natura non gravatur, hinc singulis diebus unum, 2. vel 3 vitra addendo, usque dum devitiatur ad eam quantitatem, quam quis haurire poterit absque ullo incommodo ut v. g. gravitate, dolore, flatibus, vomitu &c. habita tamen semper ratione ætatis sexûs, constitutionis fortis vel debilis, capacitatis ventriculi, ac consuetudinis maximè autem respiciendum ad tolerantiam. In acidulis Bruzensibus 4. 5. 6. 8. &c. mensuræ bibuntur. In Egræis quotidie ampulla terrea

Rin

Et in Eger= Saurbrunnen= Glaschen ebibitur, Eorum-
 que vel 8. 9. ein halbe Truch, ein halbe Eur vel 16.
 aut 18. ein ganze Truch / ein ganze Eur absumuntur.
 Non autem una vice acidulæ actu frigidaæ affatim, &
 præcipitanter ingurgigandæ, sed 2. vel 3. vitra pro
 una via interpositis dein discursibus, levibus deambu-
 lationibus, assumptis stomachicis ut *confect. sem. anis.*
fanic. condit. x. x. vel calam. arom. cort. cli. arant.
morsell. &c. ita tamen, ut tota mensura intra horam
 & dimidiam ebibatur.

IV.

Potus acidularum continuandus per dies 10. 15. aut
 20. immo per mensem, & ultra pro morbi magni-
 tudine & longitudine. In morbis contumacibus etiam
 anno sequenti frequentandæ: secus in levioribus, &
 prophylacticè tantum bibitis, sicuti autem in summa
 dosi, quæ intra triduum haberi potest, per aliquot dies
 perseverandum, & præsertim eousque, donec quis sese
 alleviatum (quod signum erit perfectæ curæ) sentiat,
 ita rursus gradatim denuo descendendum, nisi quis
 unam vel alteram tantum biberet mensuram, ubi de-
 scensione opus non est, olim etiam vesperi acidulæ
 methodicè bibebantur: hodiè verò ad sitim duntaxat,
 si fortè urgeat tollendam unum vel alterum vitrellum
 potari solet, vel in affectibus externis acidulæ ante-
 prandium potari, post prandium pro Balneo usurpari
 solent.

V.

Operatio acidularum diversa, & pro varia corporis
 complexionem, ac humoribus in eo prædominan-
 tibus, hinc motus naturæ observandus, ac per con-
 venientia loca adjuvandus. Optima est operatio, si
 primò per alvum; hinc per urinam, ac tandem per su-
 dorem operentur. Si per alvum, ut melius operentur,
 con-

consultum est, ut æger vel noctu hora. 1. Ante cæ-
nam sumat, vel pilul. alæcticas, ff. vel Emanuel. vel in
primo vitro acidularum dissolvat syr. ros. sol. vel ff. per-
fic. vel ita simpliciter in majori quantitate, vel pulv. syr.
aut rad. Gial. acuat. vel Crem. tart. acuat. vel su-
matur manè morsul. purg. &c.



VI.

HAUSTIS acidulis neutrquam violentis exercitijs uten-
dum, cùm etiam in lecto subinde non sine fructu
sumantur, sed reliquum tempus ad prandium usque le-
vibus deambulationibus, discursibus, ludis &c. tran-
sigendum ad aliqualem lassitudinem, & eruptionem su-
doris. Prandium etiam non accedendum, nisi hora xi.
vel saltem 4. horis ab assumpto potu, donec tota vel
potissima ejus pars sit excreta, ac urina priùs alba:
hinc nonnihil colorata fiat. Interim aquas initio po-
tûs, vel etiam in ascensu ægrè reddens, non tamen sta-
tim desistere debet, sed animosè perseverare, & sumi-
tatem curæ expectare, modo etiam intra 2. horas
transcat.

VII.

EFFICACIORES sunt acidulæ sudo, serenoqûe, quàm nubi-
loso, & pluvioso cælo, hinc etiam alio transpor-
tandæ hauriri debent tempore sereno existente, & qui-
dem omni anni tempore. Bruzenses nostræ mense Mar-
tio Collectæ optimæ, antequam nix colliquescens in-
timiora terræ penetrando fontem inquinet. Vitandus
igitur in cura acidulari aër intemperatus, frigidus,
pluviosus, nebulosus, hinc tali existente acidulæ do-
mi in hypocaustis calidis bibendæ, aut lectus
petendus. Interim etiam vitandi
radij solares.

VIII.



VIII.

IN Diætâ viranda satietas , multa ciborum varietas ,
 edulia falsa, nimis aromatizata, crassa, viscosa, dura,
 lacticia, legumina, acetaria, fructus Horarii, caro (villa,
 infumata &c. e contra convenit bubula junior, caro vî-
 tulina, vervecina, leporina, Hædina , volucres monta-
 næ, caro pull. gallinac. capon. columb. pisces saxat &c.
 pro potu vinum alb. merum, vel rubellum tenue non
 tamen acidulis dilutum. Fugiantur somnus meridia-
 nus, exercitia violenta, ludi intensi, mœror, tristitia,
 Irâ, venus, alvus quotidie sit aperta, secus vel enemate
 serò injecto, vel infusione sennæ ante potum sumpta,
 vel Crem. tart. acuat. in primo cyath. sumpto laxanda.

IX.

TEmpore curæ acidularum symptomatum emergen-
 tium quoque habenda ratio ut v.g. *retentionis aquarum*
 per laxantia ut Rhab. Gial. crem. tart. acuat. syr.
 ros. sol. acuat. vel per cessationem curæ. *Vomitûs* per
 clysteres, roborantia interna & externa, vel cessationem
 curæ. *Colica* per clysteres, vel cessationem. *suppressio-*
nis alvi per passulas, prunâ, poma cocta, spinach. ber.
 pilul. Emanuel. clyst. crem. tart. acuat. *Diarrhæa* vi-
 res diminuentis per abstersiva, tam per os assumptâ
 quàm clysteres injecta & roborantia. *Commotionis*
humorum excitantis quandoque dolores dentium, lum-
 borum, Podagram &c. per continuationem curæ, &
 abstinentiam à vino. *Fluxus mensium* per defensionem
 genitalium à frigore. & potationem acidularum ca-
 lidarum.

X.

Finitâ acidularum curâ mediantibus conviviis, & po-
 culis non valedicendum, iter domum versus citra
 festinationem instituendum diætæ deinceps exactè ser-
 vanda, aliquid acidularum domi adhuc si placet, bi-
 bendum,

bendum purgatio, si quis ex retentis aquarum reliquijs
 gravatum se sentiret, instituenda: secus eadem absti-
 nendum. Sicuti autem acidulæ efficaciores sunt ad
 scaturiginem potæ, quàm alio delatæ, ita etiam aci-
 dularis cura domi instituta (quod nonnull faciunt, vel
 ut sumptibus parcant, vel quod iter exhorrescant, vel
 ob occupationes urgentes domo abesse nequeant) ratò
 singulari cum fructu instituitur præsertim in ijs, qui
 manè acidulas ad plures libras ingurgitant: postmo-
 duum seriis negotiis hinc inde irretiti spiritibus alio avo-
 catis, & dissipatis ventericulum debilitant, vel ante pran-
 dium lymphis, post prandium verò Baccho litant,
 unde his magis consultum, ut omissa solenni cura
 manè lib. 1. vel. 1. S. bibant leviter desuper obambu-
 lando, & exactam diætam servando: post prandium
 etiam rursus vitrum acidularum hauriant, atque sig-
 curam ad 30. dies, & ultra continuent.

§. VI.

De Officio Medici in præscribendis remedijs pro debito usu acidularum.

R Confect. sem. anis. vel fanic. aut coriand. præp.
 lib. 1. detur ad scatul. S. Uniß. Ränichls oder
 Coriander, Zucker vnter dem Trincken deß
 Saur, Brunnens zu gebrauchen.

Morsell. R. spec. diarrhod. abb. aromat. ros. complet.
 an. dr. ij. cort. arant. condit. minutim incis. citr. an. dr.
 iij. nuc. mosch. in ind. condit. dr. ii. confect. sem. anis.
 fanic. coriand. an. scr. i. S. cardam. min. scrup. ij. sacch. in
 aq. ceras. nig. & cinam. dissol. q. S. M. f. morsul. S. Ma-
 gen. Strigelsen vnter den Saur, Brunnem trincken
 ein oder anders zu gebrauchen.

Alij. R. spec. pro Morsul. Imperat. unc. 1. condit. 2. 2.
 chinens. cort. cit. nuc. ind. condit. an. unc. 3. cardam. dr. i.
 S. cubeb. dr. ii. ol. dest. cinam. gut. 5. mac. gut. vii. cha-
 rioph.

rioph. gut. iv. cit. gut. ij. sacch. albifs. in aq. sasaph. cum cinam. destill. soluz. lib. 1. M. f. morsell. S. ut supra.

Alij magis temperati pro hypochondriacis. R. cort. cit recent. minutissimè quadratim incis. dr. ij. sacch. albifs. in aq. spirituos. cinam. dissol. unc. iv. M. f. Morsul.

Tragæa. R. spec. aromat. ros. diaxyloal. diarrhod. abb. an. scr. j. cinam elect. dr. i. nuc. mosch. dr. S. mac. charyoph. an. scr. S. sacch. albifs. unc. iii. M. f. trag. S. Magen = Triseth vnter wehrenden Saurbrunnen = Fur nach dem Essen mit Wein vnd Brodt zu nehmen.

Pilulæ laxativæ. R. Mass. pilul. FF: vel Emanueli dr. ii. formentur ex scr. 1. No. vii. aspergantur cinam. S. Frantzfurter = oder Emanuel = Pillulen / darvon 7. ein Stund vor dem Nacht = Essen zu nehmen.

Pulvis pro transitu acidularum promovendo. R. Crem. tart. dr. S. rad. Gial scr. i. M. f. pulv. dentur 8. dos. S. Laxier = Pülvertein / darvon eines inden ersten Glas Saur = Brunnen zertribner einzunehmen.

Alius. R. pulv. Epat. rub. scrup. i. diagrid rosat. vel sulphurat. gr. viii. (plus minus) M dentur 8. vel 10. dos. vel R. Crem. tart. dr. i. tart. vitriolat. sal. absinth. an. dr. S. ocul. canc. prep. dr. i. S. sacch. albifs. dr. ii. M. f. pul. ad scatul. S. vermischter Weinstein / darvon ein halb Quintl in dem ersten Glas Saur = Brunnen zu nehmen.

Syrupus pro eadem intentione R. syr. ros. sol. aur. vel fl. persic. lib. S. detur ad scitil. S. Rosen = oder Pfersich = Blühe = Safft / darvon 3. oder 4. Löffel voll in den ersten Glas einzunehmen.

Alius. R. syr. ros. sol. unc. iv. crem. tart. scr. i. S. pulv. syr. sem. mel. subact. scr. i. M. S. a. vel R. syr. de cich. cum Rhab. diaser. ros. sol. aur. an. unc. i. pulv. rad. Gial. dr. ii. M. S. Laxier = Safft / darvon zuvor wohl auffgerührter 1. oder 2. Löffel voll in den ersten Glas zu nehmen.

Morseli. pro eadem intentione. R. mag. Gial. gr. xiv.

xiv. Gum. gott. gr. viii. conf. cit. borrag. cort. cit. con-
dit. an. scr. i. ol. cinam. gut. ii. sacch. albiss. in aq. borrag.
& cinam dissol. q. S. M. f. morsul. N. 2. vel R pulv. rad.
Gial. dr. ii. spec. pro morsul. Imperat. crass. usculè incif.
flaved. cort. cit. rec. an. dr. i. sacch. in aq. ros. sol. unc. ii.
f. morsul. N. viii. aequal. magnitud. S. Purgier-Mor-
sellen / darvon eine vor Trindung des Saur-Brun-
nens zu nehmen.

Electuar. ad eundem finem. R. pulp. tamarind unc.
i. cass. extract. dr. vi. conf. ros unc. i. rad. Gial. dr. ii.
magist. scamon. dr. S. M. S. Purgier-Latwergen einer
kleinen Nuß groß mit den Saur-Bruppen zu nehmen.

C A P U T V, D E

Officio Medici in affectibus in-
dicantibus purgationem.

§. I.

De Officio Medici in humorum evacuando-
rum preparatione.

I.

Cùm experientia testetur, ac medicis in
praxi notum sit in quartana, scorbuto, affe-
ctione hypochondriaca, cachexiis, aliisque
morbis chronicis, & lentis purgationes fieri quandoque
graves cum torminibus, varijs spasmis, violenta hu-
morum agitatione, intestinorum exulceratione, deli-
quio, passione hysterica &c. quæ omnia symptomata,
cùm contingere soleant, vel ex acrimonia nimia & cor-
rosivitate humorum evacuandorum, vel quod iidem
nimium crassi, visceri, fixi, immorigeri & archæo

resistentes sint tactis etiam viarum impedimentis, ac exinde natis obstructionibus, indicant remedia præparantia, quæ nempe alterando vitiosas humorum qualitates appariant, & quasi præparant subsecutura reductioni. Nam ex Hippoc. 2. aph. 9. corpora ubi quispiam purgare vult, fluida faciat oportet. Vocantur etiam digestiva quasi pepasium, & coctionem humoribus inducentia.

II.

Præparantia seu digestiva alia dicuntur *universalia*, quæ generaliter motui humorum promovendo, conveniunt, quæ sunt polychresta, & maxime infimi ventris cruditatibus corrigendis debita, ut v. g. crem. tart. tart. vitriolat. &c. Alia *Particularia* seu *specialia*, quæ diversos humores peccantes respiciunt, & quadruplici cacohymia corrigendæ destinata sunt. Sic *bilem* præparant, quæ sal, vol. urinosum plus minus oleolum temperant, amaritiam ejus ac acrimoniam infringunt, obtundunt, saliaque diluunt, qualia sunt nitrata, aquea, acidula, & subamaricantia. *Melancholicam* quæ acidum fixum absorbent, in salsum mutant, obtundunt, diluuntque, qualia sunt terrea, urinosa, martialia, antiscorbutica, aquea, humoresque adustos diluentia. *Pituitam*, quæ ejus visciditatem corrigunt incidendo, attenuando, eamque fluxilem reddendo, qualia sunt aperientia, salsa, acida, amara, acia, aromatica. *Serum*, quæ salsum & acre ejus corrigunt, illudque nimis tenuè incrassant, qualia sunt glutinosa, mucilaginosà, oleosa, dulcia, terrea, & papaveracea.

III.

Pro legitima præparantium administratione Medici officium erit observare. 1. Ea potius convenire in morbis chronicis quam acutis. 2. Ex præparantibus seligenda, vel saltem admiscenda esse specifica, & appropriata, quæ vel huic aut illi visceri specifica ut v. g.

in suppressione mensium hysterica, in inappetentia stomachica, in affectibus capitis cephalica &c. Vel texturem fomitis morbifici specificam contraria specifica texture destruant. ejusque saporem p. n. emendant ut v.g. si acidum non in genere, sed austerum, acerbum &c. corrigatur. 4. Sensim ac sensim a debilioribus ad fortiora progrediendum esse.

IV.

Praeterea. 5. Notabit Medicus, praeparantia non nimis diu continuanda esse, & subinde interpolanda purgantia, ut, quod separatum ac digestum capitis mortui instar abstergatur, & evacuetur, unde in Germania, ubi longiores curae haud tolerantur, praeparantia & purgantia simul miscentur, ut contingit in nodulis laxativis, ut una fidelia duo dealbentur parietes. 6. Dulcia ut syrupos, qui in Italia praesertim praeparantium vices obeunt, in brodio carnis vel aquis destillatis dissolutos plus nocere quam prodesse, cum saccharata sint fermentativa, erodentia, stomacho hostilia, ac quosvis etiam succos corporis viscidiores, & minus activos reddant, hinc utiliora sunt digestiva in forma pul. decoct. succ. essent &c. 7. In agris calidioribus. siccioribus vel atrophiam laborantibus temperatiora, humidiora & liquidiora eligenda, ut brodia alterantia, serum lact. decoct. &c.

S. II.

De Officio Medici in praescribendis praeparantibus, seu digestivis.

I.

Pulvis digestivus in affectu hypochondriaco. *M. crem. tart. dr. j. chryst. tart. dr. S. sal. absinth. scolopend. fran. an. scr. i. ol. mac. scr. S. M. f. pulv. S.*

H 3

Dio

Diggestiv-Pulver / darvon ein grosser Messer = Spitz voll ein Stund vor dem Mittag = vnd Nacht = Essen auß einer Peterzimpl = Suppen zu nehmen.

Alius. R. chryst. tart. vel. pulv. Epat. rub. scr. i. v. sal. absinth. cich. an. scr. i. pulv. mac. scr. S. M. f. pulv. divid. in 4. p. eq. S. **Diggestiv = Pülverlein auff 4. mahl.**

Alius in febribus intermittentibus. R. crem. tart. dr. i. S. sal. absinth. cent. min. tamarisc. an. scr. i. S. frax. scr. ii. flor. armon. cum Marte sublimat. scr. i. M. f. pulv. divid. in ix. p. eq. S. **Fieber. Diggestiv = Pülverlein, Detur unus ex brodio decoct. rad. petrosel. tichor fænic &c.**


Alius in Cachexia. R. crem. tart. dr. i. tart. vitriolat. sal. absinth. an. dr. S. ocul. canc. prep. scr. i. M. f. pulv. divid. in 4. p. eq.

Alius in scorbuto. R. tart. vitriolat. sal. genist. absinth. an. scr. i. S. ocul. canc. facul. an. scr. i. eleosacch. cit. anis. an. gut. ii. cinam gut. i. M. f. pulv. divid. in 4. p. eq. detur una dos. ex leq. Brodio. R. herb. rec. cochlear. nasturt. aquat. acerol. Hispan. an. p. i. contusis affund. Brod. cara. non salit. & fervid. unc. iv. Col.

Pulvis absorbens VVedelij. R. vitriol. mart. gr. vi. conch. prep. ocul. canc. corall rub. prep. antim. diaph. Annab. antim. an. scr. S. laud. op. gr. i. ol. dest. Charryoph. gut. i. M. f. pulv. divid. in 6. p. eq. S. **Absuß = Pülverlein auff 6. mahl. Vtiles sunt in cardialgia, affectu hysterico, hypochondriaco &c.**

Julepus diggestivus in affectibus capitis frigidis. R. aq. fanic. hyssop. an. unc. iv. beton. salu. an. unc. ii. syr. de hyssop. unc. ii. de stachad. de beton. an. unc. i. oxymel. squillit. unc. i. S. essent. rorism. dr. ii. M. S. **Diggestiv-Tranckl** / darvon Morgends vnd Abends ein halbes Traggel zu nehmen.

Alius in affectibus mulierum frigidis. R. aq. hyssop. fanic.



fanic. arthemif. melifs. puleg. an. unc. iv. cinam. unc. ii. syr. aperit. minderer. unc. iii. de arthemif compos unc. iii. spirit. sal. gut. xxx. M. S. Diggeſtiv. Zulep auff 6. oder 7. mahl einzunehmen.

Alius antilcorbuticus. R. Syrup. ſceletyrb. Forreſt. unc. iii. syr. de cort. cit. de pom. f. an. unc. ii. aq. Scorz. q. S. clarif. & aromatiz. cum. aq. cinam.

Apozema diggeſtivum in affectibus peſtoris frigidis. R. rad. fanic. ennul. glych. an. unc. S. Ir. flor. dr. ii. herb. marrub. capill. ven. hyſſop. agrim. beton. an. m. S. ſem. fanic. dr. ii. urtic. dr. i. ſic. R. v. paſſul. min. dr. vi. in. ciſ. coq. in S. q. aq. font. in col. lib. i. S. diſſol. syr. depraſſ. de hyſſop. de liquir. an. unc. i. oxymel. f. unc. i. S. ſquillit. unc. S. aq. aſthm. unc. i. S. cinam. dr. vi. M. S. Diggeſtiv. Tranck auff 6. oder 8. mahl.

Aliud in affectibus Melancholicis. R. rad. cichor. bugloſi. an. dr. vi. polyp. q. unc. S. liq. dr. ii. herb. borrag. bugl. an. mii. capill. ven. melifs. ceter. an. m. S. fol. ſenn. dr. x. ſem. cit. fanic. anif. coriand. prap. an. ſcr. i. ſi Borrag. bugl. anth. an. p. ii. paſſul. unc. i. S. coq. in S. q. aq. font. ad unc. xv. in Col. diſſolv. syr. de fumar. de lupul. de cort. cit. an. dr. vi. M. f. apoz. pro. 3. doſ.

Succi diggeſtivi cum brodijs alteratis in affectu hypochondriaco. R. succ. depurat. & per aren. traieſt. cichor. borrag. endiv. vel agrimon. an. unc. i. Iuris pulli vel Gallin. in quo coct. ſint malv. endiv. melifs. lupul. unc. iv. M. pro una doſ & ſic pro ceteris interjectis ſubinde lenitivis.

Mixtur. & Eſſentia in obſtructionibus. R. ſpirit. ſal. ſpirit. tart. an. ſcr. ij. Elix. vit. matth. propriet. p. an. ſcr. i. M. ad vit. S. Diggeſtiv. oder eröffnende Mixtur oder Eſſenz darvon Morgens vnd Abends bey 15. oder 12. Tropffen auff einer Peterzimbl. Brühe zunehmen. Vel R. Elix. prop. p. ſcr. ii. ſpirit. ſal ſpirit. tart. aperit. penot. ſal. armon. an. ſcr. i. M. S. ut ſuprà.

Alia. R. Mixt. S. unc. S. Essent. cent. min. cochl. m. s. scolopend. dr. ij. tinct. mart. dr. i. S. M. S. ut supra.

Atque hæ formulæ sufficiant, ut pro varietate affectionum mutatis paulisper mutandis Neoptacticus has imitari possit,

S. III.

De Officio Medici in evacuatione corporis lenitiva.

I.

Cum catharsis, seu evacuatio per alvum alia dicatur *selectiva*, quæ è secunda vel tertia regione humores vi selectiva evacuat: alia *lenitiva*, quæ leniter, & sine vi primæ regionis quoscunque humores educit, de hac præsentī loco mentio faciendā. Intel- ligitur autem per primam regionem ventriculus, inte- stina, mesenterium, pancreas, lien, & pars concava Epatis, sicuti per secundam epatis pars convexa, vena cava, artetia aorta, & quidquid inter alas, & inguina situm est: per tertiam verò muscoli, ossa, omnisque corporis moles ad extimam usque superficiem,

II.

Indicantur medicamenta lenitiva, in quavis cacochymia, vel potius cacochylia primæ regionis, succis vitiosis jam a sanguinis commixtione separatis præsertim, ubi alvus non est aperta, & quando vel ob virium debilitatem, vel ob acidi excessivi copiam, aliorumque humorum fermentescibilem qualitatem, & effrænem spirituum excandescentiam ipsa purgantia vera exulare jubentur, ut v. g. in colica, hypochondriaca, affectu hysterico, scorbutico, Paræmatibus convulsivis, Spasmodicis, morbis acutis, febribus inflammatorijs, Morbis acutis puerperarum, gravidarum, Hæmorrhagijs, tabe, Hæctica, Phthisi &c.

S. III.

III.

Medicamenta lenitiva (dicta etiam laxativa, minorativa, eccoprotica, benedicta) virtutem suam in corpore exerunt, vel emolliciendo & lubricando, qualia sunt *aquea, mucilaginoso, oleosa, unctuofo, & pingua*, vel sordes detergendo, qualia sunt *salina, acti- dula, terrea* ut tartarea, nitrofa, falfa, vel leniter irritando & ftimulando, qualia sunt purgantia tum *leniora*, tum alia *minori dofi* exhibita.

IV.

Pro debito ufu remediorum lenitivorum obfervet Medicus. 1. Ea femper exhiberi poffe, ubi alvum apertam effe bonum eft fine etiam præcedente coctione. 2. Ea vel per os affumit vel per clyfteres infundi. 3. Lenitiva lubricantia magis convenire in ficcitate inteftinorum; ftimulantia & detergentia in eorum repletione. 4. Lenientia à multis commodiffimè exhiberi hora una ante prandium v.g. *pruna cocta* superbibendo parùm vini lymphati: ab alijs hora unâ ante cænam ut v.g. *pilul Francofurt.* 5. Pilulas lenientes aloëticas obafis magis convenire, quàm gracilibus, & hypochondriacis, in quibus pro nunc quidem juvant alvum apertiendo: in futurum autem nocent nimium exficcando & calefaciendo, hinc major poftmodum alvi ftipticitas.

V.

Præterea 6. notabit, cavendum effe, ne natura frequentioribus clyfteribus affuefcatur. 7. Remedia paffulata in alvi ficcitate cum vifcerum fervore & calore ceteris omnibus præferenda effe. 8. Pruna fubinde ob acidum occultum, præfertim in colicis affectibus minùs profuiffe. 9. Purgantia feu lenitiva plantis pedum, vel umbilico illita incerta & infida effe tormina læpiùs excitantia. 10. Huc quoque fpectare fuppoftoria, vel mellea, *die Hönig Stul. Zayftein* / vel globuli, *die*
H, *Winn*

die Wind-Kuglen / Bisam-Kuglen / irritando alvum
moventia.

§. IV.

De Officio Medici in prescribendis formulis remediorum lenientium.

PRuna laxativa facile Parabilia. *Rz. fol. fenn. s. scr. ii. 2. z. incis. scr. sacch. unc. S. ligata in linteolo coq. cum prun. dulc. N. xiii. in s. q. aq. addendo in fine Mann. dr. vi. M. S. Laxier-Zwetschen 1. Stund vor dem Essen zu nehmen.*

Alia. Rz. fol. fenn. s. unc. ii. 2. z. cinam. an. scr. ii. aq. endiv. vin. alb. an. unc. vii. infund. per hor. 10. bull. ad consumpt. 3. part. in express. prun. Hungaric. enucleat. ad lib. S. coq. ad syrup. consist. cum sacch. unc. ii. add. syr. ros. fol. unc. i. S. aq. cinam. dr. ii. M. S. Laxier-Pflaumen.

Alia. Rz. Prun. damasc. enucleat. lib. S. coq. ex S. q. aq. simpl. de Colat ferventiss. Rz. lib. i. S. fol. fenn. fol. unc. i. crem. tart. dr. ii. S. cinam. acut. dr. ii. stent. in infus per hor. 4. in loco calido, hinc ebull. semel. atque siturum, exprim. & col. colatura affundatur prunis. S. ut supra.

Passulæ laxativæ paratu faciles. Rz. passul. corinth. vin. alb. lot. unc. vi. fol. fenn. S. in linteolo ligat. unc. i. vel i. S. affund. laq. q. S. ut tegantur passul. leniter ebulliant, stent vase probe tecto in loco calido. s. vel 6. horis: hinc abiecto sacculo utere passulis pro atate & viribus patientis S. Laxier-Weinbeerlein.

Alia. Rz. fol. fenn. s. unc. ii. coq. in aq. lib. i. ad consumpt. 3. pars. in Colat. infund. passul. min. exacinat. lib. S. coq. ad mollit. add. syr. ros. fol. dr. vi. M. S. Laxier-Weinbeerlein / darvon 2. Löffel voll 1. Stund vor dem Nacht-Essen zu nehmen.

Alia

Alia. R. fol. senn. s. unc. ii. 22. dr. ii. cinam. macgalang. an. scr. ij. coq. in aq. font. lib. ij. ad consumpt. med. stent. in loco calido per noct. m. col. cum express. dissolv. sacch. alb. unc. vi. coq. ad consist. Iulep. cui iniciantur passul. vin. alb. lot. unc. vi. reponet in vase fictili S. **Apier-Weinbeerlein** / darvon 2. grosse Löffel voll gleich vor dem Mittag- Essen zu nehmen.

Alia fortiores. R. passul. min. mund. lib. S. vin. alb. opt. lib. i. stent. in infus per noct. m. ad sacch. alb. s. unc. iv. coq. ad consumpt. vin. hinc. insperge resin. Gial. subtiliss. pulv. scr. ij. M. exactissime.

Vinum passulatum Timæi. R. passul. mai. min. an. unc. ij. fol. senn. s. unc. i. cinam. acut. dr. ij. contund. in mortar. ad past. affund. vin. Rhen. opt. lib. iv. stent. in infus. per diem & noct. Colat. exprim. & col. per chart. emporat. S. **Weinbeerlein Apier-Wein** / darvon ein Stund vor dem Essen ein gutes Tisch- Glas voll zu trinken.

Aqua passulata ejusdem. R. passul. min. mund. unc. ij. ceras. nig. exsuccat. una cum nucleis unc. i. contund. in mort. marmor. ut fiat quasi pasta affundendo aq. flux. lib. iv. S. coq. ad remanent. lib. ij. in colat. ferventiss. infund. fol. senn. S. dr. vi. fl. viol. p. i. cinam. acut. dr. ii. stent in loco calido per hor. iv. Col. & filtratur per Chart. emporat. S. ut supra.

Alia vulgaris, & facile parabilis. R. fol. senn. s. unc. i. passul. min. unc. iv. cinam. dr. iii. fl. viol. m. i. Crem. tart. dr. ii. his super affunde aq. fervont. lib. iii. stent. per noctem, hinc Col.

Decoct. Prunor. tum fol. senn. crem. tart. sem. anis. cinam. &c. idem præstant.

Brodium Mannatum. R. Mann. el. ab. unc. i. ad 2. succ. cit. rec. express. dr. i. S. vel. ii. vel crem. tart. dr. i. M. dissol. in s. q. Brod. carn. vel Gallin. Col.

Aqua laxativ. Vienn. R. aq. laxat. Vienn. unc. iii. vel iv. succ. cit. rec. express. dr. ij. vel crem. tart. dr. S.

aq.

aq. cinam bugl. Vel. fl. n. v. ph. dr. ij. M. S. **Wienerisches Laxier Wasser** auff einmahl einzunehmen.

Aliavulgaris. R. aq. laxat. commun. lib. S. nit. prap. gr. xij. M. vel R. aq. laxat. vulg. unc. xv. muchar. Vel syr. ros. sol unc. i. S. crem. tart. scr. i. nit. prap. scr. S. M. S. **Gemeines oder vermishtes ordinari Laxier Wasser** auff einmahl einzunehmen.

julepus laxativus. R. sol senn. f. scr. xv. liquir. ras. scr. i. cinam scr. ij. contus affund. aq. fervent. lib. i. flent. per horam dimidiam. Colat. sine express. ada. syr. viol. unc. S. M. biantur unc. ij. vel. xv. subfrigid.

Pilul. laxat. R. Maß pilul. f. f. Vel Emanuel. dr. ij. formetur ex scr. i. N. vij. viij Vel ix. S. suo nomine Dore von 7. 8. oder 9. ein Stund vor dem Nacht-Essen zu nehmen. *Ad idem valent. pilul. Clariss. d. Gen. biiij vel aqua pendent.*

Pulvis laxativ. R. crem. tart. dr. ij. divid. ad. 2. p. aq. S. **Præparierter Weinstein** / darvon ein Pölslein auff einmahl ein Stund vor dem Essen auß einer Brähe zu nehmen.

Alius. R. crem. tart. dr. ij. diagrid. scr. i. M. f. pulv. S. **Geschärfpter oder vermishter Weinstein** / darvon ein oder anderer grosser Messer Epiz voll auß einer Fleisch-Brähe zu nehmen.

Alius. R. 22. tart. alb. an. dr. i. sacch. albiß. sol. senn. f. an. dr. ij. M. f. pulv. in juscule carnis Vel hausto vini exhibendus.

Alius Rhabarbarinus. R. crem. tart. dr. ij. Rhab. el. dr. ij. cort. fläv. arant. dr. i. M. f. pul. cujus dos. dr. i.

Bolus. R. caß. rec. extr. unc. S. Vel dr. vj. detur semel Vel bis in septimana.

Electuar. lenitiv. Borri. R. mann. el. unc. ij. syr. de alth. fernel. rosar. sol. violar. solut. pom. redol. cass. extract. pulp. tamarind. sol. senn. sel. pulv. an. unc. j. manna. con. rassa immisce Syrup. & his addere liqua. S. **Laxier-Latwergen!**

werden / darvon 2. oder 3. Quinſel / oder einen halben
Löffel voll zunehmen.

Aliud. ℞. caſſ. rec. extr. pulp. tamarind. an. dr. ſj.
mann. el. cum aq. Viol. diſſol. unc. i. S. pulv. fol. ſenn. dr. ij.
S. cum S. q. ſyr. Viol. M. f. Eleſt. moll. Gel R. pulp. paſſul.
min mund. tamarind. fl. caſſ. an. unc S. conſit. cort arant.
dr. ij. pulv. rad. Ciſal. dr. i. S. cum ſyr. de cich. cum Rhab.
S. q. M. f. Eleſt. S. ut ſupra.

Clyſter Domestiſticus ſimpliciſſimus. ℞. brod. carn.
lib. i. mell. crud. cochl. & ol. oliſ. cochl. & ſal. comm. dr.
i. M.

Alius. ℞. Brod. carn. non ſaliſ. lib. i. ſacch. rub. unc.
ij. ol. oliſ. & el. lin. unc. ij. & el. ij. cum Vitell. oſ. & pauco
ſale M. f. Clyſt.

Alius magis compoſitus. ℞. herb. matk. mij. fl.
chamom. mij. ſem. carv. dr. ij. coq. in ſ. q. aq. font. in Col.
lib. i. diſſolv. ſacch. & el. mell. crud. & el. mell. roſ. aus Mer-
curial. unc. ij. ol. oliſ. & el. ſem. lin. Violar. chamom. lil. alb.
unc. ij. & el. ij. & el. loco horum. butyr. rec. ſal. ſcr. i. M.

Alius lacteus. ℞. lact. Vaccin. rec. mult. lib. i. & el. i.
S. ſem. carv. dr. ij. ſubinde & fl. cham. m. i. coq. ad lib. i.
add. ſacch. rub. unc. ij. ol. ſem. lin. unc. ij. butyr. rec. unc.
i. Vitell. oſ. N. i. M. f. Clyſt.

Alius. ℞. decoct. emoll. lib. i. diſſolv. caſſ. extr. pro clyſt.
dr. ſj. ſacch. rub. unc i. S. ol. amygd. lil. alb. chamom.
an. unc. i. Vitell. oſ. dr. i. ſal. ſcr. i. M. f. clyſt.

Suppoſitorium. ℞. Suppoſitor. ex melle parat. N. 2.
S. Hönig. Stuhl. Zapſlein / eines nach dem andern
zu gebrauchen.

Aliud fortius. ℞. Vitell. oſ. ad durit. coſt. N. i. ſell.
boſ. liquid. q. ſ. M. f. ſuppoſit. quod Viennæ. Das Kane
ſer Zapſl. Appellant, vel paretur ex ſapone, alumi-
ne, &c.

Plura vide infra de purgantibus.

§. V.

De evacuatione per alvum selectiva.

I.

Purgatio per alvum propriè sic dicta ex secunda & tertia regione evacnans indicatur à *cacochymia*, quæ est retundantia humorum vitiosorum à sanguinis consortio separatorum, vel eidem supernatantium, ut adeo pateat, purgantia in omnibus morbis convenire, qui dependent à saburrâ vitiosorum humorum sanguini haud intimè commixtorum, sicuti autem non tantum indicantium, sed etiam coindicantium, vel contraindicantium habenda ratio, ita etiam in purgatione hæc consideranda; vires nempe, temperamentum, habitus corporis, ætas, sexus, consuetudo, clima, &c.

II.

Quo ad *Vi*res, sint hæc ad purgandum semper validæ: vel saltem mediocres; præsertim autem à vehementibus purgantibus cautè abstinendum, nam ex *Hippoc. 1. aph. 3. evacuationes, quæ ad extremum ducunt, periculosa & 2. aph. 51. plurimum & repentiè evacuare periculosum.* Habent enim fortiora purgantia virulentiam quandam nocivam, ac malignitatem absconditam, quâ indiscriminatim tam recrementosi, quàm alimentitij corporis succi resolvuntur, colliquantur, ac inordes convertuntur, hinc vires maxime debilitant, tormina spasmodica subinde in manifestas convulsiones terminantia excitant, hypercatharstes tetras & perniciosas creant, ac mortem sæpè inferunt.

III.

III.

Quo' ad *Temperamentum* facilius purgationem ferunt, qui sunt temperamenti calidi & humidi, habitusque evsarchi & carnosi, quam corpora calidiora, sicciora, graciliora, vel nimis pingua. Quo *ad aetatem* facillimè fert purgationem ætas media, difficillimè infantia & senectus, & non nisi benigniorem. Tempore *Menstruationis* mulieres minimè purgandæ, neque etiam, si mox insint, *gravida* ex Hippoc. 4. aph. 1. tutius à mense 4. ad 7. evacuantur, dum ait. *Pregnantes purgabis, si materia turgeat, quadrimestres, & usque ad septimum mensem, sed hæc parcius.* Quia tunc temporis fœtus utero fortius adhæret sumptâ similitudine à fructibus arborum primò, & ultimo tempore facilius decidentibus. Hæc seculo purgationes lenitivæ, & blandiores quolibet ferè graviditatis mense exhiberi solent in morbis à cacochymia oriundis, seu urgente, seu concoctâ materiâ, ubi majus impendit periculum ex parte cacochymicæ morbum producentis, quam ex commotione à purgante excitata, licet tutius medijs, cautiùs verò primis & ultimis mensibus procedendum sit: immò, nisi cacochymicæ quædam gravidæ evacuentur, sæpiùs statim à puerperio in morbos graviores incidunt. *Puerpera* lochijs naturaliter fluentibus nunquam purgandæ, benè tamen, si quantitate diminuta, vel qualitate vitiosa peccaverint, non tamen in principio, sed materiâ coctâ transactis 8. 10. vel 12. diebus à partu, & quidem eò tutius, quo longius puerpera distat à partu. Teste enim experientiâ mulieres laborantes suppressione lochiorum, si post septimum, vel nonum fluxu alvi corripiantur, ut plurimum liberari: si verò primis diebus, puta. 2. 3. vel 4. ut plurimum interire.

IV.

Quo ad *aëris* statum, purgationi maximè conveniētes est *temperatus* *vernalis*, hinc *autumnalis*. de priorē *Hippoc. 6. aph. 47.* ait, quibus *venæsectio*, aut *medicamentum purgans* confert. *ijs* *verno* tempore *sanguinem* detrahēre, aut *medicamenta purgantia* exhibere oportet. Minus frigidior & æstivus ex *Hipp. 4. aph. 5.* ubi ait. *sub canicula & ante caniculam* *difficiles ac molesta* sunt *purgationes*. Feliciori successu etiam exhibentur lunâ decrescente quàm crescente, in qua humores & tumores augentur, interim hæc coincidentia aut contraindicatio desumpta ab astris, vel anni temporibus attendenda tantùm absente urgentia in purgatione præservativa. Quo ad reliqua *assueti* facilius purgantur, quàm *inassueti*: morbi *calidi* etiam minùs tutè admittunt purgantia validiora. Qui pravo etiam utuntur alimento, in purgationibus facilè in animi deliquium incidunt ex *Hippoc. 2. aph. 36.* tandem quibus *alvus* nimis *suppressa* catharticum exhibere minùs tutum est, nisi præmisso enemate,

V.

Quo ad *tempus* morbi purgationi aptissimum, illud est ejus principium vel declinatio. Nam ex *Hippoc. 2. aph. 29.* in principio morborum, si quid movendum, videtur movere, cum verò consistunt, ac vigent, quiescere melius est. Item 2. aph. 30. circa initia & fines morborum remissiora sunt omnia, in vigore vehementiora.

Ut autem Medicus hoc in passu ritè suo fungatur officio, observabit. 1. Purgationem lenitivam utpote evacuantem succos primæ regionis à sanguinis commixtione jam separatos semper fieri posse etiam sine præcedente coctione. 2. Purgationem selectivam etiam fieri posse non expectatâ coctione in principio omnium morborum defendentium ex vera cacoehymia humoribus pravis à sanguine, vel jam omnino separatis, vel eisdem

eidem saltem supernatantibus, dummodo absit febris continua. §. In morbis acutis cum febre ut v. g. febribus continuis, malignis, viscerum inflammationibus purgationem non convenire, nisi existente materiâ coctâ, vel turgente, & de his præcipuè intelligendus est aphorif. Hippoc. 1. aph. 22. *qua cocta, maturaque sunt, medicamento purgante educere convenit, non cruda, nec per initia morborum. nisi humores turgant, plerumque vero non turgent.*

VI.

UT autem allegatus aphorismus ritè intelligatur, sciendum materiæ *cruditatem* in alio non consistere, quàm in tali humorum statu, quo sanguini uniti, & intimè permixti naturalem ejus fermentationem turbant, & eam in effervescentiam febrilem concitant: *coctionem* seu *pepasmum* contra in debita separatione, & quasi præcipitatione per motum fermentativum, quo recrementa, & heterogenea salia ceu fæta instar capitis mortui à sero imbibita per viscerum cribra, & quasi filtra secerni, & per consuetas vias evacuari solent. Sicuti enim cerevisia novella, seu mustum turbidum per quæcunque instrumenta colatum non reddetur clarum, benè tamen quod fermentando depuratum fuit, ita quàm diu fæces recrementosæ per fermentationis motum separatae, aut præcipitatae non sunt, tam diu inutilis. immò perniciosa erit purgatio, nihil aut parùm educens, vel humores simul utiles evacnans, corpus liquefaciens: humores magis turbans, hinc tormina, animi delequia, verrigines, convulsionem ac sudores syncopticos excitant. *Turgescentia* tandem, seu *orgasmus* materiæ consistit in humoribus impetuosè in corpore discurrentibus, partèsque laceffentibus, & in vias evacuationis vergentibus, seu in impetuosâ effervescentia, dum materia morbifica abundans immoderatè nimis effervescit, & rapidè per vasa movetur instar musti ex vino generoso impetuosè nimis ebullientis, & vasa ui-

mis arcte conclusa rumpentis, hinc observamus in tali casu in principijs, vel augmentis morborum quandoque excitare vomitus, diarrhæas, aut hæmorrhagias symptomáticas. Cum tali tuigescenzia *Hippoc.* purgationem admittit statim instituendam, dum *4. aph. 10.* ait. *purgandum in valdè acutis, si ad sui excretionem invitet materia, eodem ipso die, differe enim in talibus malum est.* Cum periculum sit, ne humores mobiles impetu illo concitati in partem aliquam principem ruant, interim & hic magna cautela, & circumspèctione opus est, ne intempestivè irritentur crabrones, hinc multi in hoc casu præferunt purgationi venæsectionem.

VII.

Sicuti verò materia morbifica febrilis cruda de cura regulari evacuari non debet, ita de cura coacta cum subinde tollere oportet per purgationem *minorativam*, dum nempe humores pravi ita copiâ luxuriant, ut venæsectione tolli nequeant omnes, ut à natura sint veluti incoctiles vel insuperabiles, imminèatque magnum vitæ periculum, nisi per minorativam aliqua portio priùs tollatur, & natura allevietur. Vomitoria hoc in passu optima sunt sequente deinleni abstersivo cathartico de quibus infra. Præterea quo ad tempus purgationis in morbis exacerbationes vel Paroxysmos habentibus convenit purgatio die remissionis, vel intermissionis, vel ipso die Paroxysmi, ita tamen, ut effectum suum ante Paroxysmi invasionem compleat, quâ ratione *Pet. Monarv. apud Craton. l. 2. consil. fol. 417.* apparente aliqua coctione plurimas febres intermittente sustulit.

VIII.

Locus, per quem instituenda purgatio, demonstratur, tum à naturalium humorum, tum ab eorum subsistentia seu vergentia. Nam ex *Hippoc. 1. aph. 21. quæ educere oport.*

*oportet, quo maxime vergunt, eo ducito per loca confere-
 rentia. Quantitas purgationis ostenditur à quantitate
 humoris peccantis, cum omnis sit evacuandus. nec si
 minus, cammarina tantum commoveatur, vel si plus
 hypercatharsis excitetur. Evacuandus simul & semel
 totus humor, si materia pauca & vires robustæ, vel le-
 vioribus æger non moveatur, vel assuetus sit purganti-
 bus, aut corpus habeat durius, & laboribus exercita-
 tum: e contra partitis vicibus, & per epicrasim, si ma-
 teria multa, etsi vires robustæ, vel si vires debiles, aut
 æger à quovis assumpto facile purgetur, vel sit inasflue-
 tus, aut habitu corporis molli præditus. In dubio
 præstat naturam, haud satis perspectam, & cognitam
 mitioribus explorare, quam valentioribus temerè
 aggredi.*

IX.

*Signa perfectæ purgationis sunt appetitus rediens,
 urina denuo naturalis reddita, corpusque insigniter
 alleviatum. Sic Hippoc. quonque duo proponit signa, &
 quidem primum 1 aph. 23. si talia evacuentur, qualia
 oportet, & si plurima sint, & æger benè ferat. (id est,
 utilitatem ex purgatione recipiat. Alterum 4 aph. 19.
 ubi ait: qui potione medica, dum purgantur, non sitiunt,
 ipsorum purgandi finis non fit, donec siti verint, oriatur
 autem sitis non ob calorem, sed ex aliquali humilita-
 tis ventriculi, partiumque vicinarum absorptione.*

X.

*Medicamenta purgantia, licet ab humoribus, quos
 evacuare credebantur, veteribus alia dicantur
 Phlegmagoga, quæ pituitam, alia Cholagoga, quæ
 bilem, alia Melanagoga, quæ Melancholiam, alia
 Hydragoga, quæ humores serosos, alia mixtagoga quæ
 mixtos, alia Panchymagoga seu catholica, quæ om-
 nes humores evacuant, probabilius tamen est juxta R.R.*

nullum catharticum selectivè purgare, id est, specialem aliquem humorem educere, sed ab omnibus primò per irritationem fæces alvi ordinarias seu scybala crassiora, hinc aquosa vel saltem liquida bilem nempe, ac succum Pancreaticum, tandem mucosa, variâque heterogenea quæcunque in sanguine contenta eliminari, ita tamen, ut fæces seu sordes tam variæ, & subinde tam horridæ, & færentes non semper formaliter in corpore ita existant, sed tales evadant, nunc ex actione medicamenti colliquativa, & quasi putrefactiva, nunc ex ipsis remedijs tingenribus, & nauseosum aspectum excrementis conciliantibus, nunc etiam ex mutua sordium miscela tum inter se, tum etiam cum bile & succo Pancreatico.

XI.

Licet autem purgantia nullum selectivè humorem purgent, nihilominus tamen non promiscuè usurpanda, sed distinctio inter eadem facienda tum quia purgantia nonnulla præter vim laxativam alias proprietates certas conjunctas habent, tum quia subjectum purgandum nunc facilioris, nunc difficilius est laxationis, nunc certis affectibus obnoxium, qui per purgantia vel irritantur, vel exasperantur, tum quia materia evacuanda nunc plus: nunc minus obsequens, variûmque situm, & subsistentiam habet.

XII.

Vim suam catharticam exercent purgantia tum suâ acrimoniâ salino - - sulphureâ irritando tunicam membranaceo - - glandulosam ventriculi, & intestinorum, ac orificia ductûs Pancreatici, & choledochi, ac vermiculationes crebriores, & repetitas spasmodicas contractiones, atque contentorum excretiones concitando, tum vi fermentativa humores, seu massam sanguineam resolvendo, ejusque contenta nunc excrementitia, nunc etiam quandoque alimentitia alterando, co-

tum

rumq; texturam dissolvendo, fundendo, ac in liquaminis serosi consistentiam colliquefaciendo, ut adeo actus purgationis sit instar actus cujusdam febrilis, cum sanguis in sua mixtione turbetur, nova & insolida inducatur fermentatio, contextus glandulosi & fibrillæ intestinales irritentur, humores quasi à febre colliquativa, colliquantur, symptomata febrilia ut sitis, nausea, inappetentia, lassitudo, dolor capitis &c. excitentur: immò per abusum etiam horrendæ convulsiones, ac ipsa quandoque mors.

XIII.

QUO ad usum & regimen purgationis, observet Medicus. 1. In libera & electiva purgatione eligendam diem temperatam, ac vitandas esse lunæ quadraturas. 2. Assumendum esse purgans manè jejunè, nisi vel Paroxysmus manè infestet, vel urgens impellat affectus, vel animus sit sumendi pilulas, quæ, si leviores commodius hora una ante cænam, si fortiores, duabus post cænam assumuntur. 3. Purgantia potulenta calidè, vel potius tepidè propinata citius actuati: difficilius autem sumi & retineri ob nauseam, pro qua tollenda & Vomitu impediendo nares obstruendæ, linteculum vel panis tostus aceto madidus naribus admovendus, buccella cydoniati sumenda, vel cortex cit. aut amygdalæ, aut aliud saporem medicamenti obscurans mastlicandum, vel vino ac spiritu ejus os colluendum. 4. Aëtem ac potum frigidum hoc tempore cane pejùs & angue vitandum. 5. Si purgans nullam vel parciorem post 4. vel 5. horas operationem eliceret eadem promovenda erit suppositorijs, clysteribus, exhibitâ de super aquâ laxativâ, moderatâ deambulatione, & commotione, uti constat ex *Hipp. 4. aph. 14. & 15.* sicuti econtra si modum excedat purgatio, eadem sistitur somno, quiete, frictionibus, sudore, applicatis, & exhibitis adstringentibus, Theriacalibus & opiatis.

XIV.

PRæterea considerabit 6.to sumpto benigniori , & mitiori cathartico non desuper dormiendum esse : bene tamen quandoque post fortiora , quæ difficulter in actum deducuntur , ac vim purgantem fixius & tenacius inhaerentem habent. 7. Duabus vel tribus horis post assumptum purgans Brodium abstergeus , & abluens . addito , si libet crem. tart. immo ad secundam vel tertiam operationem cochleat unum vel alterum brodij assumendum esse. 8. Purgantia in forma liquida præsertim ex infusione parata citius , & cum minori molestia operari , ac imprimis convenire in temperamentis naturis , & affectibus biliosis ac melancholicis , uti etiam in tollendis obstructionibus. 9. Purgantia in forma pulveris vel pilularum minus convenire in siccioribus , tabidis , hecticis , Melancholicis febre detentis &c. e contra felicius operari in obessis , succulentis , torosis & carnosis subjectis utpote humidioribus. 10. Vinum generosum purgantium vim cohibere , hinc etiam utile est post purgationem circa noctem assumere parum theriac. cum hausto vini generosi , ut omnia iterum in paratum statum redcant.

§. VI.

De Officio Medici in præscribendis varijs remedium purgantium formulis.

In forma Potionis.

Manna Julepata. R. crem. tart. dr. ʒ. dissolv. in aq. tarax. vel viol. unc. ʒj. hinc lento igne dissolv. Mann. El. unc. iij. col. per pānn. linn. hinc clarif cum alb. ov. addendo parum aq. cinam. vel fl. namp. M. est potiuncula visu & gustu suavis Magnati-
bus

bus familiaris. S. Klares Laxter = Manna- Wasser auff einmahl einzunehmen.

Alia acuata & fortior. R. crem tart. dr. i. coq. in aq. font. unc. vi. in col. unc. iv. dissolv. Mann. el. unc. ij. vel ij. S. clarif cum album ov. & colat. add. pulv. syr. cum sem melon subact. gr. v. vi. succ. cit. aq fl. namph. an dr. i. S. M. S. Stärckers Manna- Laxter = Wasser Morgends nüchter einzunehmen/ vnd in 2. Stund hernach ein Brüh zu nehmen.

Potio lenitiva ex Manna. R. Mann. el. dr. vi. vel unc. i. dissolv. in aq. destill. vel laxat. S. q. add. syr. ros. sol. aur. de cich. cum Rhab. duplic. unc. i. S. vel horum loco syr. diafer. de mann. laxat. Horst. aq. cinam bugl. dr. i. S. M. f. pot. irroranda vapore cort cit rec. S. ut supra.

Alia utilis in febris. R. Mann. calab. unc. i. syr. ros. sol. unc. ij. Elect. lenit. flor. dr. ij. crem. tart. scr. iio cum S q. aq. Scorx. vel laxat. M. f. pot. aromatizanda cum succ. exprefs. cort. cit.

Alia nbique ferè usualis. R. fol senn. f. dr. ii. agar. vel mechoac dr i S. (Rhabarb. etiam si placet dr. S. vel tamarind unc. S.) sem. anis. z. z. an. scr. i. rad. liq. dr. i. passul. unc. S coq in aq. S. q. ad unc. iii. m. in col. dissolv. mann. el. unc. i. S. vel unc. ii. aq. cinam. parum. M.

Potio mannata cum extractis. R. Mann. el. unc. i. S. extract. diacarth. scr. ii. vel dr. i. mag Gial. gr. iii. aq. laxat. unc. iii. cinam. dr. i. M. Vtilis est in affectibus catharralibus, vel R. Mann. el. unc. i. vel dr. x. extr. diacarth. scr. ii. de Rhab. vel de citro solut. scr. i. M. f. potio brevis aspergenda od. cort. cit. rec.

Aqua laxativa Viennens. acuata. R. aq. laxat. Vienn. unc. iii. vel iv. crem. tart. dr. i. vel S. aut huius loco succ cit. rec. exprefs. dr. iii. pulv. syr. à gr. v. ad x. xii. aq. cinam bugl. vel fl. namph. dr. ii. M. f. pot. loco pulv. syr. etiam lumi possent mag. Gial. vel spec. diagiap. Mins ad dr. i. dr. S. vel scr. i. est potio suaviter, & energeticè purgans.

Alia vulgaris. *R.* aq. laxat. *Gul.* unc. *v. much.* ros. unc. i. *Vel much.* ros. *syr.* ros. *sol.* an. dr. *vi.* pulv. *syr.* a gr. *vi.* ad x. nit. *prap.* gr. xii *M.* S. a.

Potio ex infuso. *R.* fol. *senn.* sel. dr. ii. *agar.* *Vel mechoac.* dr. i. *S.* *Rhab.* dr. i. *cinam.* opt. *scr.* ii. *mac.* *ser.* S. f. in *u.* in *S.* q. aq. ros. cit. in *Cok.* dissolv. *syr.* ros. *sol.* aur. *mann.* *calab.* an. dr. *vi.* *Vel unc.* i. *M.* f. pot.

Alia Phlegmagoga. *R.* *crem.* tart. dr. i. *rad.* *mechoac.* dr. ij. *Scl.* *sem.* *fenic.* *Vel cit.* ex cort. dr. S. *incis.* *bull.* in *S.* q. aq. ad *consumpt.* 3. p. in *colat.* *infund.* *fol.* *senn.* S. dr. iii. *Rhab.* dr. i. *schan.* *scr.* i. in *col.* dissolv. *mann.* el. unc. i. *extr.* *diacarth.* *scr.* *iv.* *Vel dissolv.* (si bilis magis evacuanda) *elect.* de *tamar.* de *succ.* ros. a dr. ii. *syr.* ros. *sol.* unc. i. *mann.* el. unc. S. *Vel dissolv.* *mann.* el. *syr.* ros. *sol.* an. unc. i. *scam.* *sulph.* gr. *iv.* *M.*

Potio cholagoga. *R.* *Tamarind.* unc. S. *fol.* *senn.* S. dr. ii. *Rhabarb.* dr. S. *Vel dr.* i. *sem.* *anis.* *scr.* i. *coq.* in *S.* q. aq. *font.* ad unc. iii. in *col.* dissolv. *Mann.* *El.* *syr.* ros. *sol.* an. unc. i. *elect.* de *succ.* ros. dr. ii. (si *serum.* simul *evacuandum.*) *syr.* de *spin.* *corv.* unc. S. *Vel dr.* *vi.* *M.*

Potio Phlegma- - hydragoga. *R.* *Rhab.* el. dr. i. *agar.* *troch.* dr. i. S. *spic.* 22. *calam.* *aromat.* an. gr. *viii.* in *f.* *per noct.* in *S.* q. aq. *font.* *Vel destill.* *appropriat.* *mar.* *e.* *facta.* *le.* *vi.* *ebullit.* *ex press.* dissolv. *mann.* el. unc. i. *pulv.* *mechona.* *scr.* ii. *Vel dissolv.* *mann.* el. *Vel syr.* de *spin.* *cer.* an. dr. *vi.* *Vel unc.* i. *pulv.* *Gial.* *chryst.* *tart.* an. *scr.* i. aq. *cinam.* *bugl.* dr. ii. *M.*

Potio Melanagoga. *R.* *fol.* *senn.* S. dr. ii. S. *agar.* *opt.* dr. i. *cors.* *Elleb.* *nig.* *scr.* ii. *sem.* *anis.* 22. an. *scr.* i. *mac.* *cinam.* an. gr. *viii.* *fl.* *cord.* an. p. i. *passul.* unc. S. *caq.* in *S.* q. aq. *Boir.* *ig.* ad *consumpt.* 3. p. *stent.* *per noct.* in *col.* *expres.* dissolv. *Mann.* el. unc. i. S. *Vel ii.* *chryst.* *tart.* *scr.* ii. *M.* *Vel mann.* el. *syr.* ros. *sol.* an. unc. i. *M.*

Potio mistagoga ex *Electuariis* & *extractis* pro cura *vernali* vel *autumpali* usitata. *R.* *Elect.* de *succ.* ros. dr. iii. *diacarth.* dr. ii. *extr.* *Rhab.* *scr.* i. *Vel cnicopharm.* *scr.* ii.

ii. mann. el. unc. i. aq. lax. q. S. M. f. pot. irror. Sap. cort. cit. rec.

Alia. R. Elect. hier. cum agar. diacarb. an. dr. ij. Vel elect. diacathol. aut lenit. storenz. de succ. ros. an. dr. ij. Mann. el. Vel much. ros. aut syr. ros. fol. Vel de Cich. cum Rhab. duplis. unc. i. extr. diacarth. agar. Vel de cit. solut. Z&Velf. an. scr. i. M.

Potio purgans in fluxibus alvi. R. aq. laxat. Vienna unc. ij. Rhabarb. leister tost. & pulv. dr. S. syr. de cich. cum Rhab. triplicat. Vel de mirobal. cum Rhab. unc. i. aq. cinambugl dr. ij. M.

Alia. R. Rhab. el. pulv. & Vino albasirrat. dr. i. i. S. Vel ij. inf. in S. q. aq. plantag. manè in col. cum express. dissolv. mann. el. unc. i. Vel i. S. pulv. Rhab. scr. i. Vel dr. S. syr. de myrob. cum Rhab. Vel de cich. cum Rhab. 4. druplic. dr. vj. M.

Alia in Diarrhæa & Dysenteria utilis. R. Tamarind. dr. ij. fol. senn. l. dr. ij. cort. arant. dr. S. passul. min. p. ij. mac. scr. S. coq. in S. q. aq. ad 3. in colat. inf. per noct. Rhab. opt. dr. i. S. spic. gr. ij. mane colat. dissolv. mann. el. unc. i. syr. de myrob. cum Rhab. dr. vj. aq. cinam. dr. i. M.

Potio in fluxibus sanguinis. R. Mann. el. unc. i. S. dissolv. in aq. plantag. unc. ij. add. Rhab. pulv. dr. S. Vel scr. ij. syr. de cich. cum Rhab. Vel de myrob. unc. i. M. hæc eadem usurpari potest in gravidis.

Potio Cholagoga. R. Rhab. el. cort. myrob. cit. an. dr. i. S. pulp. tamarind. unc. S. fol. senn. sel. dr. ij. inf. per noct. in S. q. aq. destill. cich. manè facta levi ebullit in col. dissolv. mann. el. unc. ij. fl. nit. gr. vj. crem. tart. dr. S. M.

Alia. R. Mann. el. unc. i. S. elect. de succ. ros. dr. ij. ij. pulv. Gial. chryst. tart. an. scr. i. aq. lax. q. S. M. f. pot.

Potio Mictagoga R. agar. rec. troch. mechoac. an. dr. ii. Rhab. el. dr. i. S. fol. senn. S. dr. iii. zzz. scr. ij. mann. el. unc. i. S. his superaffund. aq. bull. unc. & stent in infus. per noct. manè facta levi ebullit. in colat. cum album. ov. clarif. dissolv. Elect. de succ. ros. dr. ij. Vel i. S. Crem. tart. scr. i. spirit. mac. Vel essent. cit. scr. S. M.

Alia. ℞. *Tamarind. unc. S. fol. fenn. S. dr. iij.*
Rhab mechoac. an. dr. i. S. cort. arant. dr. S. crem. tart.
scr. iv. fl. cord. an pi. sem. anis dr. S. coq. in S. q. aq. font.
stent in infus per noct. in col. express. dissolv. Mann. El.
dr. x. pulv. mechoac. scr. i. aq. cinameochl. S. M.

Atque hæc formulæ selectæ sufficiunt, ut mutatis
 pro varietate circumstantiarum mutandis millenæ for-
 mulæ ex arte concinnari possint.

In Forma Pulveris.

Pulvis Cornachinus cholagogus. ℞. *Crem. tart. a*
scr. i. ad ii. scamon. sulph. a gr. viii. ad xii. xv. ani-
tim. diaph. gr. vi. viii. M. f. pulv. S. Gall-Pur-
gier-Pulver Morgens nüchter in einer Brühe zuneh-
men / vnd 2. Stund darauff zu fasten.

Est pulvis in omni cacochymia sume utilis, si simul
 vomitum conciliare animus, add. gr. i. vel i. S. tart.
 emet. Minsich.

Pulvis hydragogus. ℞. *rad. Gial. rec. pulv. scr. i. S.*
vel scr. ii. scam sulph. vel Gumm. gott scr. S. vel magist..
Gumm. gott gr. v vi. tart. vitriol. gr. vii. M. fiat pulv.
S. ut supra.

Alius Mictagogus. ℞. *rad. Gial. rec. pulv. vel spec.*
de Gialapp. Mins scr. i. diagrid sulph. gr. ix. crem. tart.
scr. S. ol. destill. cinam vel fenic. gut. iii. M. f. pulv S. ut
suprà.

Pulvis Arthriticus; ℞. *rad. hermodact. turb. alb.*
gummos. Gial. scam. sulph an. scr. i. gummi. gott. gr. xvi.
sal. prunell gr. xii. M. f. pulv. divid. in 4. p. aq. S. Gliz-
der-Purgier-Pulver auff 4. mahl.

Alius. ℞. *Oss. human. calcin. vel rasur. cran. hum.*
turb. hermodact. Gial. fenn. crem. tart. diagrid. cha-
ryoph. an dr. i. M. f. pulv. subtilis. cujus dos. a dr. i. ad
scr. iv.

Pulvis purgans anthelminticus. ℞. *spec. diaturb. cum*
Rhab.

Rhab. scr. ii. scam. sulph. gr. ix. vel troch. alchand. gr. vi. vii. crem. tart. gr. xii. ol. destill. cort arant. gut. iv. M. f. pulv. S. Purgier = Wurm = Pulver in einem Mörb einzunehmen.

Alius. R. rad. Gial. rec. pulv. scr. i. vel dr. S. Mercur. dulc. gr. xv. sal. absinth. gr. iv. sacch. fin. vel cand. scr. i. M. f. pulv. S. ut supra.

Pulvis cholagogus. R. sal. absinth. crem. tart. an scr. i. diagrid. sulph. gr. xii. ol. destill. mac. gut. ii. M. f. pul.

Pulvis laxativus. R. Pulv. fenn. Montagn. scr. ii. spec. diaturb. cum Rhab. scr. i. diagrid. gr. iii. magist. Gumm. gott. gr. i. ii. ol. cinam anis. an gut. i. M. f. pulv.

Pulvis antihydopicus. R. Rhab. opt. scr. ii. pulv. exter. cort. Gial. scr. i. gumm. gott. gr. xiii. sp. vitriol. gut. v. M. f. pulv.

Alius. R. rad. Gial. pulv. dr. 8 mercur. dulc. ritè præp. gr. xvi. vel magist. Gial. gr. xii. ol. dest. mac. gut. ii. M.

Pulvis purgans in fluxibus alvi. R. Rhab. leviter test. à dr. S. ad dr. i. myrob. citr. scr. S. nuc. mosch. vel lign. alæ pulv. gr. viii. ol. dest. mac. gut. i. M. f. pulv.

Pulvis purgans carminativus. R. pulv. cort. flav. arant. Rhab. chryst. tart. an. dr. ii. ol. mac. gut. v. sacch. ros. tabul. ad pondus omnium M. f. pul. S. Laxier = Wind = Pulver / darvon 2. oder 3. grosse Messer = Spiz voll ein Stund vor dem Essen zu nehmen.

Pulvis solutivus usualis. R. refin. Gial. dr. ii. sem. melon. excort. scr. iv. misceantur exadissimè in mortario lapideo add. crem. tart. unc. S. confect. alk. dr. i. M. f. pulv. cu. us dos dr. S. ex brodio carnis.

In Forma Pilularum.

Pilulæ Cephalicæ. ℞. extr. coch. dr. i. troch. alchand. gr. xij. pulv. syr. gr. ʒj. ol. destill. fanic. gut. ʒ. cum S. q. aq. beton. M. f. pilul. No. xxxij. S.

Haupt-Pillulen / darvon xj. auff einmahl 2. Stund nach dem Nacht-Essen in ein Löffel voll Wein / oder bratnen Apffel / oder Panatell / oder in einem Saft / Salzen / außgeholtten Zwetschen / oder nassen Oblat eingewickelter zu nehmen.

Alia, ℞. extract. pilul. coch. aur. panchym. Croll. anser. S. troch. alchand. gr. ʒ. cum ol. succin. S. q. M. f. pilul. No. xix. deaur. S. ut supra.

Pilulæ Catharrhales. ℞. maß. pilul. de succin. craton. dr. i. mag. Gial. gr. xij. ol. destill. succin. gut. ʒ. cum S. q. aq. beton. M. f. pilul. No. xxxij. deaur. S. ut supra dos N. xi.



Alia usuales. ℞. maß. pilul. de Succin. crat. dr. i. S. maxocost. minderer. dr. S. troch. alchand. scr. S. cum ol. succin. S. q. M. pilul. No. c. xxx. deaur. dentur ad scatul. cum pulv. ros. rub. S. Cathar. oder Fluß-Pillulen / darvon die Wochen ein oder zweymahl, N. xj. auff einmahl einzunehmen.

Pilulæ ophtalmicæ. ℞. extract. coch. Gel lue major. scr. i. panchym. scr. S. troch. alchand. Gel magist. Gial. gr. ʒ. ʒ. sal. evphraf. gr. ij. ol. destill. fanic. gut. ʒ. cum S. q. aq. beton. M. f. pilul. No. ix. deaur. S. **Augen- und Haupt-Pillulen** auff einmahl.

Pilulæ Catholicæ. ℞. extract. panchym. Gel cathol. scr. i. troch. alchand. pulv. syr. magist. Gial. (Gel unius aut duorum simul commixtorum) ʒ gr. ʒ. ad ʒ. ʒ. ol. destill. fanic. Gellig. Rhod. gut. ʒ. cum syr. ros. sol. S. q. M. f. pilul. N. xi. deaur. S. **Purgier-Pillulen**.

Pilulæ simul anthelminthicæ. ℞. maß. pilul. de nit. Trall. scr. i. S. extract. colocynth. gr. ʒi. Gel mercur. dnle. scr. S. ol. destill. sabm. gut. ʒ. cum S. q. aq. Gel succ. absinth. M. f. pilul. No. xi. deaur.

Pilulæ



Pilulæ antihypochondriacæ. R. maß. pilul. tartar. querc. scr. i. de ammoniac. eiusdem scr. S. extr. Elleb. nig. gr. vi. resin. Gial. Gelsium sulph. gr. vi. cum S. q. aq. fumar. Vel tinct. tart. M. f. pil. N. xij. deaur. S. Milk. Purgier. Pillulen auff einmahl einzunehmen.

Aliz. R. maß. pilul. tartar. Schröd. scr. i. extr. cent. min. croc. an gr. so. Gum. ammon. gr. viij. pulv. syr. gr. so. & cum S. q. syr. de fumar. Vel de pom. N. f. pil. No. xi. deaur. S. ut Inpra.

Aliz. usuales. R. Aloes succotrin. scr. i. S. Gum. ammon. croc. mart. aperit an scr. i. mag. Gial. gr. xv. cum Elix. prop. S. q. M. f. Maß. f. pil. No. c. inaur. pro pluribus dosibus.

Pilulæ hydragogæ. R. Magist. Gum. gaud. gr. v. resin. Gial. gr. viij. extr. ennul. gr. vi. ol. dest. mac. gut. ij. M. f. pil. N. ix. deaur. ac sumantur ex aq. cinam.

Aliz. R. Magist. Gial. gr. x. elater. gr. v. ol. mac. gut. vi. cum S. q. syr. dr. cinam. M. f. pil. N. vii. deaur.

Pilulæ Melanagogæ. R. Extract. panchym. Vel med lanagog. quercet. Vel maß. pilul. tart. quercet. aut Schröd. scr. i. extr. Elleb. nig. scr. so. ol. dest. cit. gut. ii. cum syr. de fum. S. q. M. f. pilul. N. xi. deaur.

Pilulæ purgantes in lue venerea. R. extr. panchym. Troll. Elleb. nig. an. scr. S. resin. Gial. gr. vii. Vel mercur. dulc. scr. S. ol. destill. cit. gut. iii. cum S. q. syr. de fumar. M. f. pilul. N. xi. deaur.

Pilulæ antiarthriticæ. R. extr. panchym. scr. i. hermodact. gr. vi. diagrid. sulph. gr. iii. ol. fanic. gut. so. cum S. q. syr. ros. sol. M. f. pil. N. xxi. deaur. Vel R. Maß. pil. de hermodact. diagrid. sulph. an gr. vii. troch. alchand. gr. is. extr. calam. arom. gr. i. tart. Vitriol. gr. is. ol. anis. gut. ii. cum S. q. aq. arthrit. M. f. pil. N. ix. deaur.

Aliz. usualel. R. Extract. pil. coch. extr. troch. alchand. extr. Turb. an scr. i. extr. Elleb. nig. gr. xxv. extr. lign. alo. paon an gr. vi. tart. Vitriol. scr. i. ol. nuc. mosch. sal. anis. an gut. so. cum S. q. aq. epil. lang. & sal. M. f. pil. ex scr. i. N. vi. Sumantur 3. diebus ante & post nov. lunium, ita

ut prima die dua: secunda tres, & tertia 4. manè Ieiunè assumantur.

Pilulæ sanguinem mundificantes in scabie, & similibus affectibus. R. extract. panchym. Croll. mercur. dulc. an. scr. S. mag. Gial. gr. vii. ol. dest. mac. gut. ii. cum S. q. aq. ceras. nig. M. f. pilul. No. xxi. deaur.

Pilulæ Emanuelis uterinæ. R. mass. pilul. emanuel. dr. iii. extr. croc. gr. ix. castor. gr. iii. cum S. q. aq. melifs. M. f. pilul. N. LX. dentur ad scatul. cum pulv. cinam dos. N. vii. vel viii. si lubet potest addi stimulus de pulv. syr. vel magist. Gial.

Pilulæ stomachicæ. R. Mass. pilul. aggregat. vel angel. vel emanuel. dr. i. mag Gial. vel pulv. syr. gr. xii. ol. dest. absinth. gut. vi. cum S. q. aq. absinth. M. f. pil. N. xxxix. deaur. dos N. xiii.

In Forma Boli,

Bolus Melanagogus. *R. conferv. fumar. dr. ii. confect. alkerm. scr. i. extr. Elleb. nig. scr. i. resin. Gial. gr. iv. M. f. Bol. aspergendus sacchar. S. tartar. Brocken auff einmahl einzunehmen.*

Bolus Hydragogus. R. rob. sambuc. vel ebul. dr. ii. confect. alkerm. scr. i. resin. Gial. gr. ix. xii. ol. destill. cit. gut. ii. M. f. Bol. asperg sacch. S. ut supra.

Alius. R. conferv. ros. vel viol. vel fl. persic. dr. i. vel i. S. resin. Gial. gr. ix. vel xii. vel pulv. rad. Gial. gr. xv. Gurum. gott. gr. vii. vel viii. ol. destill. anis. vel fœnic. gut. ii. cum sacch. S. q. M. f. Bol.

Bolus cholagogus. R. conf. ros. vel pulp. tamarind. aut passul. vel cass. dr. ii. iii. pulv. syr. gr. viii. ol. dest. anis. gut. i. M. f. Bol.

Bolus in lue venerea & gonorrhœa. R. conf fumar. dr. i. vel. scr. iv. pulv. Gial. dr. S. mercur. dulc. gr. viii. syr. de rich. cum Rhab. parum M. f. Bol. vel. R. pulp. cass. rec. extr. unc. S. vel dr. vi. Rhab. el. pulv. scr. ii. vel

vel huius loco pulv. syr. vel mag. Gial. gr. vii. Mercur. dulc. scr. S. ol. dest. fenic. gut. iv. M.

Bolus purgans & anthelminticus. R. conf. fl. persic. dr. i. Mercur. d. a. gr. xv. ad scr. i. scam. sulph. vel mag. Gial. gr. v. vel rad. Gial. aut spec. de Gial. Mins gr. ix. x. cum S. q. syr. fl. persic. m. f. Bol.

Bolus purgans minutissimus. R. extr. diacarth. dr. S. resin. scamon. scr. S. sacch. qf. M. f. Bol.

Alius. R. rad. Gial. rec pulv. scr. i. gr. v. vel dr. S. Essent. cit. vel aq. aut syr. cinam. q. S. M. in mort. plano in bolum minutulum involvendum nebulis in einer nassen Oblat.

His Bolis apud principes & Magnates delicatulos & nauseosos Rolsinkius magnam obtinuit sui commendationem. Idem fieri potest cum spec. hier. pic. Galen. spec. diagialap. Mins. &c.

Bolus purgans ex Electuarijs. R. Elect. de ramarind. vellenit. vel diaprun. laxat. aut cast. dr. ii. pulv. syr. tart. vitriolat. an gr. vii. cum S. q. syr. viol. M. f. Bol. vel si serum magis evacuandum adde Electuar. pulv. Gial gut. gamand. gr. iv. ol. dest. anis. vel cinam vel cit. gut. i. M.

In Forma

Zulepi, Syrupi, spiritus vini, morsellorum emulsionis &c.

JUlepus purg. R. mag. Gial. gr. xii. pulv. syr. gr. iv. nucl. pin. N. ii. probè subact. add. Jul. ros. dr. iii. aq. cinam vel. ceras nig. unc. S. M S. a. S. Purgier = Jus
 Up auff einmahl einzunehmen.

Syrupus purgans. R. syr. de cinam vel rib. dr. iiii. pulv. syr. a. gr. viii. ad xii. aq. cinam bugl. dr. i. S. M. S. a. S. Purgier = Saft auff einmahl nüchter einzunehmen.

Alius.

Alius. R. Syr. rub. idā dr. ii. confect. alk. compl. ser. i. mag. Gial. Vel pulv. syr. sem. mel. subact. Vel in sp. Vin. dissolut. gr. viii. xii. &c. aq. cinam. bugl. dr. i. S. M. S. ut supra.

Spiritus vini purgans. R. Mag. Gial. gr. xij. spirit. ceras. nig. dr. ij. lul. ros. Vel Viol. dr. S. M. S. Purgier Brandwein auff einmahl.

Alius. R. Elix. Gut. Matthiol. dr. ii. mag. Gial. gr. xii. Vel pulv. syr. mag. Gial. an. gr. vii. lul. ros. scr. ii. M. S. ut supra.

Morsuli purgantes. R. pulv. rad. Gial. dr. ii. dia. grid. dr. i. crem. tart. unc. S. sem. anis. integ. dr. ii. sacch. in aq. cinam dissol. unc. iiii. M. f. morsul. obliniend. ol. cinam. charyoph. an. gut. ii. M. S. Purgier Morselfen / darvon ein halb Loth / oder 6. Quinel auff einmahl zu nehmen.

Alij magis Hydragogi. R. Magist. gumm. gott. dr. i. la. Vigelur in marmore cum ol. destill. mac. add. resin. Gial. S. a solut. dr. ii. cinam acut. scr. i. charioph. scr. ii. mac. scr. i. aromata grosso modo incid. & cum Sacch. in aq. cinam Sol. S. q. M. f. morsell.

Morsuli Imperatoris purgantes. R. Sem. melon. ex cort. unc. S. aq. ros. opt. unc. iiii. S. M. f. emuls. in qua dissolv. Sacch. albiß. lib. i. resin. Gial. dr. v. add. spec. pro morsul. Imperat. dr. vi. M.

Morsulus purgans pro una vice. R. spec. dial. mins. Vel rad. Gial. rec. pulv. gr. xv. magist. Gumm. gott. Scamon. an. gr. ii. condit. cort. cit. minutim incis scr. i. S. Vel confero. cit. borrag. an. scr. i. ol. cinam gut. ii. Sach. canar in aq. cinam dissol. q. S. Vel dr. vi. M. f. Morsul. S. Purgier Morself auff einmahl.

Emulsio purgans. R. Sem. melon. ex cort. a dr. S. ad dr. i. resin. Gial. a scr. S. ad gr. xii. scam. sulph. gr. ii. M. in asort. marmoreo affundendo sensim lul. ros. unc. i. M. f. emuls. S. Purgier Milch auff einmahl.

Alia. R. amygd. ex cort. N. iii. resin. Gial. gr. viii. x.

xy. conterantur simul; hinc affunde aq. ros. auc. S. syr. da cinam dr. i. M.

Alia. R. Amygd. excort. dr. i. nuc. pinear. dr. S. resin. Gial. gr. ix. aq. ros. ceras. nig. an dr. ij. cinam bugl. dr. i. S. M. f. Emuls. S. ut supra.

Atque hæ formulæ maximè inserviunt pro delicatis, & nauseosis ceteras purgantium formulâs respicientibus,

In Forma

Noduli aut sacculi laxativi.

Nodus laxativus v. g. in febribus intermittentibus. *R. rad. cichor. dr. ij. fanic. polypod. q. an dr. ij. Herb. absinth. Rom. card. b. cent. min. chamad. adiant. utriusque an pj. fol. senn. S. unc. i. S. agar. rec. troch. Rhab. el. an. dr. ij. Gial. dr. ij. passul. min. unc. i. cinam. Vel galang. min. dr. i. sal. tart. dr. ij. M. incis. & contus. ad saccul. ex sind. alb. S. Kräuter: Säckl auff anderthalb Maasß weissen Wein/ vnd ein halb Maasß destilliertes Cichori: Wasser anzusetzen.*

Nodus in obstructionibus viscerum Hypochondriacis. *R. rad. gram. cichor. bugloss. Vel filic. asparag. Vincetox &c. an. dr. ij. herb. meliß. m. i. cusc. adiant. alb. philisd. ceterach. Vel chamad. nob. agrim. absinth. pont. cent. min. an. M. S. fol. senn. S. unc. ij. Rhab. el. fibr. alleb. nig. an unc. S. agar. troch. dr. ij. cinam acut. dr. i. sem. anis. fanic. cit. an. scr. ij. cort. flav. arant. dr. S. crem. tart. dr. ij. M. incis. & contus. ad nodul. S. Kräuter: Raxier: Säckl / daran anderthalb Maasß weissen Wein / vnd ein Maasß Wasser / siedheisser daran zu gießen / zudecker in einem warmen Orth 12. oder 24. Stund stehen lassen / alsdann in einen Keller oder Gewölben zu thun/ vnd täglich ein Traggel oder minders darvon nüchter zu nehmen.*

Nodulus in suppressione Menſium. ℞. rad. bryon. dr. iii. aristol. rot. hirundinar. asar. an dr. ii. Herb. meliss. matricar. puleg. chamaed. nob. à mi. fol. senn. S. unc. ii. Rhab. el. unc. S. agar. troch. dr. vi. fibr. Elleb. nig. dr. iii. croc. orient. mac. an scr. ii. sem. anis. fanic. an dr. i. cort. flav. arant. dr. ii. cinam. acut. scr. iv. passul. unc. i. sal. tart. dr. iii. interdum etiam addi potest limas, mart. aut chalyb. prap. unc. S. vel i. M. incis & contus. ad nod. für anderthalb Maasß weissen Wein/und ein Maasß Wasser, dos. unc. v. vel vi. post aliquot coohlearia assumpta offe.

Vinum medicatum purgans ordinarium. ℞. fol. senn. S. unc. ii. agar. troch. unc. S. turpeth. opt. pulv. dr. ii. xx. incis. dr. i. S. nuc. mosch. ras. dr. i. herb. beton. card. b. agrim. ceterach. sumit. absinth fl. borrag. anth. an pi. incisa excipiantur sindone pro sb. iii. vin. alb. & lib. i. aq. borrag.

Vinum hydragogum probatissimum. ℞. fol. senn. S. unc. ii. rad. Gial. unc. S. troch. de rupat. de Rhab. an dr. ii. cort. ebul. median. sambuc. an dr. i. S. rad. Ir. rost. lapp. mai. an dr. ii. scyl. prap. dr. i. fol. gratiol. soldanell. an mi. tart. crud. venet. unc. S. passul. min. mund. unc. i. M. incis. & contus. ad nodul. pro mens. ii. vin.

Aliud antihydroticum. ℞. herb. absinth. card. b. cent. min. agrim. veron. Epat. nob. an. M. S. cort. zamarisc. median. frax. an dr. i. bacc. laur. Iuniper. an dr. ii. rad. raph. mar. bryon. ebul. asar. Elleb. nig. Irid. nost. polyp. Gialap. an. dr. ii. Rhab. nost. fol. senn. S. an dr. vi. xx. alb. dr. i. crem. tart. dr. ii. chalyb. cum sulph. prap. unc. S. sem. anis. fanic. an. dr. S. dentur ad nodul. pro mens. i. & dimid. vel 2. vin. Necarin.

Nodulus laxativus antiasthmaticus. ℞. herb. salu. rorism. maioran. Hyssop. veron. marrub. capill. ven.

ven. an pi. rad. ennul. fenic. calam. aromat. chario-
phillat. an dr. ii. Rhab. el. dr. iii. fol. senn. S. unc. i.
agar. troch. turb. el. scamon. Elleb. nig. prep. pol p q.
an dr. ii. cinam opt. dr. i S. mac scr. i tart. alb. crud.
dr. ij. sem. anis fenic. an. dr. S. M. incis. dentur ad
saccul. pro lib. ij. vin. alb.

Nodulus in affectibus capitis. R. rad. peon ca-
lam. arom. Ir. flor. charyophillat. an dr. ii. herb. ab-
sinth. pont. card. b. beton. salv. meliss. puleg. maior.
rorism. an pi. fl. anth. til. stech. an pi. Rhab. el. dr. iii.
fol. senn. S. unc. i. Gial. agar. troch. turpeth. polypod.
an dr. ii. cinam opt. dr. i. mac. nuc. mosch. an scr. i.
cubeb. cardam. an scr. S. incis. dentur ad nodul. pro lib.
vj. vin. alb.

Nodulus in affectibus uteri. R. rad. ennul. camp.
rub. tinct. aristol. rot. an dr. i. herb. absinth. puleg.
meliss. sumit. cent. min. an M. S. fl. cordial. calend. an
pi. fol. senn. S. unc. i. S. Rhab. el. mechoac. an dr. ii.
agar. troch. dr. i. S. galang. dr. i sem. anis fenic. an scr.
iv. mac. scr. i passul. min. mi incis & contus. dentur ad
nodul. pro mens ij. vin. alb.

Nodulus anticachecticus. R. rad. cich. ennul.
fenic. an dr. i. bryon. dr. ij. herb. meliss. h. scap. card. b.
an pii. fl. calend. M. S. cordial. cent. min. an pii. Rhab.
mechoac. turb. agar. troch. an. dr. ii. chalyb. prep. unc.
i. trem. tart. dr. ij. S. cinam scr. ii. xx. zeduar. sem. anis.
fenic. coriand. prep. an scr. i. M. ad saccul. pro lib. iij.
vin.

Nodulus anteictericus. R. rad. cich. ass. arag. an
dr. ij. chelidon. M. polypod. querc. an dr. i. S. fol. senn.
S. unc. ij. Rhab. sel. dr. vi. fibr. Elleb. nig. turb. alb.
gummos. an dr. ij. herb. cuscut. chamaed. nob. chama-
pyth. cent. min. marrub. an py. S. curcum. dr. i sem.
cit. scr. ij. coriand. prep. anis. an scr. i. galang. min.
cinam el. an scr. i. S. croc. scr. i. tart. crud. dr. ij. M.
K 2 incis.

incis. & contus. ad nodul. pro mens. i. S. Vin. alb. & mens. S. aq. font.

Nodulus ex solo Rhabbarbaro. *R. Rhab. el. unc. S. Vel dr. ij. cort. flau. arant. dr. S. contusa grosso modo ac nodulo ligata inf. in aq. destill. cichor. & Vin. alb. an. lib. S. Vel lib. i. Vin. alb. dos. unc. xv. Vel &.*

Bocchetum Rhabbarbarinum. *R. aq. font. mens. ij. ebull. per med. quadrant. hora infund. Rhab. el. dr. i. sant. cit. dr. S. cinam & sacch. parum. Col. pro potu ordinario. Utile hoc præsertim infantibus in cachexia, contumacibus obstructionibus viscerum, morbisque chronicis exinde oriundis.*

Nodulus pro Infantibus. *R. rad. gram. fol. fenn. S. an dr. i. tamarind. unc. S. in petta ligatis superaffund. aq. calent. lib. xv. detur pro potu ordinario infantibus 4. 5. vel 6. annorum, quo plurimos cachecticos, & hydropicos restituit Sosbaith.*

In Forma Clysterum.

Cùm purgantia per os assumpta sæpè contraindicentur, sic eorum loco clysteres evacuantes præscribi soleut nunc lenitivi, nunc mediocriter, nunc fortiter purgantes & revellentes, quorum aliquæ selectæ hic proponuntur formulæ ad imitationem. **Clyster lenitivus.** *R. decoct. emoll. lib. i. Vel emoll. & carmin. an lib. S. sacch. rub. unc. ij. Elect. diacasthol. Vel cast. pro clyst. dr. vi. ol. Viol. chamom. an unc. i. cum sale & Vitell. ov. M. f. clyst.*

Alius in febribus usualis. *R. herb. malv. alth. mercur. Violar. acetos. an mi. hord. m. S. fl. Viol. chamom. an pij. sem. anis. dr. ij. coq. in S. q. aq. ad 3. in Col. unc. x. dissolv. Elect. lenit. unc. i. cast. pro clyst. unc. S. ol. Viol. chamom. an unc. i. S. Vitell. ov. No. i. cum paucosale M. f. Clyst.*

Alius.

Alius. ℞. rad. alth. dr. iij. herb. malv. Violar. pariet an mi. sem. lin. fanug. an dr. ij. fanic. dr. j. S. hord. ex cort. m. s. incis. & contus. coq. ad consumpt. 3. p. in col. lib. i. dissolv. sacch. rub. unc. i. S. elect. lenit. Vel diacathol. dr. vi. ol. Viol. amygd. d. an unc. i. cum sal. & stell. & M. f. clyst.

Clyster paulo fortior. ℞. fol. rut. branc. urs. mercurial. parietar. malv. cum tot. an M. S. fl. cham. mi. sumit. aneth. fl. melil. an M. S. rad. alth. unc. S. sem. aneth. carv. an dr. ij. coq. ex aq. S. q. in col. unc. x. dissolv. Elect. lenit. dr. vj. bened. laxat. unc. S. hier. S. Vel elect. de succ. ros. dr. ij. ol. aneth. rut. an unc. S. sal. gemm. dr. i. M.

Clyster mediocriter à capite revellens. ℞. rad. alth. dr. vi. lib. alb. dr. iij. herb. meliſſ. beton. rut. hyſſ. p. sal. roris. an M. S. fl. cham. malv. cum tot. an mi. cent. min. pi. sem. carv. fanic. an dr. ij. coq. in S. q. aq. S. in Col. unc. x. dissolv. elect. diaphan. hier. S. an. unc. S. mell. anthos. dr. vi. ol. rut. chamom. an unc. i. sal. gemm. dr. i. M. f. Clyst.

Alius fortior. ℞. herb. mercurial. orig. cent. min. puleg. calaminth. beton. an M. S. sem. cartham. in pet. lig. dr. vi. agar. in pet. lig. dr. ij. fl. stach. arab. dr. ij. incis. coq. in S. q. aq. font. in col. unc. x. dissolv. elect. hier. S. logad. Vel hier. cum agar. bened. laxat. an dr. iij. ol. rut. unc. i. cham. aneth. an unc. S. sal. gemm. dr. i. M.

Alius clyster acris utilis in affectibus soporosis. ℞. herb. absinth. cent. min. rut. an mi. rad. pyreth. dr. vi. pulp. colocynth. in pet. lig. dr. ij. incis. & conquis. coq. ex S. q. aq. S. in col. unc. x. dissolv. elect. hier. S. logad. bened. lax. an dr. iij. ol. rut. unc. i. cham. aneth. an unc. S. sal. gemm. dr. i. M.

Clyster simplicissimus fortiter revellens, ac utilissimus in affectibus soporosis, asthma, colica contrumaci &c. ℞. pulp. colocynth. in pet. lig. a. dr. i. ad dr. iij.

iii. coq. in s. q. brod. carn. in col. lib. i. dissolv. sacch. rub. unc. ij. vitell. ov. No. 1. si mitius agendum, add. ol. viol. vel chamom. unc. i. S. M.

Clyster in gravida. R. Brod. gallin. vel carn. alterat. malv. alth. pariet. unc. viij, vel x. ol. amygd. d. cham an dr. vj. vel unc. i. mell. anthosf. unc. i. S. sacch. rub. dr. v. vitell. ov. No 1. M.

Clyster laxativus anticolicus. R. herb. s. emoll. an. M S. fl. chamom. sumit. aneth. an M. S. rad. alth. lil. alb. an dr. ij. sem. lin. fanug. an dr. iij. f. decoct. in S. q. brod. carn. in Col. unc. x. dissolv. elect. lenit. diacathol an dr. vi. mell. ros sol. unc. i. ol. viol. unc. i. vitell. ov. Nn 1. salis parum M.

Suppositorium acre in affectibus soporosis. R. pulv. euphorb. scr. S. colocynth. gr. iv. Elleb. gr. ii. sal. dr. S. mell. coct. unc. S. M. f. suppos. S. Starck hiez hendes Stuhl: Zäpflein.

Aliud. R. spec. hier. pic. Gal. scr. i. troch. alch. scr. ii. sal. gemm. scr. S. mell. coct. q. S. M. pro supposit.

Aliud mitius; R. spec. hier. pic. dr. i. sal. comm. scr. i. mell. coct. q. S. pro supposit.

§. VII.

De Officiò Medici in evacuandis humoribus per vomitum.

I.

Cum humores pravi; vitiosi & cacochymici non tantum per alvum, sed etiam per vomitum evacuari soleant; observet Medicus, vomitum non tantum indicari a materia vitiosa in primis vijs, ventriculo nempe; duodeno; Mesenterio Pancreate; liene, cava epatis parte existente; verum etiam & quidem potissimum

potissimum ab ejus tenuitate, proclivitate ac mobilitate sursum versus. Nam teste C^oq^o, 1. aph. 21. *quo natura vergit, eoducenda est*, non autem solum humores tenues biliosi, spumescentes, aquei, volatiles ac facillè mobiles evacuantur, sed phlegma quoque viscosum, & tunicis ventriculi firmiter impactum excutitur, unde emeticorum ope contumaces morbi ad miraculum sæpius eradicantur, & cum impetu frequentius evellitur, quod communia purgantia non attingunt, hinc teste Galen. vomitus omnium purgantium saluberrimus modo facile fiat, & moderatè, Licet autem principaliter primam: tamen mediatè, & consecutivè etiam secundam & tertiam regionem expurgat.

II.


Conveniunt igitur vomitoria. 1. In continuarum & malignarum febrium principio, vel etiam augmento, si vires nondum attritæ fuerint, præsertim si adsit nausea, vel inanis vomendi conatus, sapor & ructus amari, cardialgia, præcordiorum anxietates, vel haustum contagium prodens se nauseâ & anxietatibus, cum per hæc non tantum æger præmuniatur à diarrhæa, anxietatibus, delirijs, aliisque gravissimis symptomatibus, sed etiam sæpius morbus in ipsis incunabulis suffocetur, & unâ quasi falce demetatur. 2. In febribus intermittentibus, & præcipuè quartana duabus vel tribus horis ante paroxysmum exhibita. 3. In inappetentia, cardialgia, affectu hypochondriaco, & morbis chronicis ex acido primarum viarum ex ortis præsertim, si bilis acido jungatur, aut acidum tenuius ac mobilius sit, & quidem non tam præservativè, quàm etiam curativè.

III.

PRæterea. 4. Pro sunt in capitis dolore sympathico, vertigine biliosa, si primi ejus natales in ventriculo, & partibus vicinis delitescant. In apoplexia *posita*, aut ex ingluvie orta, dum nervorum oscula validè concutiunt, ac impedimenta spirituum, & causam morificam tollunt. 5. In Mania, Melancholia, asthmate humoroso, & præcipuè stomachali, cum per ea magna pituitæ copia rejiciatur tum ex stomacho, tum ex pulmonibus per constrictionem pectoris simul concurrentem, vel saltem concussione illa humor ille tenax è tubulis pulmonum, & alijs partibus abraditur, ejicitur, fluxilis redditur, ut denuo cum sanguine circulari, corrigi, vel ad ignobilem partem deponi possit. 6. Tandem conveniunt in præcautione arthritidis Podagræ Nephritidis, ac igitis etiam alijs in partu difficili &c.

IV.

COindicatur Vomitus. 1. Ab habitu corporis, unde *Hippocrates 4. aph. 6. ait: Graciles* (intellige naturâ tales ob humores magis mobiles, vias patulas ac fibras magis fluxiles) *& ad movendum faciles per superiora purgare convenit, nisi hyems adsit.* 2. a tempore anni, hinc præservativè vernum magis & æstivum eligendum, unde etiam prædictus senex 4. aph. 4. ait. *Æstasse quidem superiorem magis &ntrem: hyeme inferiorem purgare convenit.* 3. a consuetudine, a natura ad vomitum prona ac facili. 4. a ventriculi & viscerum robore, ac præcipuè a viribus, cum in hoc viscera validè concutiantur, ipsæque fibræ non rarò insigniter convellantur, ut spiritus animales in impetum inordinatos adacti gravissima sæpè inducant symptomata. 5. Ab ætate, juvenili nempe & Virili ac ultimò tandem a symptomatibus quibusdam & accidentibus, de quibus *Hippoc. 4. aph. 17. ait. non febricanti cibi fastidium, cordis dolor,*



dolor, Vertigo tenebricosa, & oris amaritudo per superiora purgandum opus esse significat.

V.

Contra contraindicatur Vomitus. 1. à constitutione corporis inepra ut v. g. gibbosa, scrophulosa, aut quibus pectus angustum, vel depressum, vel qui obest, aut alias ad vomitum difficiles, unde Hippoc. 4. aph. 7. ait *agrè Vomentes, & modicè carnosos, quos Græci eusarchos appellant per inferna purgato &c.* 2. à proidentia quadam corporis in abdomine ut Intestinorum uteri &c. 3. à graviditate. 4. à capitis affectione per essentiam systemate præsertim nervoso debili existente. 5. Ab oculorum affectu & præsertim inflammatione. 6. In pulmonum læsione essentiali, ac præsertim hæmophysi, nam ex Hippoc. 4. aph. 8. *tabi obnoxios supra ne purgato.* 7. Ab affectibus abdominis convulsivis, ac Dolorificis, tumoribus abdominis inveteratis, abscessibus internis, mensium defectu ex vitio uteri, atrophia, virium languore ægris præsertim hypothimix obnoxij existentibus.

VI.

Medicamenta Emetica alia sunt *primaria*, & propria talia, quæ vim suam exerunt irritando, dum nempe acrimonia sua salino--sulphurea, & quidem volatiliori, quam habent purgantia per inferiora, particulisque suis aculeatis profundius sese insinuant, ac fibrillas nervorum per ventriculum copiosè disseminatorum, tracto etiam in consensum intestino duodeno cum ductu choledocho, & Pancreatico inordinate movent, ac vellicant, ut spiritus animales copiosius in fibras irruant, motum peristalticum invertant, & veluti motu convulsivo contenta in ventriculo sursum expellant: Alia *secundaria* in propriè vomitoria dicta, quæ laxando, lubricando, & ventriculum gravando, & resupinando vomitum cient ut v. g. ol.

comun. vel amygd. d. cum sperm. cet. & butyr. liquefact.
cum cerevisia, fuscilopingui &c. ac locum tantum
habent in excernendis per vomitum venenis corrosivis,
vel ubi vomitus vomitu curatur ut v. g. in Cholera.

VII.

Quo ad Regimen & usum Emeticorum observet Me-
dicus. 1. Ea exigente necessitate quovis anni
tempore exhiberi posse præservationis tamen gratia
maximè vernali. 2. Melius etiam suam operationem
exercere assumpta in forma liquida. 3. Antimoniata &
mercurialia tutius in infuso colando ea per chartam em-
poreticam, quam in substantia exhiberi, cum secus
ventriculi tunicis ac plicis adhærescentia subinde ciant
lethales hypercatharses, vel enormes vomitus, qui to-
num ventriculi destruunt, ac viscera impensè debili-
tant, hinc licet talia exempla, & formulæ apud Ro-
sio. & Villis. prostant, non tamen faciliè & tutò imi-
tandæ. 4. In horum infusione non tantum conside-
randum esse, quantum sumatur de vomitorio, quam
quantum accipi debeat de menstruo nempe ab unc. 5.
ad unc. 1. vel 1. S. ad summum. 5. Eadem etiam tu-
tius præscribi in dosi refracta, præsertim in febribus
malignis, in quibus alias fluidiora sunt contenta. 6.
Vomitória liquida tepidè sumenda esse, cum sic faci-
lius nauseam concitent, & expultricem ad expulsionem
molestent. 7. Si forma boli exhibeantur, post dimi-
diam vel integram horam elapsam liquorem aliquem
tepidum desuper bibendum esse. 8. Horam exhibendi
vomitivi in morbis chronicis esse matutinum jejuno
ventriculo: in febribus intermittentibus subinde ex-
hiberi unâ horâ ante paroxysmum; in noxia quavis re
assumpta, vel exhibito veneno quamvis horam ido-
neam esse. Si humores sint crassi, viscosi, lenti post
cibum expeditius & minori cum labore evomuntur.

VIII.

VIII.

Subinde vomitus ab assumpto emetico nullus vel par-
 cus nimis excitatur, quod contingere potest, vel ob
 mucum viscidiorē pārietes ventriculi incrustantem,
 ac sic eum, quasi sensus expertem reddentem, vel ob
 vomitorium acidis nimis fixum redditum, hinc quat-
 tanatij ac Melancholici difficulter vomunt, vel ob ro-
 bur ventriculi omnia deorsum potius promoventis, vel
 ex sensus defectu in morbis lethali-
 bus, si igitur subinde
 non operentur, vel non satis, formidandum non est,
 cum subinde utiles sequantur salivationes, vel purgatio-
 nes per alvum, interim promoveri potest, si consultum
 videatur assumpto Jusculo calido benè salito, vel intru-
 sione digiti in fauces, vel extremitatis plūmosæ calami
 scriptorij oleo imbutæ, sicuti e contra, si nimius fiat,
 sistendus vino generoso tepidè propinato, & si prima
 vice rejiciatur reiterato cum buccella panis, opiat-
 aromaticis sociatis, & speciatim theriac. cum laud. op.
 in vino assumpto uti etiam exterius cum spirit. vin.
 crocato applicata.

§. VIII.

*De Officio Medici in prescribendis Emeti-
 corum Formulis.*

Potio Emetica ex vitriol. mediocriter sine multa
 molestia vomitum ciciens, & ex solo ventriculo
 evacuans. Nam vitriolum ob mitem agendi
 operationem Manna vomitoriorum à nonnullis intitu-
 latur. *R. vitriol. alb. præp. dr. S. vel scr. ii. oxymel.
 S. dr. iii aq. dest. cich. vel ment. unc. i. M. S. Brech-
 Wasserlein auff einmahl einzunehmen.*

Pulvis Emeticus maxime usualis. *R. Crem. tart.
 vel sal. armon. gr. xv. sal. absinth. gr. v. tart. emet.
 minf.*

minf. gr. i. ii. iij. M. f. pulv. S. Brech. pulver. Si simul per inferiora purgandi animus add. scam. sulpb. gr. viij. x. ol. dest mac gut. ij. M. norandum est hodie apud selectiores Practicos optimum, & ultimatissimum vomitorium constituere tart. emet. qui ratò fallit, adeo ut etiam infantibus quarta vel sexta pars grani à nonnullis exhibeatur

Potio Emetica ex infuso croc. metall. valida sed tuta satis. *R. croc. metall. ritè præp. à gr. vi. ad viij. xii. ebull. parumper in S. q. Vin. alb. col. per Chart. emporet. S. Brech. Wein.*

Alia ex vitro antimon. vel mercur. vit. *R. Mercur. vit. Gel vit. antim. Gel croc. metall. gr. v. infund. in Vin. Rhen. q. S. stent in loco tepido per noct. mane R. de filtra- tura per chart. emporet. facta unc. S. i. Gel i. S. eodem modo procedi potest cum numis, annulis, globulis, & scyphis ex regulo antimonii paratis.*

Potio ex syrup. Emet. *R. syr. emet. Angel. sal. dr. ii. iii. unc. S. Iulap. 10j. unc. S. aq. cinam dr. ii. vel R. aq. card. b. syr. emet. Aug. sal. ritè præp. an dr. iii. aq. dinam dr. ii. M.*

Bolus Emeticus. *R. conf. fl. tunic. à scr. i. ad dr. S. tart. emet. minf. gr. ii. iiii. crem. tart. gr. v. M. f. Bol. S. Brech. Zucker.*

Pilulæ Emet. *R. extr. asar. Gel panchym. gr. vi. part. emet. gr. ii. ol. destill. zeduar. gut. i. M. f. Pilul. No. vii. S. Brech. Pillulen auff einmahl.*



C A P U T VI.

D E

Officio Medici in affectibus indicantibus sudorifera, diuretica, salivantia, Errhina, sternutatoria, apophlegmatizantia, & expectorantia.

I.

De Officio Medici in prescribenda evacuatione per sudorem.

I.



Sum sudor in corpore humano soleat contingere, dum occasione vel causæ externæ ut v.g. exercitij, caloris ambientis &c. vel medicamenti interni attenuatur sanguis, magis fluxilis redditur, plusque minus liquefcit, & resolvitur, hincque velocius circularur, intensius fermentatur, & incalescit, cum sanguine etiam serum à calore attenuatum imbibit copiosè particulas minus reliquis coherentes seu permistas, & in specie salinas, ac cum illis varias sordes, & fermenta, quæ simul absterguntur, hinc successivè circa corporis habitum subintrat copiosissimè glandulas intercutaneas, ex quibus per vasa excretoria corporis poros constituenta emanat. Cum igitur sudor tali modo contingat, Medicus exinde colliget. 1. In sudore sanguinem, & omnes humores attenuari,

tenuari , in motu suo debito ac circulatione optimè conservari , stagnationes tolli , ac partes heterogeneas , & fermenta peregrina optimè sic eliminati , atque adeo sudorem esse universale sanguinis , & partium solidarum purificativum , abstersivum , uti etiam particulare peripheriæ ipsius corporis morborum nempe cutaneorum. Colliget 2. sudorem sæpè maximè necessarium esse , quod elucescit , tum ex ipsa cutis , quæ tot millibus spiraculorum abundat structura ad sudores elicicndos aptissima , tum ex plurimis morbis , qui sudoribus criticè solvuntur , tum ex sensibili transpiratione , quæ alijs evacuationibus teste *sanctor. in sua statica* copiosior est , unde ex hac impedita tot morborum oriuntur genera , quæ omnia tolluntur sudore , ut adeo nonnulli censeant , tertiam morborum partem curari sudoriferis , quæ etiam purgantibus magis tutiora.

II,

EX præsuppositis patet , sudorem convenire. 1. In omnibus febribus exceptâ Hecticâ , & quidem tam intermittentibus , quàm continuis , & præcipuè malignis , quarum nulla ferè sine sudore perfecte curata dicitur. 2. In inflammationibus , doloribus , tumoribus tanquam effectibus circulationis impeditæ. 3. In cruoris extravasatione , vel revera tali in vulneribus , contusionibus , vel quasi tali ut in Plevritide , eryspelate , arthritide , affectu Ischiatico &c. 4. In morbis omnibus ex humoris serosi colluvie oriundis , ac in specie defluxionibus Catarrhalibus. 5. In grumescentiâ & coagulatione sanguinis , ut in palpitatione cordis , scabie , scorbuto &c. 6. Tandem non tam evacuationis , quàm alterationis gratia ut nempe viscida attenuent , aut humores coagulati , & stagnantes resolvantur in morbis Chronicis , & contumacibus , quorum causæ altiores egerunt radices ut v. g. epilepsia Para-

Paralyſi, arthritide, malo Iſchiatico, lue venerea, doloribus ac fluxionibus capitis inveteratis, catar- his, cachexia &c. qui purgantibus atque alijs alteran- tibus curari haud potuerunt.

III.

Sicuti autem coindicantur ſudorifera à viribus con- ſtantibus, ætate habili, & loco calido: ita contra- indicantur ab aëre & loco frigidiore, ac viribus præ- cipue exſolutis, cum per ſudores præcipue largiores ſpiritus exhauriantur, corpus emacietur, colliquetur, roſque nutritivus nimis reſolvatur. Item ſubjecta ca- lida & biliſa minus, & non diu ferunt ſudores præſer- tim à ſudoriferis calidioribus excitatos, item contra- indicantur ubi vel ſerum deficit in Maniacis, choleri- cis, gracilioribus, ſenibus, ſquallidis, ad maraſmum & Phthyſim inclinantibus, vel ubi ſerum nimis abundat, ut in hydropicis, ubi ſimul eſt extravasatum.

IV.

Medicamenta ſudorifera nonnullis etiam dicuntur *diaphoretica & hydrotica*, licet ab invicem di- ſtinguantur: illa enim ſenſibilem magis humidam, & rivuloſam ſeri evacuationem perficiunt; hæc udorem vel madorem potiùs cient evacuando magis inſenſibilem materiam vaporoſam, & halituoſam. Vim autem ſuam exſerunt Medicamenta ſudorifera, & diaphore- tica vel *poſitivè* calore, & tenuibus ſuis particulis hu- mores M. S. attenuando, incidendo, colliquefaciendo, ac ad cutis glandulas cum alijs obvijs propellendo in guttas ibidem condensandos vel inſenſibiliter evapo- randos, vel *privativè* acidum coagulativum abſor- bendo, imbibendo, & quod ſerum ligat, ac fixius reddit reſolvendo: & ſic per accidens ſanguinem reſol- vendo. Hæc locum magis habent, ubi reſolutio vi- rium timetur, & fræno potiùs eget ſanguis & ſerum, quam

quàm stimulo: illa ubi sanguis ad motum & fermentationem magis ciendus. Motus igitur naturæ observandus, quæ, si ipsa officio satisfaciât, & in sudores promptè solvatur, modicè juvanda est, non pellenda: si deficiat stimulanda, si excedat restænanda.

V.

PRO debito usu sudoriferorum sequentes Medicus observabit cautelâs. 1. Primas vias debere esse primò emundatas, & a viciosorum humorum illuviè liberatas. Nam in materia nimis copiosa minùs tuta sunt sudorifera, cum ingrossent, ne vel cutis spiracula occludantur, vel commoti ad partes principes ruant humores. 2. Exhibenda esse ventriculo jejuno existente seu propinentur in forma liquida, quæ citius, seu solidâ, quæ tardius operantur. 3. Sumptis sudoriferis corpus plùs solito esse tegendum, ut pori magis pateant, humoresque magis fundantur, ac tegumenta circumcirca porius, quàm supra ponenda, cum pori cutis ab onere stragulorum, & tegumentorum nimis pressi sudores difficillimè transmittant. Nonnulli, ut ægri in lecto melius sudent, sudorem lagenis aqua calida plenis, vel lateribus calidis linteo involutis sub axillas ad latera ægri positis, promovent. In Dixta sudorifera in der Holz, Schwin, Cur/sic dicta per synecdochem, quod in ejus usu exacta & accurata vivendi ratio sit observanda, decoctum lignorum exhiberi solet in robustioribus corpore in stupha seu laconico existente ac excitato vaporoso calore per affusionem alicuius decocti. vel spirit. vin. super lateres vel filices ignitos, ut sudor melius proficiatur. 4. Melius esse, si ægri non violenter cogantur ad sudorem præsertim si corporis textura, & sanguinis dispositio non respondeant. Minus enim sudant, quibus sanguinis status magis condensatus, ac fibræ, pori & meatus cutanei adstricti, & contracti, hinc præstat sæpè præsertim etiam in febribus malignis & expellendis variolis diaphoresim continuare, & natura

cura tempus concedere, quàm eandem cogendo perfundare, cum sic seri proportio nimis absumatur, sanguis ipse ad fermentationem magis cieatur, & naturæ bene agentis conatus interrumpatur, præstat igitur naturam sequi, & ducere, quàm pellere, cum præstet sæpè tenuis udor, quod non præstat sudor.

VI.

PRæterea. 5. observabit Medicus sudorem ad horam unam vel dimidiam, raroque ultra duas horas continuandum esse, præsertim si satis rivulose fluat, cum ad vires maximè respiciendum sit. In cura lignorum sudorifera una vice de die frequentius, & quidem mane ad unc. vj. calidè ebibito decocto sudor promittitur, licet subinde in robustis, valde pituitosis & copiosis excrementis refertis etiam circa vespèram idem usus decocti reperi possit. In febribus continuis, malignis, varriolis bis vel etiam ter de die: si magnà adfit malignitas, sudorifera exhiberi possunt. 6. Cavendum esse, ne fluente adhuc vel etiam absterfo sudore aer frigidus per poros adhuc patulos admittatur hinc post sudorem linteamina & indusia (calidè prius corpore absterfo) mutari & alia tepida indui possunt. 7. Durante sudore, si æger sitiat, potum largiorem concedi posse, cum sudorem coadjuvet, præsertim si calidus sit, cum frigidus magis eum impediat maximè confertim haustus, licet magis recreet. Post sudorem moderatè acidula conveniunt, ut sanguis attenuatus & resolutus blandè iterum coeat.

VII.

Item advertet Medicus. 8. In diætâ sudorifera pro majori vel minori morbi vehementia, & contumacia per dies 15. 20. 30. & ultra persistendum esse (nisi vires deficient) ac talem victûs rationem observandam esse, ut æger utatur assis potius quàm elixis, aviculis acmpe montanis, pullis columbinis, Gallinaceis &c.

E

panc

panebis cocto, passul. amygd. tost. &c. pro potu Boe-
 cheto, id est, decocto lignorum secundo, ut alvus
 si fuerit obstructa clystere emolliatur & quod optimum
 singulis 6. vel 8. diebus purgatio instituat ommissâ
 illa die potione sudorifera, ut etiam crassior materia,
 quæ absumptis partibus tenuioribus restagnare solet,
 per alvum deturbetur. 9. Decoctum hoc sudoriferum
 etiam usurpari citra sudorem pro solo scopo alterativo
 in affectibus chronicis, & præsertim exulcerationibus
 internis additis vulnerarijs, ut quotidie bis vel ter hau-
 stus de eo sumatur. 10. Tandem quoad tempus in feb-
 ribus notandum, quod, nisi febres nimis sint malignæ
 aut erysipelati, vel pleuritidi junctæ, melius sit co-
 ctionis signa expectare, ut materia excrementitia non
 cruda sit, ac vitiosè in sanguine ebulliat, sed præ-
 cipitata & separata sit, alias enim vel nullus sequitur
 sudor, vel nudus latex aquosus cum spirituosus haliti-
 bus tantum exhalat sine ephoria ægri cum insigni potius
 ejusdem damno, cum nihil separari possit ex liquore,
 cujus porulis intimè unitum est, hinc ad imitationem
 naturæ, vel in declinatione universali morborum, vel
 particulari Paroxysmorum tantum sudores movet, ac
 eadem varriolas, petechias non nisi post aliquot dierum
 febrem salubriter, & sufficienter expellere solet, ut
 adeo aphorismus Hippoc. de coctis evacuantis non
 tantum de purgantibus, sed etiam sudoriferis & diure-
 ticis intelligendus sit.

§. II.

De Officio Medici in præscribendis formulis remediorum sudoriferorum.

Decoctum sudoriferum famosum in lue venerea
 multis pro arcano habitum. *R. rad chin. sel.*
lib. S. add. sar sapar. non carios. lib. S. sasaph. unc.

ii. antim. crud. pulv. & aq. font. prius lot. ad separatio-
nem pulveris nigricantis unc. i. aq. font. lib. iv coq. ad
consumpt. mediet. post refriger. col. S. Holz = Schwiz =
Wasser / darvon ein Traggel Morgens nüchter war-
mer zu trincken / vnd darauff zu schwitzen.

Aliud Zuvöllferti. R. lign. quaiac. tornoderaf. unc.
vi. sasaph. rec. unc. iii. rad. chin salsapar. an unc. S. liq.
raf. unc. i. passul. min. unc. iv. mercur. viv. antim. crud.
contus. in pet. ligatorum an unc. iii. aq. font. lib. xxiv.
incis. infund. per 14. horas, postcoq S. art. ad remanent.
lib. xvi. Colat. detur ad vas vitreum vel terreum, nullo
modo autem metallicum. Dentur quottidie unc. v. vel
vi. vel mane hora sexta & vespere hora quarta unc. iv.
calide.

Pro Potu. R. chin. opt. sarsapar. an unc. ii. lign.
sasaph. rec. unc. i S. rad. liq. raf. unc. i. passul. min. unc.
iii. aq. font. lib. xxiv. incis. stent. per hor. 24. hinc coq. S.
a. ad reman. lib. xviii. col. S. Nachwasser zum trincken
in der Schwiz-Cur.

Aliud in gonorrhæa virulenta. R. rasur. lign.
quaiac. sarsapar. an. unc. iiii. cort. lig. sanct. dr. vi. in-
fund. in aq. puriss. lib. vi. stent in loco calido per 24. ho-
ras coq. in diplom. ad consumpt. 3. p. add. in medio coct.
rad. liq. ennul. an unc. S. cinam acut. dr. iij. sem. anis.
fenic. an dr. ii. col. dos. unc. vi, provocatis in laconico
sudoribus.

Aliud. R. lig. sanct. unc. x. cort. unc. i. sarsapar.
unc. iii. inf. in aq. lib. xii. decoq. ad mediet. col. resident.
affund. lib. xii. coq. ad consumpt. 3. p. add. passul. unc.
ii. liq. dr. ii. M.

Diæta sudorifera in Paralyfi vera. R. lig. Guaiac.
ver. unc. iv. cort. eiusdem dr. ii. lig. sasaph. dr. vi. rad.
Paon. ennul. lr. an unc. S. incis. stent in infus. in loco ca-
lido per 24. horas coq. ad remanent. lib. iv. S. add. in fine
fl. salu. primul. ver. anth. lavend. stach. arab. an dr. ii.
cinam acut. unc. S. ebull. semel atque iterum col. sudetur

in laconico suscitato vapore ex decocto herbarum cephalicarum scoris vel lapidibus ignitis affuso.

Alia in suffusione. *R.* rad. sarsapar. unc. ii. lign. sanct. unc. i. sant. rub. unc. S. rad liq. dr. vi. asperge sp. sulph. scr. i. inf. per hor. 24. in aq. lib. vi. add. passul. min. unc. iii. cibebr. unc. i. S. herb. cyphras. cum fl. mi. fl. cyan. beton. an m. S. sem. coriand. fanic. an dr. i. S. coq. S. ad reman. lib. xv. Col. dof. unc. xv. vel v.

Decoctum sudoriferum temperatum in Catarrhis & affectibus Capitis. *R.* rad. chin. sel. incis. unc. i. salsapar. vino purgat. à pulvere & contrus. unc. i. S. sasaph. limat. dr. i. S. inf. in lib. xii. aq. font. stent per horum 24. coq. ad consumpt. medietat. col. addi etiam posset aliquid de visco querc.

Decoct. sudoriferum in Podagra. *R.* scob. lig. Guaiac. rad. sarsapar. an unc. ii. lig. sasaph. crasse limat. dr. i. S. affund. aq. font. lib. vi. coq. in B. M. per hor. 6. col. subinde decoctum fieri potest ex solo ligno sasaph.

Decoctum sudoriferum in scabie. *R.* scob. lig. sasaph. quaiac. an unc. vi. rad. chin. salsapar. an unc. S. cinnam acut. dr. i. sic. liq. an unc. S. passul. min. unc. i. sem. anis. fanic. an dr. S. coq. in aq. font. lib. xv. ad tertias Col.

Decoctum alterans, putredinem inhibens, exsiccans & consolidans in ulceribus & abscessibus internis usuale sine sudoris provocatione *R.* rasur. lign. sanct. unc. iii. rad. sarsapar. unc. ii. scorz. unc. i. S. fragrar. consolid. m. min. glych. an dr. vi. herb. Veron. mi. coriand. prap. dr. ii. passul. min. unc. xv. coq. in aq. lib. xv. ad med. col. S. aufstänhlendes Wund, Tranck / darvon Moregenes / Abends vnd Nachts 4. oder 5. Unzen zu nehmen.

Aliud magis temperatum. *R.* rad. chin. ponderos. unc. iii. sarsapar. unc. i. S. scorz. unc. ii. charyophyllat. unc. i. macerata per noct. bull. m. in S. q. aq. font. add. herb. scabios. alchimill. heder terrest. an mi. fl. ros. rub. mi. violar.

m. S. sem. fanic. dr. ii. passul. unc. ii. decoct. traisc. per manic. Hippoc. Col. S. ut supra.

Brodium columbinum exsicicans, & sudoriferum in Catarrhis, & incipiente Phrysi utile vulgo die Taubens-
Eur. *R. rad. chin. sel. in talleol. seiß. dr. ii. lig. lentisc. dr. ii. mac. ser. S. m. ad chart. S. speices zur Taubens Bröhe mit einer halben Tauben in zudeckten Geschier siedenzulassen / bis das Fleisch von den Bänlein fällt. Et sic pro ceteris dosibus per 14. Vel plures dies.*

Aliud Brodium Catarrhale suave & proficuum in Catarrhis diuturnis viscera corroborans, & materiam serosam absumens. *R. chin. sel. unc. i. lign. lentisc. dr. vi. rad. Rhod. dr. ii. incid. & infund. aliquamdiu. hinc coq. cum Gallin. Iuvene in lib. 6. Vel vi. aq. font. ad debitam cocturam. cap. m. Vinc. vi. Vel viii. aromatiz. cum pauco. mac. singulis tribus diebus paretur recens.*

Potio sudorifera in febribus continuis & malignis. *R. Elect. diascord. fracast. scr. i6. pulv. rub. panon. Vel spec. de hyac. aut liberant. scr. i. lap. bez. orient. Vel sal. Vol. cc. gr. vi. syr. acetos. cit. unc. 8. aq. card. b. Vel scorz. unc. 4. S. acetos. Vel tot. cit. aut cordial. frig. unc. 8. M. S. Gist aufftreibendes Schweiß Tränckl auff einmahl einzunehmen.*

Alia. *R. aq. scabios. card. b. scord. an. unc. i. acet. bez. oart. dr. iii. diascord. fracast. dr. i. Vel midrith. confect. alk. an scr. i. cc. philos. prap. antim. diaph. terr. sig. Vel unicornis fossil. an scr. i. nit. perlut. gr. vi. syr. descord. Vel rub. ida. dr. vi. Vel unc. i. M.*

Alia *R. mixt. f. scr. ii. antim. diaph. cc. phil. prap. an scr. i. aq. fumar. card. b. an. an unc. i. S. syr. acetos. cit. unc. 8. M.*

Emulsio sudorifera in varriolis & febribus malignis. *R. semin. aquileg. nap. cit. an dr. ii. Paon. dr. i. aq. fumar. card. b. galeg. scorz. an unc. i. cordial. frig. dr. vi. M. f. emuls. add. cc. phil. prap. scr. i. antim. diaph. scr. 8. sacch. perlat. parum. S. Schweiß Milch auff einmahl einzunehmen.*

Alia. R. sem. mel. dr. ii. card. b. aquileg. an. scr. ii. aq. acetos. fl. calend. fumar. an. unc. i. vel decoct. cc. raspa. nnc. iii. add. cc. phil. prap. scr. i. vel dr. S. Iul. ros. unc. S. M. S. ut supra.

Bolus sudoriferus in Erysipelate, scabie &c. R. rob. sambuc. unc. ii. cc. phil. prap. scr. i. bezoart. mineral. vel antim. diaph. gr. xv. vel pulv. rub. panon. cc. phil. prap. an. scr. i. lap. bez. gr. v. M. S. Schwitz- & atwergen auff einmahl einzunehmen/ vnd ein oder 2. Löffel voll Poler- Blübe- Wasser darauff zu trincken.

Alius. R. theriac. vel midrith. opt. scr. i. S. con- fect. alk. scr. i. cc. phil. prap. scr. i. antim. diaph. scr. S. syr. de card. b. parum M.

Bolus sudoriferus in febribus malignis. R. Dia- scord. fract. scr. ii. confect. hyrac. scr. i. cc. phil. prap. scr. S. lap. bez. orient. gr. vi. M. S. Außtreibende Schwitz- & atwergen auff einmahl.

Electuarium sudoriferum pro pluribus dosibus. R. rob. Iuniper. dia scord. fract. an. unc. i. S. ther. androm. midrith. an. dr. ii. terr. sigill. siles. dr. i. syr. acetos. cit. q. S. M. f. Elect. S. Schwitz- & atwergen darvon etner Nuß groß auff einmahl einzunehmen.

Pulvis sudoriferus & expulsivus in varriolis & febri- bus malignis. R. pulv. rub. pannon. dr. S. spec. de hyac. scr. i. lap. bez. orient. gr. xv. vel orient. gr. vi. occi- dental. gr. ix. vel loco bez. sal. vol. cc. gr. xv. M. f. pulv. divid. in 3. p. aq. S. Außtreibende Schwitz- Pulverlein auff drey mahl einzunehmen.

Alius. R. spec. liberant. de hyac. unicorn: foss. an. scr. S. sal. vol. cc. vel lap. bez. orient. gr. vi. M. f. pulv. subinde unum vel alterum gr. camphora addi potest.

Alius. R. unicornu. ver. antim. diaph. cinnab. an- tim. sal. vol. viper. vel cc. an. gr. viii. M. f. pulv. detur ex aquis à typh. cerv. card. b. scorz. fumar. &c.

Pul-

Pulvis alexipharmacus & sudoriferus Mindereri. *R.*
sacch. cand. dr. iii. z. z. alb. dr. ii. camph. dr. i. M. f.
pulv. cuius dos dr. i.

§. III.

De Officio Medici in instituenda evacuatione per urinam.

I.

Cum cacochymiae curatio non tantum purgantibus & sudoriferis, sed etiam quandoque perficiatur evacuatione per urinam, quod clare patet ex perfectis crisis, quas natura subinde in pleuritidis, Empyicis, aliisque morbis detentis instituit per urinam, ea hic etiam inter evacuationes universales consideranda, dum remedium diureticorum ope salia massae sanguineae, aut superflua, aut vitiosa, tartarea & peregrina (sub lixivij urinosi forma per renum tubulos in eorum pelvim praecipitant, ac per vias urinarias eliminant, quae evacuatio eo jucundior & tutior, quod nec vires prosterнат, nec sanguinem aut corpus conturbet, sed cum ephoria humores ex secunda aut etiam tertia regione evacuet.

II.

Cum igitur haec sanguinis depuratio per urinam locum sibi vendicat, ubi vel tartarea, salinaeque particulae in corpore abundant, ac massam sanguineam, & speciatim serum inquinant, vel colluvies serosa hinc inde in visceribus, seu etiam in insigni aliqua corporis cavitate delitescit, in usum trahenda erunt diuretica.

1. In vitijs urinae ut ejus defectu, Ischuria, dysuria &c.
2. In sero peccante, in quantitate vel motu, ut in Cachexia, hydrope, & praesertim ascite anasarca &c.

3. In sero in qualitate peccante ut Ictero, scorbuto, affectione hypochondriaca, & quibuscunque alijs lienis affectibus vel revera talibus, vel ipsi saltem attributis, in quibus urinæ quandoque atramento similes, vel cum copiosis arenulis, vel potius salibus concretis & præcipitatis cum insigni levamine rejiciuntur. 4. In gonorrhæa, fluore albo, arthritide, nimia obesitate, calculo, declinatione febrium, alijsque pluribus affectibus.

III.


Operationem suam exercent diuretica vel abstergendō, qualia sunt tum aquea & liquida serum substantialiter augmentia ac uberem, aquosamque materiam supeditantia, ut acidula, serum lactis, Thermae &c. Tum aquosa mucilaginosa acrimoniam seri temperantia ut Glych. althæ. sem. 4. frigid. m. &c. quæ diuretica frigida & improprie talia vel potius uretica dicuntur, vel sanguinem attenuando, resolvendo & speciatim laticem serosum in eo fundendo, & ita lotij copiam è toto corpore proliciendo, qualia sunt sale volatili prædita, ac omnia falsa tartarea & nitrosa, hinc sal primum esse diureticum rectè scribunt chymici, hinc etiam acida & terrea alcalina in alium saporem plus minus salsum convertuntur, ut fiant diuretica vel serum acius, indeque absterisivum, & viscidorum plus minus attenuativum, ac nonnihil colliquefactivum, & hinc renum stimulativum reddendo, qualia sunt herbae diuretice, alcalinae, ocul. canc. &c. vel acrimonia volatili renes irritando & ad itrequentiore excretionem stimulando, qualia sunt cantharid. & raphanacea. Vel tonum renum conservando, & vim transcolatoriam non absque aliquali stimulo promovendo, qualia sunt juniperina, thorebinthinata, vel tandem præcipitando, & sic separationem partium serosarum à sanguineis facilitando.

IV.

IN usu remediorum diureticorum Medicus observa-
bit. 1. Antè eorum usum præmittenda esse univer-
salia, tum quia in principio plerumque materia cras-
sior & copiosior est, ut frustra per urinam duci possit,
tum quia metus est, ne copia sua, dum ad angustas
vias ruit, eas obstruat, ac sibi & alijs viam interclu-
dat. 2. Diuretica magis convenire in morbis chro-
nicis quàm acutis & calidis ut v. g. in febribus ardenti-
bus, hectica, Phrysi &c. nisi aquea sint & temperantia.
3. Eodem in genere magis convenire in subjectis eu-
sarcicis, & succulentioribus, phlegmaticis nempe & san-
guineis, quàm acrioribus, cholericis & Melancholicis,
cùm in talibus continuo usu ad atrophiam & tabem di-
sponant. 4. Eadem magis convenire in statu & decli-
natione, quàm in principio & incremento.

V.

PRæterea. 5. observabit, eadem jejuno ventriculo
longè ante pastum exhibenda, nec cibis tam facile
permiscenda esse, cùm citiùs quàm par est, chylum in
vasa præcipitent. 6. Ipsis vas & visceribus urinæ ex-
teriori velificantibus affectis ac detentis v. g. inflam-
matione, ulcere &c. cautius danda esse diuretica, vel
non nisi terrea, alcalina, vel temperantia & simul trav-
matica usurpanda esse. 7. Eadem in calculo renum
præsertim etiam in paroxysmo Nephritico minùs tuta
esse, nisi præmissis emollientibus, lubricantibus, ac
oleosis, cùm vel impuritates corporis magis deducant
ad partem affectam, vel iisdem calculus præcipitetur,
ac deturbetur in vasa cum lethali sæpè Ischuria.



S. IV.

De Officio Medici in præscribendis Formulæ Diureticorum.

Decoctum diureticum experientiâ probatissimum. *R.* sem. malv. alth. an dr. iij. cic. rub. unc. iij. 4 fr. m. an dr. ij. hord. mund. mj. caric. ping. No. viij. sebest. No. vj. rad liq. ras. dr. vj. incisa indantur nodul. ex serico alb. & coq. in aq. font. lib. iij. S. ad tertias Col. S. Harn = treibendes = Wasser / dar = von Morgends / Abends vnd vor dem Schlauff ein Tragegele zu trincken.

Subinde uno haustui indi possunt spirit. sal. gut. vj. vel vj. Forestus huic decoct. addit. rad. ononid. fanic. petrosel. an unc. S.

Julepus Diureticus. *R.* Decoct. Forest. lib. S. vel aq. ononid. fragor. petrosel. an unc. ij. syr. de alth. fernal. unc. i. S. sp. sal. q. S. M. possit etiam addi ocul. canc. dr. S. S. Harn = Wasserlein / darvon Löffel = voll. wetß zu nehmen.

Therebinthina liquida. *R.* thereb. cyp. cum vitell. ov. dissolv. dr. v. brod. carn. vel vin. Rhen. opt. unc. iij. M. super lento carbonum igne. alij etiam addunt succ. lim. dr. vj. vel unc. j.

Alia. *R.* resin. therebinth. cyp. unc. S. dissolv. cum vitell. ov. S. q. addendo paulatim syr. de alth. fernal. unc. ij. vin. malv. unc. vj. M. dos. unc. i. S.

Potio diuretica suavis & efficax. *R.* succ. limon. succ. express. ex corticibus raph. acut. v. n. malv. aq. frag. an unc. i. sacch. q. S. pro dulcorat. *R.* vin. alb. unc. iij. succ. lim. unc. i. spirit. thereb. scr. ij.

Mixtura diuretica. *R.* aq. oronid. petrosel. saxi. frag. an unc. i. spirit. juniper. dr. ij. ocul. canc. prap. scr. i. Bals. sulph. thereb. scr. i. syr. de alth. fernal. unc. S. M. detur

detur cochleatim cum gutt. xv. sequentis Balsami Diure-
retici. R. spirit. sal. tart. Bals. sulpb. therebinth. an
scr. ii. sal. vol. succin: gr. vi. M.

Lixivium Diureticum hydropicis per quam profi-
cium. R. ciner. genist. vel sumit. Juniper. lib. i. vin.
Rhen. lib. iv. infunde frigide addendo sol. absinth. vulg.
pi. vel pii. de colatura m. v. & sero unc. iv. potentur
usque dum tumor diminutus sit. vel R. de colat. unc.
iv. succ. cit. dr. vi. syr. de alib. lfernek. unc. i. M.

Vinum Diureticum. R. gr. alkek. unc. i. rad. eryngi
onoid. an unc. S. bacc. juniper matur. unc. S. incis & in
sindone ligat. affunde vin. alb. lib. iii. dos. unc. v. pre-
misso in sculo decoct. petrosel. cit. rub. cum butyr. & mo-
dico sal.

Brodium Diureticum. R. cit. rub. cochl. i. rad. pe-
trosel. alth. an dr. ii. haledcab. gr. x. coq. cum quarta
parte Gallin. vel media pulv. columbin. Col. subinde ad-
ditur succ. lim. vel cum eo sumatur gat. viii. vel x.
spirit. therebinth.

Emulsio Diuretica. R. sem. violar. unc. S. litho-
sperm. contus. dr. ii. aq. fragor. q. S. M. f. emuls. dulcor.
sacch. S. Harn-treibende Milch auff einmahl einzun-
nehmen.

Alia. R. sem melon. dr. vi. papav. alb. dr. i. violar.
dr. i. S. nuct. persic. unc. S. aq. petrosel. alkek. frag. an
unc. iii. M. f. emuls. add. ocul. cant. prap. dr. i. sacch.
cand. q. S. pro edulcorat.

Boli ex Therebinthina. R. therebinth. cyp. aq.
matv. sepius lot. unc. S. troch. de alkek. S. op. scr. i pulv.
subtilis. glych. gr. xv. cum sacch. S. q. M. f. bol. 3. mino-
res M. v. & nocte sumendi.

Pilulae Diureticae. R. ocul. cant. prap. dr. S. sal.
onoid. scr. i vol. succin. scr. S. thereb. aq. matv. lot. &
coct. dr. iii. M. f. pilul. pisi magnitudine. dentur ad scatul.
cum pulv. Glych. S. Harn- und Gries-treibende Pil-
lulen / darvon 10. oder 12. auff einmahl einzunehmen.

Pul-

Pulvis Diureticus. *R.* chryst. tart. dr. iij. magist.
 ocul. canc. sal. ononidi. an scr. xv. *M. f. pulv.* *S.* Vers-
 mischter Harn-treibender Weinstein 3. Messer Spitze
 voll auff einmahl zu nehmen.

Alius. *R.* ocul. canc. prap. dr. i. sem. mil. sol. scr. i. *S.*
 tart. Vitriolat. gr. xv. *M. f. pulv.* dissid. ad 3. p. aq. sumen-
 das ex brodio cic. rub. Vel aq. ononidi. petrosel. mako. cum
 spirit. sal.

Alius fortior. *R.* Milleped. prap. scr. i. ocul. canc. gr.
 xv. sal. Vol. succin. gr. v. Vel vj. *M. f. pulv.*

Clyster Diureticus Therebinthinatus. *R.* herb.
 mako. parietar. mercurial. beton. an mj. fl. chamom. me-
 lilot. sumit. aneth. an *M.* *S.* sem. anis. fanic. carv. an dr.
 ij. lin. dr. iij. coq. in aq. *S.* q. ad 3. in col. unc. x. dissolv. elect.
 lenit. Vel caß. pro clyst. dr. vj. hier. *S.* bened. lax. an dr. ij.
 ol. scorp. chamom. an unc. i. thereb. Vitell. ov. dissolv. unc.
 S. mell. anthos. dr. vj. sal. parum *M. f. clyst.*

Unguent. ad renes & vesicam. *R.* ung. de alth. rosac.
 infrigid. Gal. an unc. *S.* ol. scorp. unc. i. succ. lim. dr. vj. *M.*
S. Leunden. Sälzl.

Aliud. *R.* ung. de alth. dr. vj. ol. amygd. scorp. an dr.
 ij. pingued. cunic. dr. ij. petrol. alb. dr. j. ol. destill. spic.
 luniper. an dr. *S. M.*

Cataplasma foresti expertum in Ischuria vesicali. *R.*
 pariet. mj. charesol. mj. *S.* incis. coq. in *S.* q. aq. Vel latt.
 ad mollit. Alij etiam addunt cep. sub cineribus coct.
 add. butyr. rec. unc. ij. ol. scorp. unc. i. *S. M.* applicetur
 calidè.

Aliud fortius. *R.* cep. alb. crud. No. vj. capit. allij
 No. ij. contus. in mortar. add. pingued. anser. & ol. scorp.
 q. *S.* cum guttis paucis ol. destill. luniper. *M.* pro Ca-
 tapl. applicando renibus & vesicæ.

S. V.

*De Officio Medici in evacuatione salivali, ac
ordinandis remedijs salivantibus.*

I.

INter hætenus dictas universales corporis evacuationes postrema est *salivatio* seu universalis *Ptyalismus*, quo mediante per copiosorem salivæ effluxum veluti per universalem apophlegmatismum universa massa sanguinea sero suo una cum vitiosis fermentis in eo contentis liberatur. Indicatur hæc evacuatio principaliter à lue venerea, & ea præsertim quæ sudoriferis non cedit: ossa tamen nondum exsist, sed ubi ulcera, serpigines, tubercula faciei, aut penis & corporis totius sicca, membrorum lincinationes, & secundario verò etiam ab alijs morbis rebellibus & contumacibus ex vitio graviore feri oriundis, ut v. g. lepra seu Elephantiasis Græcorum, Epilepsia, arthritide contumaci, scabie maligna, ulceribus crurum cacoethicis, affectibus cutaneis gravioribus, asthmate humoroso, cancro, scorbuto frigido, idque eo magis quando in his malis quid venerei intercurrit

II.

Materia remedijs salivatorij est potissimum *Mercurium* qui ob partes suas volatiles, elasticas ac summè evaporabiles, & sulphur peregrinum arsenicale succum alimentosum, seu massam sanguineam lymphaticam colliquetaciendo, ac coagulata fluxilia reddendo, serumque turgescens reddendo, ut torulis suis consistere haud valens exitum affectet, in causa est, ut illud cum absorptis vitiosis fermentis venereis, alijsque ad os & fauces continuo confluens & affluens sub forma salivæ evacuetur. Modus hunc Ptyalismum excitandi duplex est, unus, qui per interna peragitur, dum in usum trahitur *mercur.*
dulc.

dulc. vel *turbith. mineral.* Croll. vel *arcantum corralinum*: alter, qui per externa ut *uguenta*, *suffitus*, qui tamen periculosi, *Emplastra* quæ tamen, sicuti *gummarum*, dolores ac tumores venereos potenter resolvunt, ita ad salivationem excitandam segniora sunt, licet eam promovendi gratia, subinde in usum trahi queant. Idem ferme dicendum de *cingulo sapientia*, quod nihil aliud est, quam pannus laneus *mercur.* vivo cum *pingued.* porci subacto imprægnatus, qui dein lumbis per modum cinguli applicatur, cum in levioribus tantum malis scabie nempe & Phthyriasi, ubi salivatione opus non est, adhibetur, ut interdum eam excitet. Supradictis igitur Mercurialibus in usum tractis fluxus salivæ succedit primò tenuis, hinc mucilaginosæ. & tertio denique viscidioris, & sætidæ, quæ finis est perfectæ salivationis.

III.

Sicuti autem coindicant evacuationem salivalem vires constantes, ætas juvenilis & virilis, tempus verum & æstivum, regio magis calida, quam frigida, ita contraindicant corpus debile, emaciatum, vires exhaustæ, malum nimis radicatum, ætas, puerilis & senilis, ulcera ac inflammationes viscerum, Phthyses, nervorum nativa debilitas, scorbutus biliosus, hæmophthysis, nimis hæmorrhagiæ, tempus autumnale tum ob frigus, tum ob humores tunc temporis magis lentos, & minus fluxiles. Hyemale, præsens quoque vomitus, diarrhæa, sudor vehemens, illa tandem subiecta, quæ ante morbum Gallicum ulceribus oris, vel angina, tremore paralyti, convulsione, macie &c. fuerunt de-
tenti.

IV.

Pro debita huius curæ administratione Medici officium erit observare. 1. Cautum debere esse ejus usum, cum mercurialia plerumque post se relinquunt
cha-

characterem indelebilem , adeoque non administrandam , nisi urgente necessitate , morbo nempe ita pertiaci existente , ut decocto lignorum non cedat , vel illud ob alias circumstantias exhiberi non potuerit , huic etiam utile erit , ut Medicus ante huiusmodi curam præmuniat se prognostico prædicendo , quæ fieri solent seu bona seu mala , subinde enim efficacissima hæc cura deprehensa , ut mox exsiccentur ulcera , crustæ evanescant , tubercula , calli destruantur , ac omne seminium morbosum perfecte eximatut sine metu recidivæ , & quidem tuto si cum debitis cautelis instituitur. 2. Nonnullos corpus prius ad hanc curam perv. s. & purgationem disponendum esse jubere ; immo balneum aquæ dulcis , cui æger ante curam quottidie semel vel bis insideat , adhibere , ut humores attenuentur , & pori magis Patuli faciliorem penetranti Mercurio aditum concedant : nonnullos contra ommittere has præparaciones , ut ægri nullis evacuationibus debilitati salivationis impetum multo melius sustinere valeant. 3. Ægrum nudatum collocari debere ad fornacem calidam inungendo proprijs manibus unguento Mercuriali plantas pedum , talos , genua , carpos , & in malo urgentiori etiam cubitum : immo etiam in pertinaciori affectu sed rarissime spinam : ac continuando aliquamdiu hanc inunctionem , donec labia intumescant : Parotides doleant , lingua infletur , ac salivatio prodire incipiat. 4. Instituendam manè jejuno stomacho , vel nocte , nam raro bis eodem die fit inunctio in loco concluso. 5. Peracta inunctione (cui simul inter inungendum concinna frictio jungatur) ægrum lecto calido committendum esse : ut sic transpirabili servato corpore magis actuetur vis mercurialis.

V.

PRæterea 6. notabit Medicus , inunctionem , si citius labore defungi velimus , vel æger robustus sit , al-

tero die statim rep̄eri posse: aliàs interpolationem unius diei faciendam, ac tertio demum die realumendam esse. Non enim præscribi potest certus inunctionum numerus, cum subinde primo vel altero statim die incipiat salivatio: ordinariè verò circa quartum vel quintum superveniat, ac ut plurimum per se intra dies 15. finiatur. Interim ubi malum valdè contumax, tardius & 14. to primùm die subinde supervenit. 7. Desistendum esse ab hac cura, si non sequatur salivatio, sed hujus loco superveniant ventris tormina, Dysenteriz, dolores ventriculi, sudores frigidi &c. 8. Unicè in hac cura procurandum esse, ut salivationis actus moderetur ad euphoriam naturæ, id est, ne vel nimium eveharur cum ægri vitæ periculo, neque plus æquo deprimatur, ut elanguescat, ante quam symptomata penitus disparuerunt. Priùs fit per mutationem linteorũ & indusiorum post quartum diem à statu salivationis, uti etiam per alvum ducentia, quæ eam ad oculum diminuunt, hinc si eadem conservanda non nisi quarto die levis clyster injiciendus præterea eam cohibent opiata, & theriacalia: posterius fit tenendo in ore globulum ex *Mercur. dulc. cum traga.* parat. vel juncturis & volis manuum ac plantis pedum applicando Emplast. *Sigon. cum Mercur.* vel sicut etiam fumendo *mercur. dulc.*

VI.

INsuper 9. sub ipsa salivatione quàm maximè debitum diætæ Regimen observandum esse, jubebit Medicus præscribendo diætã tenuem, pro potu decoct. lignorum, non tamen nimis forte ne sequatur sudor salivationem impediens, cavendo quàm maximè aërem vel potum etiam frigidum, ne materia cumulatim ad fauces ruens repercutiatur cum metu suffocationis, vitando insuper vinum utpote noxium, ac graviores animi affectus, prospiciendo etiam symptomatibus, quæ cidentur à salivatione, qualia ordinariè sunt febris longa, uliginosus, & fastidiosus fætor, dentium vacillatio, nigredo

gredo &c. Sic dum salivantes tribus vel 4. primis diebus acerbos sufferunt dolores ob gingivarum, & colli inflammationem, lacte tepido gargarizato adjuvandi, sic dentes hoc tempore unctuosus non illinendi, ne à mercurio denigrentur, difficulter vel rursus nunquam dealbandi, si etiam, si tempore salivationis magna succedat gingivarum Hæmorrhagia, ea non statim sistenda, nisi limites excedat.

VII.

TAndem id. notandum, salivationem, quæ convalescente ægro in dies minuitur, leniter adhuc promovendam esse Mercurio dulci semel adhuc in septimana exhibito, immò etiam postquam convaluit æger, & sub dio rursus versatur. Cessante autem omnino fluxu ægrum denuo purgandum, ac decoct. lign. sudoriferum propinandum esse nonnulli suadent, ad eliminandas sor-des hinc inde forsân restitantes, uti & penitus extirpandum è corpore Mercurium. Alij econtra id præstant per flores sulph. cum folijs auri assumptos, vel auri frequenter in ore gestationem rursus, si albescit, per ignem depurandi, frictiones, Balnea sulphurea &c. II. Sciendum curationem huius luis per *suffumigia* magis periculosam esse, quàm per inunctionem, sicque non adhibendam, nisi omnibus reliquis frustra tentatis. Sunt autem duplicia, & quidem vel *universalia* toto corpore excepta, dum æger per dies 4. 5. vel 6. sub labro stragulis cooperto, ut caput superemineat, vel etiam eodem incluso, si pustulæ & ulcera sint in eodem, uti etiam in fronte, temporibus & collo, ita tamen, ut per fistulam foris prominentem aërem inhauriat, ignitabulo vivis carbonibus instructo, & infra sellam patientis posito, pulvereque suffitus inperso fumum excipit per quadrantem, aut dimidiam horam, hincque in lectum se confert expectando operationem Mercurij, vel *particularia*, quæ magis in usu, certisq; partibus ut cruribus, vel brachijs tophis aut ulceribus malignis divexatis adhibentur.

Formulae

Salivantium internorum.

R. Mercur. dulc. ritè præp. gr. x. dentur cum vitell. ov. ascendendo quotidie cum uno grano, usque dum de-
peniatur ad gr. xxv. & ultra. Vel

R. Mercur. dulc. dr. S. vel scr. ii. extract. Scorx. scr. i. M. f. Pilul. No. xxx. dentur pro dos. vi. vel x. ascen-
do cum grano quotidie.

R. turb. mineral. Croll. cum spirit. sulph. parat. vel
Mercur. præcipitat. speciatim cum spirit. nit. aliàs arca-
num corallinum dictum gr. iii. vel iv. sequenti die v. hinc
vi. &c. donec omnes doses simul 15 vel 20. grana comple-
verint, cum raro plus requiratur.

Formulae

Salivantium externorum.

Unguentum simplicissimum. R. Mercur. crud.
unc. i. axung. porc. unc. ii. M. in mortar. S.
Gewex. Silber = Salben / wie bewußt / zu ge-
brauchen.

Aliud. R. Mercur. viv. cum S. q. thereb. extinct. &
inviscat. ab unc. i. ad ii. ung. pomat. ad ung. iii. ad iv.
ol. laur. unc. S. ol. destill. lig. Rhod. scr. S. M. S. ut supra.

Aliud magis compositum. R. axung. porc. lib. S.
ung. agripp. marriat. ol. laur. thereb. an unc. i. S. Mercur.
viv. extinct. unc. iii. sublim. dr. i. S. thur. myrrh. an dr.
i. lytharg. dr. vi. M. f. ung.

Suffitus. R. einnab. unc. iii. antim. unc. i. S. thur.
benz. storac. an dr. iii. succin. myrrh. an dr. ii. M.

Alius. R. Mercur. cinnab. antim. oliban. sulph. an
unc. S. M.

Cingulum sapientiæ magis compositum. R. argent.
viv. unc. ii. ol. vitriol. unc. S. charyoph. dr. i. Bux. sul-
phur.

phur. andr. ii. album. ov. No. xii. sal. gemm. cer. an q. s.
M. f. mass.

§. VI.

De Officio Medici in evacuatione Particulari per Errhina, sternutatoria, apophlegmatizantia, & expectorantia.

I.

INter particulares evacuationes, & præsertim capitis principalem locum habet illa, quæ fit per *errhina*, & *sternutatoria*, quorum illa lympham seu pituitam per nares proliciunt sine sternutatione, hæc autem, quæ etiam *ptarmica* picuntur, id præstant cum sternutatione, hinc majori vel minori tantum acrimonia, & gradibus inter se differunt, sitque operatio *errhinorum*, dum serum liquant, & fundunt è papillis glandosis narium, dum salinis suis spiculis irritant, & titillant glandulosam seu spongiosam carnem, quam nares intus vestiuntur, & hinc successivè lympham seu pituitam per illam excerni solitam versus illam proliciunt, ejusque excretionem faciunt, tenuioribus etiam earum partibus, uti juxta veteres haud improbabile est cerebrum per os cribrosum, & nervos olfactorios penetrantibus, in eoque humores attenuantibus, & serum ad nares deducantibus vi particularum acriorum salinarum nitrosarum, aquearum & detergentium. *Sternutatio* verò fit, dum interior membrana narium majori particularum suarum acrimonia, & acutiè irritatur, & vellicatur, hinc spiritibus vehementius commotis, ac meningibus in consensum tractis cerebrum cum membranis se per vices contrahit, & explosis unà spiritibus in nervos paris vagi, vel juxta alios per consensum irritatis inter costales cum membrana narium mediantibus nervis.

consentientibus diaphragma quoque, & musculi thoracis expirationi inservientes, veluti spasmo convulsivo contracti subitaneo impetu aërem elidunt, quousque res irritans excutitur.

II.

Conveniunt igitur. 1. Motum feri promovendo, illudque evacuando tum mediata ex cerebro, tum immediata ex naribus, hinc etiam vulgo caput purgia appellantur, ac prosunt in affectibus Catarrhalibus, ac morbis capitis diuturnis, in excretionem muci per nares abolita, vel imminuta ut in coryza, ammisso odoratu, obstructione narium &c. 2. Non tam prosunt humores liquando, liquatōsque deplendo, vel materiam morbificam displodendo, quā vel maximè sopitum archaum, aut spiritus excitando ut in apoplexia, affectibus soporosis, hysteriis, secundina retenta, & partu difficili musculis abdominis quoque versus inferiora compressis. Sic Hipp. 5. aph. 35. 111. *Mulieri hysterica aut difficulter parienti, sternutatio superveniens bono est.* Singultu etiam teste eodem Hippoc. 6. aph. 13. *singultu sagitante sternutatio superveniens liberat.* 3. Caput quoque simul virtute sua cephalicā subtili volatili, aromaticā roborando ut in memoria debili, torpore ac defectu spirituum animalium, capite & cerebro debili, vertigine &c. 4. Prosunt abstergendo atque exsiccando ut in ozæna, polypo &c. Huc quoque spectant Medicamenta Ischæmatica, seu sanguinem sistentia in narium Hæmmorrhagia naribus intrusa.

III.

Scienti igitur Errhina vel sternutatoria in prædictis affectibus indicantur, ita contraindicantur præsertim sternutatoria. 1. Organis seu sum affectis, ac inprimis debilitatis ut in ophthalmia, auditus difficultate, tinnitu, autium dolore &c. 2. In infantibus, senibus, mulieribus, gravidis. 3. Partibus, quæ ad sternutatio-

nem

nem necessatio concurrunt, malè habentibus, ut in doloribus capitis, fracturis vel luxationibus costarum, phrysi, hæmophrysi, stillicidio sanguinis, procidentia ani, uteri, Intestinorum &c. 3. In nimium siccis, biliosis, Melancholicis, cum magis convenient pituitosis, quibus serum est copiosius, ac cujus coagulationem plurimum prohibent.

IV.

PRO legitima harum administratione Medicus observabit. 1. Ea ordinariè non convenire, nisi præmissis universalibus. 2. Minus ea administranda esse, ubi serum peccat in nimio motu explosivo. 3. Præmura nec nimis frequenter, nec acriora convenire, cum commotio cerebri majoris sæpè mali causam præstare soleat ex conatu ad expellendum fortiori facto. 4. Moderatè usurpata præsertim si simul sint confortantia & cephalica vegetam reddere naturam, excitare sensus, roborare cerebrum, serumque abundans evacuare: immoderatè econtra partes à tono deicere, serumque nimis evacuare, idque non tantum superfluum, sed etiam utile, præmura enim purgantium more humores alias etiam laudabiles corrumpunt, & quasi tales prius corrupti fuissent, evacuant, hinc faciliè patet, quid de usu vel abusu tabaci per nares attrahendi sentiendum, ac qualis distinctio adhibenda sit habita etiam consideratione subjecti siccioris vel humidioris. 5. Nimiam sternutationem sisti lacte vel ol. amygd. attracto, sic etiam ex observat. Frid. Hoffman: oculi angulo compresso sternutationem impediri. 6. Errhina vel præscribi in forma liquida, & de his ægrum tepidè manè duabus horis ante prandium, vel etiam ante cænam ex volâ manus aliquid per nares attrahere, ore aquâ pleno, idque ter vel quater, vel formâ linimenti, quod digito vel penna naribus, vel ad radicem nasi ad oculi angulum majorem illinitur, vel formâ pulveris, de quo vel vapor tantum aut parum aliquid attrahendo inspiratur, vel mediante

calamo unum vel alterum granum in nares insufflatur.

V.

TAndem particularis capitis evacuatio fit per palatum mediante salivatione particulari, dum saliva moderatè è glandulis oris, locisque vicinis evacuatur, indequè consequenter caput lymphæ præternaturali onustum liberatur, unde etiam medicamenta hæc præstantia dicuntur apophlegmatizantia à phlegmate scil. eliciendo, uti & salivantia, eò quòd serum sive coagulum, quod phlegma dicitur, sive fluidum, quod salivæ nomine comprehenditur illuc trahant. Dicuntur, & masticatoria ab effectu, quod masticata affluxum ad fauces promoveant, & restituentem ibidem lympham, vel serum eliminent. Sic v. g. mastix masticata intra paucas horas ad uncias aliquot sputum elicit. Vim suam exserunt hæc medicamenta tum glandulas miliares faucium in motum ciendo, ac earum poros tum motu, tum calore aperiendo, & dilatando, tum particulis suis salinis, aculeatis, incisorijs, & fundentibus humores serosos proximiùs circa faucium, isthmus restitantes fundendo, liquando & incidendo.

VI.

Conveniunt prædicta remedia, atque indicantur. 1. Tàm præservatorie quàm curatorie in Cattarrhalibus capitis, & vicinorum locorum affectibus ut dentium, maxillarum, gingivarum &c. 3. In vertigine, Memoriae debilitate, affectibus soporosis suffusione, turditate, auditu difficili, tinnitu, oris fatore, & aphonia. 3. Prophylactice pro evitando maligno, & contagioso miasmate, quod plerumque salivæ se associat, hinc masticata myrrha, zeduarum, vel rad. angelic. cort. cit. &c. optime malignorum morborum sunt præservativa. Contra indicantur contra à sero fluxili, tenuiori & falso, hinc apophlegmatismi in phthyli, tussi, pulmonumque affectibus cane pejùs, & angue fugiendi, item

ab

ab ipsis oris affectibus ut uliginē gingivarum, scorbuticā cum laxitate, & putredine ac uvulæ lapsu, nisi adstringentibus maritata, nunquam enim per locum affectum evacuandum. Præscribuntur apophlegmatismi, vel in forma sicca, dum aut simplicia, vel pulvis horum cum mastiche panno lineo raro, sed forti per modum noduli exceptus masticatur, aut exinde fiunt trochisci lupinares, quorum unus masticatur, & sæpius in ore volutatur manē jejuno stomacho, vel etiam duabus horis ante cœnam per semihoram, accapite prono sæpius expuitur, quod dissolvitur ablucendo postmodum os vino, vel aqua tepida, vel in forma liquida per modum gargarismi.

VII.

TAndem ultima evacuatio Particularis sit ex pulmōnibus per *anacatharsim* seu *expectorantia*, quæ e pectore mediante tussi superfluos humores ejiciunt, circa hæc observabit Medicus. 1. Ea pro humoris expectorandi qualitate esse duplicia, & accuratam inter ea esse faciendam distinctionem, alia enim humores crassos, viscidos & lentos incidunt, attenuant, detergunt, atque membranam internam, fibrāsque pneumonicas ad contractionem, & excretionem irritant, maximè utilia in tussi humida, asthmate, Phthysi, pleuritide, catarrho suffocativo &c. Unde etiam audiunt *bechica*, *arteriaca*, & *Pneumonica*. Alia, quæ agunt humores tenues, acres, salios, titillantes & rodentes incrassando, pepasum inducendo, orgasmum tollendo & acrimoniam fluxilem retundendo, moderando ac figendo, unde etiam audiunt *intercipientia*, quod in via ituros ad Pulmonum humores quasi remorentur utilia quàm maximè in tussi ferina, hæmoptysi, Catarrhis salis, ubi materiam acrem tenuem, quæ aërem circumfluendo ab illo sursum ferri nequit, temperant, & incrassant. 2. Ea præscribi ut plurimum vel forma syrupi, & linctus, qui pitissando, seu sensim ac sensim

blande lambendo, seu liagendo assumitur, ut in ore dissolutus paulatim defluat, in quem finem sæpius etiam præscribitur *baculus Glychireæ*, id est, particula radice hujus, ut altero extremo leniter contuso intingi, & in ore sugi possit, vel forma rotularum, quæ subinde alijs expectorantibus præferuntur tum quia gratiores, tum quia sensum liquescentes magis ingredi censentur laryngem, ac pulmones, vel formâ aq. destillat. sacch. cand. edulcoratæ.

VIII.

PRæterea circa hæc notabit. 3. Expectorantia longius a pastu, vel ante eundem m. & v. sumenda, neutiquam verò cum cibo, vel mox ab illo, cum sic adhibita coctionem turbent, lacteas obstruant, & chylum viscosiorem reddant: immo nec potum desuper statim capiendum, ne roscidum illud parietibus bronchiorum allidens abluatur. 4. Eadem præsertim dulcia minùs prodesse in subiectis, quæ eadem abhorrent ut sæminis hysterici, hypochondriaci &c. 5. In continuatione horum medicamentorum aureum illud monitum *Cratonis* observandum esse, ne nimis sæpè & diu utamur dalcibus expectorantibus, cum non tam illabantur pectori, quàm ventriculum & Epar lædant, dulcia enim præsertim continuato usu parietes ventriculi laxant, calorem obtundunt, fermenta deiciunt, coctionem, & appetitum diminuunt Epar nstant, ac obstructions generant.



§. VII.

S. VII.

*De Officio Medici in præscribendis remedijs,
Errhinis, sternutatorijs, apophlegmati-
zantibus & expectorantibus.*

Formulæ.

Errhinorum & sternutatoriorum.

ERrhinum liquidum. R. fol. sal. major. bet. an
mj. contus. assund. aq. destill. majoran. & Vin. alb.
q. S. exprim. per linteum. S. Schnupff-Wassere
lein / darvon Morgens nüchter 2. oder 3. Löffel voll
in die Nasen zu schnupffen.

Aliud. R. aq. majoran. unc. i. mann. calab. dr. ij.
Vel Vitriol. alb. gr. v. M. Vel simul adde sem. nigell. scr. i.
fol. beton. scr. S. amb. gr. ij. M. S. ut supra.

Aliud fortius in affectibus soporosis. R. sal. Vitriol.
alb. dr. ij. aq. major. unt. i. spirit. lil. conval. dr. i. M. S.
Nieß-Wasserlein mit einem Sprizt in die Nasen
zu spritzen. Hoc injectum per syringam in nares insig-
nem quantitatem per os, nares, oculos & palatum ex-
trahit.

Balsamus pro naribus obstructis. R. pingued. ans.
cum aq. major. ter. lot. unc. S. ol. dest. major. gut. v. sal.
beton. an gut. ij. M. S. Nasen-eröffnender Balsam /
darvon einer Arbest. groß in ein Nasen-Loch zu thun.

Aliud linimentum. R. ung. ros. pomat. de alth. an scr.
S. ol. major. gut. vj. lavend. gut. i. M. S. ut supra.

Aliud fortius. R. rad. Elleb. alb. elater. an dr. S. succ.
bet. dr. ij. ol. major. & cer. an q. S. M. f. linim. cujus por-
tioncula instar cicere naribus admoventur.

Pulvis sternutatorius Timas expertus in affectibus so-
porosis. R. Elleb. alb. piper. alb. castor. an scr. i. ol. de-
still. rut. majoran. sal. an gut. ij. M. f. pulv. subtiliss. S.

Stardes Nieß-Pulver / darvon ein oder anderes Gran durch ein Feder-Riel in die Nasen zu blasen.

Alius Hartmani in apoplexia usualis. R. fol. maior dr. ij. sem. nigel. dr. j. rad. Elleb. nig. scr. ij. mosch. opt. scr. S. amb. gr. v. M. f. pulv. de quo magnitudo pisi calamo fortiter insuffletur in utramque nares.

Alius tam curativè, quàm præservativè proficiuus: R. herb. maior. fl. anth. an. dr. ij. sem. nigel. dr. j. rad. Elleb. alb. scr. S. mosch. gr. v. amb. gr. ij. ol. lign. Rhod. gut. v. maior. cinam. an gut. ij. charyoph. gnt. ij. Bals. apoplect. scr. S. M.

Alius in Cattarrhis. R. fol. lil. convall. p. ii. herb. maior. basilic. an pij. tabac. dr. j. M. f. pulv. tenuiss. cui add. amb. mosch. an gr. ij. ol. anis maior. an gut. ij. M.

Alius in Coryza. R. pulv. lil. convall. maior. tabac. brasil. an gr. xv. ol. anis. gut. ij. Bals. apoplect. gr. iv. amb. gr. ij. M. f. pulv. S. Nieß-Pulver.

Alius. R. Tabac. ind. unc. S. maior. lil. convall. an dr. ij. ol. destill. anth. gut. vi. charyoph. gut. iii. amb. gr. mosch. g. ii. M.

Tabacus præstans cerebrum simul corroborans. R. herb. maior. lavend. rorism. an dr. ii. rad. Ir. flor. dr. ix. herb. basilic. dr. i. pulv. tabac. opt. dr. ii. cinam. mac. charyoph. an scr. i. lig. Rhod. santal. cit. an scr. iv. ol. lig. Rhod. gut. xxx. mosch. opt. gr. xv. amb. gris an iii. zibeth. gr. ii. M. f. pulv. S. Haupt-stärckender Taback.

Alius Cattarrhalis & simul corroborans colore albus. R. sacch. albiss. unc. vi. rad. Ir. flor. dr. x. Elleb. alb. dr. vi. Bals. apoplect. scr. S. peruvian gr. vii. mosch. gr. v. amb. gr. iii. ol. lig. Rhod. gut. v. cinam. charyoph. an gut. ii. M.

Pulvis sternutatorius Helmont. R. rad. Elleb. nig. pulv. sacch. an p. æq: f. pulv.

Alius Papalis dictus. R. rad. Ir. fl. part. 2. maior. part. i. M.

Pul-

Pulv. sternutatorius Mülleri. R. fl. beton. paralyf. falv. lavend. an scr. i. lil. convall. dr. S. spec. diamosch. d. dianth. an scr. S. diatr. scr. ii. sacch. cand. ad pondus omnium add. ol. mac. succin. anif. an gut. iii. M.

Plures formulas addere superfedeo, cum ex his variè mixtis infinitæ concinnari possint.

Formulae

Remediorum apophlegmatizantium.

Masticatorium in Catarrhis. R. nuc. mosch. dr. i. mastich. Gum. arab. an dr. S. redig. in pulv. & cum S. q. aq. ros. M. f. troch. S. Zeltlein/ davon ein oder anders in dem Mund zu zerfülen.

Aliud v. g. in difficultate auditûs. R. rad. pyreth. dr. i. Ir. dr. S. agar troch. scr. ii. cubeb. nuc. mosch. an dr. S. cardam. dr. i. ex subtilis. pulverisat. cum S. q. mastich. in mortar. calid. dissol. f. pastill. quorum quilibet pendeat scr. i.

Aliud in metu Paralysis vel apoplexiæ. R. mast. dr. ii. S. rad. pyreth. nuc. mosch. cubeb. mac. sem. anif. an dr. ii. maioran. scr. S. alipt. mosch. gr. iv. cum cer. & mell. inspis. S. q. M. f. troch. masticator. pondere gr. xxv. teneat unum vel alterum in ore, masticetur & collecta pituitate expuatur.

Aliud in dolore dentium. R. mac. nuc. mosch. an scr. i. cubeb. gr. xxv. rad. Ir. flor. pyreth. sem. sinap. an gr. viii. piper. 22. an: gr. v. pulverisat. subtilis. excipiantur pauxilla cera & f. troch. lupinar.

Apophlegmatismus liquidus. R. rad. Ir. flor. unc. S. fol. orig. falv. stach. rorism. an M. S. cubeb. dr. iii. liq. dr. i. S. coq. in aq. partibus aq. & vin. alb. sub finem additi ad lib. i. in Col. dissolv. oxymel. squillit. unc. ii. M.

Alius. R. scob. lign. quaiac. unc. S. rad. pyreth. dr. iii. herb. falv. nob. pi. alum. sal. nis. an dr. i. sem. urtic. sinap. an scr. i. acet. vini opt. unc. iii. aq. i. uls. unc. vi. M.

M. f. decoct. quo os calidè eluendum, quod magnam copiam phlegmatis extrahit.

Alius in amissa loquela. *R.* acor. *Ger. unc. i. galang. cyper. cost. an unc. S. nuc. mosch. dr. ij. herb. majoran. sal. an mj. f. decoct. cum aq. & Vin. add. mell. anthos. q. S. M.*

Alius in dolore dentium. *R.* rad pyreth. *unc. S. fol. nicotian. cort. rad. mandrag. an dr. ij. fol. sabin. persicar. serpill. an M. S. cubeb. unc. S. alum. scr. i. coq. in Vin. & aq. p. aq. ad 3.*

Alius. *R.* rasur. lign. sanct. *unc. i. coq. in aq. S. q. Vel R. mastich. dr. i. camph. dr. S. coq. in Vin. Vel acet. lib. S.*

Alius. *R.* organ. maioran. serpill. an mi. fol. nicotian. *piij. pyreth. unc. S. sem. nigel: dr. S. cardam. cubeb. an scr. i. S. mast. dr. i. coq. in aq. S. q. in Col. unc. & ij. dissolv. syr. de Nicotian. unc. i. de beton. unc. S. oxymel. squill. dr. ij. M.*

Huc quoque spectat suffitus Nicotianæ per tubulum vel simplex ejus masticatio.

Rotulæ in fætoze oris. *R.* troch. de Gall. mosch. *dr. i. myrrh. zeduar. an scr. ij. cort. cit. cubeb. charyoph. cinam. an scr. i. extr. acor. galang. angr. ij. cum sacch. in aq. ros. & fl. cit. solut. M. f. rotul.*

Formulæ

Remediorum expectorantium in materia tenui.

Linctus. *R.* ol. amygd. d. *rec. unc. ij. sacch. cand. subtiliss. pulv. q. S. M. f. linct. S.* Mit Zuckers Candi vermischtes süßes Mandl. Oehl öfters darvon zu nehmen. Utilis præcipuè in infantibus.

Alius. *R.* ol. amygd. d. *unc. ij. syr. Viol. unc. i. M. alij etiam addunt conf. ros. Vel R. ol. amygd. d. unc. i. sperm. cet. dr. i. syr. Viol. de hyssop. an. dr. ij. M. S. Brust- Schleckerlein.*

Alius

Alius. *R.* *ſyr. iuiub. papaſ. Erras. Vel de liquir. an unc. i. S. M. S.* Bruſt, Caſſel darvon zu Zeiten ein Löſſel voll langſamb hinabzuſlaſſen.

Alius in plevritide uſualis. *R.* *Mucilag. ſem. pſyl. aq. Violar. extr. unc. i. ol. amygd. rec. S. igne expreß. unc. ij. (apud pauperiores ol. lin. depur.) ſyr. Viol. ſacch. cand. alb. an. q. S. M. f. linct. detur cum bacul. glych. S. Huſten Caſſel.*

Alius. *R.* *ſyr. de liq. unc. ij. iuiub. unc. i. S. oxymel. ſquill. unc. i. M.*

Rotulæ. *R.* *rotul. diacod. alb. Vel de ſucc. Violar. Vel ſucc. liquir. inſp. iß. rotulat. unc. i. dentur ad ſcatul. S. Huſten Zeltlein.*

Aliæ in tuffi & rauedine expertæ. *R.* *ſpec. diatrag. fr. diair. S. an ſcr. ij. extract. rad. ennul. Vel liq. ſcr. i. ſacch. ſin. in aq. ſcabioſ. & tuffi lag. diſſol. q. S. Vel unc. xv. M. f. confect. in rotul. S.* Bruſt vnd Huſten Zeltlein ſich dero zu Zeiten zu bedienen.

Aliæ Cattarrhales. *R.* *ſpec. diatrag. diamarg. fr. an dr. i. Bol. armen: orient. dr. ij. confect. alk. complet. dr. S. conf. roſ. rub. unc. S. cum ſacch. in aq. fl. acac. S. q. diſſol. M. f. confect. in rotul. S. ut ſuprà.*

Aliæ. *R.* *ſucc. glych. inſp. iß. unc. S. ſpec. diair. diatrag. fr. Gumm. arab. rad. Ir. flor. an dr. i. ſacch. cand. alb. unc. ij. cum mucilag. gumm. tragac. M. f. trochiſc.*

Aqua Clara pectoralis. *R.* *aq. tarax. ſcabioſ. an unc. ij. ſacch. cand. alb. unc. i. M. & filit. Vel R. aq. tarax. ſcabioſ. tuſſilag. Veron. an unc. i. S. cinam. dr. ij. ſacch. cand. dr. S. M. S.* Huſten, Waſſerlein Löſſel, voll weiß darvon zu nehmen.

Alia. *R.* *aq. ſcabioſ. Veron. tuſſilag. tarax. an unc. i. S. cinam bugloß. unc. S. fl. arant. dr. ij. ſacch. cand. alb. unc. i. fl. ſulph. ſcr. i. lact. ſulph. ſcr. S. eleoſach. anis. dr. i. M. ad & M. S.* Tuſſt vnd Huſten, Waſſerlein.

In materia crassa & viscida.

Linctus. R. oxymel. squill. unc. i. S. syr. viol. unc. i. extr. croc. scr. S. Bals sulph. anis gut. vii. M. Item R. oxymel. squill. unc. ii. aq. cinam vel spirit. ceras. nig. dr. iii. M. Vtiles sunt in asthma.

Alius VVepferi. R. syr. de Erysm. Lobel. unc. i. S. oxymel. Elleb. Gesner dr. ii. Gumm. ammon. in acet. squill. dissol. dr. i. essent. croc. scr. S. ol. destill. anis gut. iii. aq. hyssop. unc. i. S. M. f. linct.

Alius expectorans. R. oxymel. squill. syr. de hyssop. an unc. ii. extr. croc. scr. i. fl. sal. armon. gr. xxiv. M. dos. cochl. i. cum sperm. cet. scr. S.

Alius. R. oxymel. squillit pectoral. Crat. vel looch. san. & expert. an unc. i. S. syr. de marrub. unc. i. ol. sulph. acid. gut. vi. M. Vel R. syr. de prafs. de hyssop. an dr. vi. viol. oxymel. squill. an dr. vii. aq. asthma. unc. S. M.

Rotul. R. rotul. diair. usitat. unc. i. S. ad scatul.

Alia. R. looch. san. & expert. unc. S. spec. diair. dr. ii. fl. benz. gr. v. sacch. albiss. in aq. fenic. dissol. unc. iv. M. f. rotul.

Alia. R. antim. diaphoret. ex regulo dr. i. fl. benz. dr. S. succin. alb. prap. mastich. subtiliss. pulv. spec. diatrag. fr. an scr. iv. croc. orient. gr. xv. Essent. amb. succ. gr. xvi. ol. anis. gut. vi. fenic. gut. iv. sacch. albiss. in aq. ceras. nig. dissol. unc. ii. M. f. confect. in rotul.

Aqua pectoralis. R. aq. ceras. nig. hyssop. an unc. ii. Epilept. lang. asthma. an unc. S. spirit. cephal. anhalt. complet. vel Elix vit. Matth. dr. ii. spirit. anis. opt. dr. ii. sacch. cand. alb. unc. S. m.

Alia expertissima. R. condit. rad. enpul. unc. i. S. cort. arant. cit. an unc. S. incisa contund. in mortar. effundend. aq. Hyssop. unc. vi. fenic. unc. ii. exprim. fortissimè Colat. add aq. asthma. unc. i. cinam unc. ii. looch. san. & expert. unc. S. M.

Alia.

Alia. R. aq. asthmat. unc. vi. S. cinam. dr. iii.
 sacch. cand. rub. unc. S. M. f. ebullit. ut sacch. dissolvatur
 sumantur. 2. Cochl prolubitu. Vel R. aq. asthmat. unc.
 ii. S. spirit. anis. unc. ii. sacch. cand. rub. unc. S. M.

Plura vide de Medicamentis Thoracicis.

C A P U T VII.

DE

Officio Medici in affectibus
 exigentibus curam lactis, cha-
 lybis, usum Thee, Capheè, Chocolatæ
 & laudani opiat.

§. II.

*De Officio Medici in ordinanda cura
 lactis vel serolactis.*

I.



Ac cujus utilitas, & necessitas tum
 in usu cibario, tum Medicinali verbis
 vix exprimi potest, è 3. conflatum est
 substantijs, quarum prima pinguis, &
 oleosa sive *butyrosa*, quæ aërea. Sec-
 unda crassa, sive *caseosa*, quæ terrena,
 & tertia tenuis & *serosa*. Pinguis temperata est, caseosa
 frigida & sicca serosa frigida & humida. Lac ergo to-
 tum in activis qualitatibus temperatum potius tamen
 ad frigidum inclinans: In passivis verò humidum ra-
 tione pinguis & serosæ substantiæ. Quo ad secundas,
 & reliquas facultates ratione butyri est epicerausticum.



& contemperatorium, siue mitigatorium, ratione feri
absterforium, ratione substantiæ caseosæ emplasticum
& incrassans.

II.

Lac illud optimum esse ex Galen. & Dioscoride colligit Medicus, quod colore candidum, clarum, purum ac sincerum, sapore dulce, omnisque amaritudinis, acrimoniæ, salsedinis & aciditatis expers; odore suave olens, aut boni saltem odoris exiguum quid spirans. *Consistentia* moderatum, hoc est, neque nimis crassum & caseosum, neque nimis tenue & serosum, sibi ipsi continuum, & ungui instillatum coherens, neque diffuens, recens multum, & ab animali bene pasto & habito petum. Inter ejus differentias in usu Medico usuales. 1. *Vaccinum*, quod omnium pinguisimum, & crassissimum est substantiæ caseosæ habens plurimum, serosæ minimum, hinc magis quidem nutrit: minus tamen alvum subducit. Sic etiam ob substantiæ crassitiem ægrius concoquitur, citius in ventriculo coagulatur, tardius descendit, difficilius distribuitur, magisque viscera obstruit. 2. *Asininum* priori contrarium, feri habens plurimum: casei & butyri minimum, hinc alvum magis movet: minus autem alit, concoquitur facile, descendit velociter, ac distribuitur promptè, & expedite. 3. *Caprinum* quod mediæ est consistentiæ, neque ita tenue & serosum ut asininum, neque ita crassum ut vaccinum. 4. *Ovisillum* caprino crassius minus usitatum est. Lac *Vernum* dilutius est *Asino*, alvumque magis emollit. Hoc in medio suæ naturæ consistit, ac post id tempus sensim crassescit, & evanescit.

III.

Hippoc. 5. aph. 64. curam lactis primo præscribit tabidis non admodum valde febricitantibus, id est, pulmonum ulcere detentis; si non adsit febris putrida, & quidem tum quia acrimoniâ salinâ sanguinis contemperat, eamque edulcorat, tum quia parte serosa

ab.

abstergit, caleos glutinat, ac butyrosa reficit: præterea lac assumptu suave, potu facillimum, nutritu solidum, & quâlibet escâ a pueritia familiarius, insuper visui colore delectabile, medicamen arteriam non asperans, guttur laxigans, ad ejiciendam pituitam spiritum facilem reddens, ac inferiorem exitum lubricum efficiens, maximè autem tunc convenit in Phrysi, si dolor molestus cum Phlogosi in gutture percipiatur. *Cura hæc Ludovicus XIII. Rex Galliarum Phrysius diu sustentatus fuit.* 2. Idem Hippoc. loco citato lacteam dietam commendat in præter naturam extenuatis, ac atrophis quacunque detentis, dummodo nullum adsit prohibens, aut contraindicans. Est enim lac ex omnibus ferè ferculis optimi succi, quod facile digeritur, leviq; negotio in sanguinem vertitur, sufficiens per quoque alit, corpus roborat, atque impingat.

IV.

PRæterea 3. convenit in Hypochondriacis, hystericis & scorbuticis præsertim calidioribus, & emaciatis, ac ad tabem inclinantibus. 4. Prodest in renum exacerationibus, ac præcipuè mictu cruento. 5. In Dysenteria, ubi non tantum per os assumptum, præsertim coctum cum sem. plantag. & rad. torment. aut symphit. vel silicibus ignitis, aut ferro candenti ustulatum prodest, sed etiam per alvum injectum, adeo ut Sydenham testetur, se plurimos curasse dysentericos solo lacte, vel ejus sero tepidè inferius injecto, & frigidè superius in copia propinato. 6. Hippoc. lib. de morb. Idem lac commendat in affectu Podagrico præservando, quod testatur etiam experientia & ratio, cum non tantum lac præbeat alimentum simplex optimum, naturæ summè familiare, sed insuper sanguinem dulciorem, micioresq; reddat, particulas in eo aciores contemperet, ac humorum eurgescerentiam reprimat, licet Podagræ causæ originali concoctionum nempe ac fer-

mentorum debilitati non contrarietur , sicque etiam omnem paginam non absolvat.

V.

Sicuti autem in prædictis affectibus lactis usus maxime proficiuis constat , ita haud raro etiam contraindicatur. *Hippoc.* allegato aphoril. 64. sect. 1. ait. *lac præbere capite dolentibus , febrientibus , & quibus elata Hypochondria murmurant , æsticulosi malum.* Item quibus febres acuta , biliosa deiectiones , ac copiosa sanguinis evacuatio facta est &c. Non igitur convenit. 1. Capite dolentibus , quia halituosum est , ac facile corrumpitur. 2. Acute febricitantibus , cum in his ob acrimoniam caloris depravetur , ac nidorosum evadat. 3. Quibus Hypochondria elata , id est , suspensa ob tumorem aliquem ; vel abscessum , aut murmurantia ob flatuum inclusorum copiam , In his enim facile acescit , ac in flatum vertitur. 4. Siticulosi , eo quod tales bile ut plurimum abundant , in quam facile lac verti solet. 5. Biliosâ diarrhæâ correptis ob eandem causam. 6. Quibus copiosa sanguinis evacuatio facta , cum calore nativo depauperati naturales facultates habeant infirmas , ut lac facile vitari , & acescere possit , licet enim lac alimentum sit euechymum , facile tamen etiam corrumpitur , & quidem in ventre præcalido in nidorem : In frigido autem in acorem. *Dioscorides* his addit Epilepticos , Vertiginosos , & nervorum vitio detentos. 8. Minus etiam prædest , præsertim assiduus ejus usus dentibus , & gingivis. Has enim flaccidas , istos cariei obnoxios reddit , hinc post ejus usum vino diluto aut meraco , aut cui mellis quid admixtum os colluendum.

VI.

Cura lactis alia potest dici *levis* , alia *stricta* , alia *mediocris* levis est , in qua solum quotidie mane ho-

ra sexta vel septima recenter ex asina vel capra emul-
 sum lac, vel etiam bubulum additâ dimidiâ Parte
 aquæ adjecto quoque saccharo, ne coaguletur ita repi-
 dum assumitur, vel citra ascendendum, & descenden-
 dum ad unc. vj. x. xij. & ultra, vel ascendendo ab unc.
 vj. per auctas quotidie unc. ij. usque ad lib. i. i. s. ij.
 non exclusis tempore prandij, & cænæ alijs alimentis
 boni succi. & faciliis coctionis. **Stricta diæta lactea**
 est, in qua excluso omni alio cibi, potusque genere
 æger solo lacte, vel saltem additâ sola medulla panis al-
 bissimi contentus vivere debet, eâ quantitate illud su-
 mendo, quam stomachus, vires ac ipsa necessitas vide-
 tur exigere, ita tamen, ut tota quantitas, quæ singulis
 diebus bibitur, in 3. partes divisa una mane, altera
 in prandio, & tertia cænæ loco accipiatur. **Medio-**
cris est, in qua lactis usus tempore matutino rite adhi-
 betur, in prandio vero parca licet manu conceduntur,
 quæ cum lacte analogiam habent, naturam pro necessi-
 tate, & rerum circumstantijs corroborate, stomachi
 tonum conservare, ac inappetentiam arcere valent, ut
 v. g. pulli Gallinæ. Gallin. capon. solo lacte & fursu-
 ribus nutriti, caro vitulina, hædina, ova tremula,
 oryza, lacticia, pulmenta lactea, amygdal. hor-
 deata &c. in cænâ hæc eadem non prohibentur, longo
 tamen parciori quantitate, quam in prandio, vel si
 pro ratione circumstantiarum ægro consultius sit, solum
 etiam lac in cænâ assumendum, in potu ab omni vino,
 in cuius abstinentia plurimum situm absteineat æger,
 contentus aquâ simplici, vel cocta cum china, lentile,
 vel mixta cum lacte;

VII.

EX triplici hac lactea methodo prima & ultima,
 præsertim veluti via media, & magis secura a plu-
 rimis tenetur. **Stricta** vero, quæ in podagricis ple-
 rumque præscribitur, multis suspecta est, & ob sequen-

res rationes minus cura censetur. Nam 1. *Experientia* teste, prout refert Sydenhamb. licet hæc cura multis profuerit, quamdiu ne latum unguem ab hac cura recesserunt, tamen quam primum ad sanorum dietam utuntur lenem, minimeque sese receperunt podagra contumacissimè reversa ægrum longè peius, quàm antea vexavit, labe lactatis nempe naturæ principijs morbo pellendo minus sufficientibus, ut adeo periculosius & diuturnius infestaret, hinc plurimi vel doloribus recentibus ingruentibus ab hac cura desistere coacti fuerunt, vel podagricos dolores intercurrentes lubentius tolerare, quàm perpetuam & molestissimam solius lactis tolerantiam sustinere maluerunt. 2. Si post continuatam aliquot mensibus lacteam curam febris, vel morbus aliquis magnus cum virium jactura ægrum prehenderit, vel universalis inappetentia, & languor supervenerit, a lacte abstinendum erit, cum tamen periculum sit, ne ventriculus tanto tempore lacti assuetus omne aliud genus ciborum respuat, aut difficillimè sustineat, atque adeo imbecillis patiens viribus prius deficiat, quàm ad alia assuefacta natura iterum refocilletur, unde etiam aliquos postquam diu strictioris lactis curæ sese subjecerant, atque etiam melius exinde habere videbantur, magno tandem aliquo morbo deprehensos citò interfuisse observarunt nonnulli, hinc merito hæc atque alia cautum in hac cura reddere debent. *Medicum eligendo* potius viam medicam utpote magis tutam.

V. L. I.

PRO debito lactis Dietæ Regimine Medicus notabit. 1. Corpus prius debite evacuandum, obstructionsque, si quæ adsint, referandas esse. 2. Lac vel asinum, ubi refrigerandum, & detergendum, vel caprinum, ubi magis nutriendum, vel vaccinum in podagricis recentibus ex ubere emulctum, ita calidum, & horis ante cibum fomentum esse, ita ut æger ab ipso allumpro neque dormiat, neque corpus validius exerceat.

j. Ne

3. Ne lac in ventriculo corrumpatur, aut aceſcat, ad
unc viij. 2. addendam eſſe unicam ſacch. vel mell. 4.
ſignum boni eventus curæ lactis eſſe, ſi urina cocta,
nec valdè cincta, nec nimis aquoſa, ſi fæces alvi non
crude, copioſæ, fetidæ, ſi nullam ſitum cauſetur. Se-
cus, ſi ſtomachus infletur, hypochondria tendantur
alvi, indureſcat, accedat vomitus, vel diarthra ſitis
magna &c. quæ ſigna ſunt corrupti lactis, hinc vel cor-
pus melius evacuandum, vel ab ejus uſu ceſſandum.
5. Antequam æger ſtriſtæ ſe addicit curæ lactis natura
paulatim ad eam aſſuefacienda utendo lacticiuijs, cibis-
que cum lacte analogiam habentibus ut oryza in lacte
cocta, amygdalat. hordeat. pineat. avenatis ovis ſor-
bilibus, Pullis Gallin. capon. carne hædin vitulin. &c. us-
que dum tandem ſolo lacte pro totali alimento uti poſ-
ſit æger ſeu calido, ſeu etiam frigido in quantitate ſto-
macho, & guſtui tolerabili abſtincendo à vino & omni-
bus alijs. Prædictis cibis utriusque æger poſeſt in diata
lactea, leviori & mediore.

IX.

PRæterea 6.to obſervabit, primo & ſecundo menſe
corpus ſubinde blando medicamento Rhabarbarino
vel alexico evacuandum & quidem, quo natura lacti
magis aſſuevit, majoribus inter poſitis intervallis;
quo minùs, minoribus. 7. Si lac aceſceret, vel coa-
gularetur, uti ſupradictum, addendum ſacch. alb. ſi
corpus exinde caleſceret, osque & fauces accenderentur,
addendam quattam partem aq. ſ. vel hordei. Si ven-
trem nimis fluidum faceret, ebulliendum, ei que ad-
denda ſalis communis aliquot grana, ſi conſpiceretur.
Rhabarb. pulveriſat. in primo hauſtu ſumendum. 8.
Si ſitum exaceret, extra paſtum aq. ſ. vel coctam cum
ſacch. permitti tam ſolam, quam lacti permixtam. 9.
Ab uſu lactis non deſiſtendum eſſe, niſi febris aut gra-
vis dolor podagræ ſupervenerit, neque etiam ob acci-
dencia à lacte cauſata tam facile ceſſandum, niſi vomiti-

tus & dolor capitis accedant. 10. Quantitatum lactis assumendi assignari a toleranti ventriculi, in cura levis ad unc. vj. lib. j. ij. in Mediocri totidem etiam cænz loco, in stricta finitis diætæ diebus nanc unc. 10. 13. 20. & totidem etiam loco prandij, & cænz sumendæ augendo dosim ad unc. 40. usque. ij. tempus continuandi diætam lacteam esse ad mensem 1. 2. vel 3. Immo in affectibus contumacibus, præsertim podagricis ad annum: Immo plures extendendam esse, nisi recidivam experiri velint, quibus tamen ex supradictis suadendum, ut prandij saltem tempore ad cibos boni succi, & facilis coctionis successive transeant ita tamen, ut nec varietas ciborum corruptelam, nec satietas cruditates generet abstinendo simul a vino, quod melius, vel non nisi lymphato parcissime utendo.

X.

Quibus lactis usus quandoque contraindicatur, vel ob febrem, aut borborygmos in hypochondrijs, aliasque causas, vel Epatis ac renum ardor per veris & æstatis decursum temperandus, humoresque adusti Melancholici ardores vagos, & phlogoses, præsertim excitantes, uti etiam varios fluxus sanguinis, maniam, scabiem canerum, scorbutum, aliosque affectus ex acido Melancholico oriundos, temperandi ac evacuandi, quique plus contemperatione, quam nutritione indigent, serum lactis die Jutten / oder das Räß-Wasser / vel cum succo cit. vel acer. aut cremi. tatt. vel tamarindis paratum, & quidem vel simplex vel herbis alteratum nsurgare possunt. Hoc enim non tam bilem flavam quam atram, exustosque ac sallos humores temperat, vi sua nitrosa abstergit, obstructions reserat, ardores compescit, atque acria & peregrina salia per Vrinam educit. Sumitur quotidie per mensem ad unc. vj. lib. i. quatuor horis ante cibum, vel etiam ascen-

dendo quotidie per unc. ij. ad lib. i. ij. iij. Hinc præ-
postera serie sensim ad primam dosim redeundo.

Sequuntur nunc paucae formulæ remediorum lactis,
aut seri lactis alterati.

Formulæ nonnullæ

Lactis vel seri lactis alterati.

Serum lactis in scabie proficuum. R. ser. lact. cum
succ. cit. parat. lib. i. col. bulliat. dein (tum quia
statulentum, tum ut quidquid adhuc inest calci
subsidiat) hinc infund: per noct. fumar. mi. eichor.
vel acetos. m. S. Col. add. sacch. unc. i. M.

Serum lactis antiscorbuticum. R. herb. rec. nasturt.
aquat. cochlear. an. mij. rad. raph. rust. unc. i. contus. &
conquas. in mortar. marmor. affund. lib. ij. vel iij. ser.
lact. depur. stent in loco tepido per noctem vase clauso. Col.
add. aq. cinam. unc. S. M.

Aliud. R. herb. rec. cochl. mi. rad. Elen. armorac.
an. unc. i. bacc. juniper. dr. iij. passul. min. unc. i. contus.
affund. ser. lact. cap. lib. ij. vel iij. Col. dulcor. pauco sacch.
vel syr. de succ. cit. vel scelotyrb. forest. dos. unc. iv.

Serum lactis destillatum antiscorbuticum. R. herb.
rec. betabung. miiij. cochl. nasturt. an. mij. acetos. eichor.
a. n. j. Pom. cit. N. 3. vel 4. incid. & pist. in mortar.
marmor. affund. ser. lact. q. S. destill.

Serum lact. Tamarind. Fontec. item aliud alterat. herbis
pro cura vernali vid. superius de remediis post V. S. præ-
scribendis.

Lac caprinum antiscorbuticum. R. lact. caprin.
unc. viiij. lib. i. Ebull. in eo fol. cochlear. nasturt. be-
tabung. Endiv. cich. ā. pij. Col. ad sacch. puriss. parum,
ne coaguletur.

Lac anti-dysentericum. R. lact. rec. lib. i. sem plan-
tag. dr. i. rad. torment. vel symph. dr. S. contus. coq. &
Col. densus subinde 2. vel 3. cochl. alii addunt terr. sigill.
ser. i.

Lac in Mictu cruento. R. lact. ovill. rec. mulet. lib. S. mell. ros purij. dr. ij. bull. eniter add. Bol. arm. scr. i. eximium est in hoc affectu ex observat. foresti.

Lac cancerinum in Phrysi incipiente proficuum R. cancer. viv. N. ij contus. in mortar. affund. lact. vaccin. lib. i. S. eog. hinc atque col. vel R. lact. vaccin. lib. i. S. cancr. elix. N. ij contund. una cum chel. & test. f. Col. vel per pannum in delicatis, & ubi mizuit agendum, vel Colatorium ferreum durch ein Seidgaze / ut pulvis precipitans simul transeat, si efficacius agendum, liter minus gratum sit.

Lac artefactum, si forte lac naturale vel serum lactis contraindicaretur. R. Sem. melon. mund. unc. i. sem. cucurb. angur. à unc. S. jur. pñll. anc. vj. M. F. Emuls. adde si placet, syr. viol. unc. i.

Aliud antihecticum. R. Chin. sel. unc. i. rasur. ebor. dr. ii. repleatur his pullus bene saginat. coque in lib. vi. aq. addebitam cocturam lento igne. De Col. R. unc. vi. sem. melon. rec. amygd. d. ex cort. à unc. S. nucl. pin. rec. dr. ii. M. F. emuls. aromatizanda modico mac. Alij accipiunt decoct. carnis Gallin. Das Hennenbrat. Wasser / & cum colaciunt prædictam emulsionem.

§. II.

De Officio Medici in ordinanda cura chalybis.

I.

Chalybs, quæ aliud nihil est, quam ferrum artificia- liter magis depuratum, & induratum duplicem juxta veteres obtinet virtutem aperitivam unam, adstringentem alteram. Illam adscribunt particulis volatilibus, hinc non exiguum præstat usum in morbis ab obstructione oriundis: hanc terrestribus atque fixis, hinc crocum martis adstringentem paraturi chalybem eousque

etousque calcinant, usque dum absumptis partibus volatilibus remaneant fixiores, eoque utuntur in diarrhæa, dysenteria, aliisque fluxibus sanguinis p. n. R. R. considerantes matris corpus homogeneum, quod sub æquali tenore in ignis tortura perseverat, & quod mare semper adstringat, ac omnia etiam ex matre parata gustui saporem adstringentem subministrant: fundamenta tulerunt, cum per se semper adstringere, aperire verò tantum per accidens, quatenus nimirum intra corpus assumptus reperta in corpore salia sylvestria acida & facile coagulabilia, à quibus induci solent obstructions, absorbet, absorbtæque secum per alvum educit, ut adeo hoc modo sublata causâ tollantur obstructions.

II.

EX dictis facile elucescit, matrem. 1. optimam esse Melancholiæ digestivum. Cum enim materialis ejus causa modernis statuatur acidum vitiosum in primis viis hærens, illud ad matrem assumptum accurrit, eumque corrodingo sua ammittit spicula ac acrimoniam, & postmodum simul cum marte per secessum eliminatur, hinc post ejus assumptionem fæces ut plurimum nigro colore tinguntur præcipitato per bilem in arte cum absorptis acidis in colorem sub nigrum. Non male igitur 2. *accut. Lusi.* Melancholiæ, & mali hypochondriaci verum alexipharmacum, ac Rhizotomus appellatur, quod idem dicendum de affectu hysterico. 2. Insignis panacea est cachexiarum tam virorum, quam etiam mulierum, & Virginum in Chlorosi, fluore albo, suppressione mensium, quæ si inveterata, citra martialia vix curari potest, in Cachexia Ictérica &c. Hinc etiam omnes pulveres Cachecticos mars ingreditur. Non enim tantum, dum humor acidus, ac veluti causticus chalybeata aggreditur, & in substantiam eorum operatur, ferociam & acrimoniam suam proprio veluti ense jugulat, infringit, ac recundit, sed insuper

sublato coagulo massæ sanguineæ jam effatæ, & quasi languescenti quasi calcar suggeritur, spiritus quasi sopiti, & penè mortui, ac pondere pressi rursus eriguntur, excitantur, ac restaurantur, quod vel maxime in puellis cachecticis observatur, dum assumpto chalybe pulsum nanciscuntur celeriores, validiores, faciemque magis rubicundam, & vividam.

III.

PRO legitima ejus administratione Medicus notabit.

1. Curam chalybis commodissime administrari Vere & autumno.
2. Ejus præparationem, quo simpliciores, eo meliores esse.
3. Haud immerito daminari, & explodi ejus præparationes nimis acidis factas, cum mars acido saturatus nullas amplius in corpore exserat virtutes, sed potius ventriculum oneret utpote calx fixissima nullo liquore solubilis.
4. Cæteris præparationibus palmam præferre, quæ sit cum alcalinis, aut blandis acidulis.
5. Etiam limaturam Martis crudam intus exhibitam fructu suo non destituti, dummodo ventriculus non adsit admodum debilis, vel dosi majori exhibeatur. In his enim periculum est, ne mars in ventriculi fundo subsistens vim ibi vitriolicam & vomitivam aquirat, aut ructus, nausæamque cieat, vel appetitum dejiciat, hinc etiam refert *Panarol.* se post mortem eorum, qui usi fuerint Martialibus, in ventriculo limaturam Martis adhuc crudam reperisse ob ventriculi debilitatem.

IV.

PRÆTEREA 6. notabit Medicus, corpus prius ad hanc curam per universalia disponendum esse.

7. Martialia exhiberi, vel in forma siccâ ut v. g. pulv. Elect. pilul. &c. vel in humida ut vini, tinctur. essent &c. in forma liquida ceteris præferuntur ex eo, quod in ijs mars magis solutus: In illis autem magis compactus

majo-



maiores in ventriculo pariat molestias, nonnulli hæc ita distinguunt, ut in complexionibus humidioribus eum exhibeant magis in forma sicca: In siccioribus, vero, & quorum stomachus sensibilior in forma humida. 8. Post ejus assumptionem manè jejuno stomacho facta deambulatione per unam vel duas horas corpus exercendum esse capièdo postmodum Brodium carnis vel Gallinæ alteratum rad. petrosel. vel rad. aperit. & passul. 9. Signum chalybis ritè operantis, esse fæces nigras per alvum excretas: e contra malum; si post assumpta Martialia non tingantur colore nigro, cum signum sit, martem non absorbisse salia vitiosa corpori noxam minitantiæ. Item si superveniant vomitus, nausea, inappetentia, dolores stomachi &c.

V.

Item 10. observabit in hac cura, tertio vel quarto die clysterem injiciendum, vel lenitivum exhibendum, aut pilulas alöeticas. Aliqui quarto die hora quarta pomeridiana magnitudinem castaneæ exhibent de Elect. parato ex rob. sambuc. vel ebul. aut pulp. tamarind. unc. iij. cum Diagrid. rosat. scr. ij. aliqui & præsertim *Sydenham*, præcipue in affectu Hysterico martialia exhibent sine interjecta purgatione, ne una die destruat, quod per plures ope chalybis refarcitum. ij. curam hanc nunc. 15. nunc 20. nunc etiam 30. diebus & ultra continuandam esse pro majori, vel minori contumacia affectûs. 12. Durante hac cura legitimam esse instituendam Dietam, & præcipue omnia acida, seu in cibo, seu in potu vitanda esse, quia martem saturant, ut postmodum saturatus vitiosa salia relinquat intacta.



§. III.

S. III.

*De Officio Medici in praescribendis Formulis
remediorum chalybeatorum.*

Vinum chalybeatum. R. Croc. mart. aperit. unci
ij spec. atomat. charyoph. dr. ij. dentur ad sacculu
ex sind. alb. S. Stachlsackel daran 2. Mas. als
ten weissen Wein daran zu gießen vnd 2. Täg stehen
lassen / alsdann 3. oder 4. Unge darvon nütcheern
zutrincken.

Aliud. R. Chalyb. prap. unc. i. charyoph. dr. i. mac.
dr. S. ind. saccul. oblong. instar. digit. affund. Vin. mens.
ij &c. Quantum de hoc bibitur, tantum semper reaf-
fundatur.

Aliud ex spuma chalybis. R. Spum. chalyb. dr. i.
Vin. alb. unc. ij M. & sic pro reliquis dosibus.

Vinum chalybeat Riverii. R. Chalyb. cum sulph. prap.
unc. i. rad. ennul. cort. med. tamarisc. a. unc. S. fol. senn.
S. unc. ij Epithym. unc. i. facul. bryon. cinam. an dr. ij spec.
diatrion fant dr. i. aq. dest. agrim. Vin. alb. an. lib. i. inf.
per trid. in B. M. de col. sumantur. unc. ij vel. iv.

Vinum chalybeatum attenuans & deobstruens. R.
rad. levis. unc. S. Rhab. el. unc. i. chalyb. cum acet. tamar.
ind. prap. unc. i. sal. tart. dr. ij. ment. crisp. m. S. cort. fl. &
arant. dr. ij galang. min. dr. i. incis. & contus. indan-
tur in Vas vitreum affundendo Vin. maluat. lib. ij. dig-
gerantur loco calido movendo aliquoties per biduum. Faltē
dein remotione a loco calido, ne acescat bibendo quotiatē
unc. ij.

Claretum Martiale Minsicht. probatissimum. R.
Vin. malv. opt. lib. ij. chalyb. cum acet. tamar ind. prap. unc.
i. rad. scorz. acid. tart. an unc. S. galang. min. cass. lig.
charyoph. an dr. i. M. indit. in Vas vitreum diger. loco ca-
lido movendo aliquoties per biduum. Dein Coh per manic.
Hoppoc.

Aliud

Aliud Vinum Martiale anti cachecticum. *R.* *Herb.*
safo. roris. an. M. S. absinth. mis. fl. cent. ruin. p. so. Rhab.
el. unc. i. S. cinam. gulang. 2. 2. an. dr. ij limat. mart. reca.
unc. 2. S. incis. dentur ad nodul. cui super affund. Vin. alb.
lib. iij.

Syropus chalybeat. *R.* *Chalyb. prap. unc. iij affund.*
acet. Vin. ad eminent. 4. digit. transvers. stent in loco can.
lid. donec ex trabatur tinctura, tum inclinato vase sepa.
retur liquor, cui add. sacch. albiss. q. S. coq. lento igne ad
consist. Syrup. S. Etachel Gasse / darvon ein Löffel vol
in einer Brühe oder weissen Wein zunehmen.

Essentia Martis Hartman. *R.* *limat. mart. candefact.*
lib. S. extingue semel. atque iterum in lib. so. Vin. mart.
dos. ab. unc. S. ad unc. ij. ex lusc. vel haussu aq. cichor.

Tinctura Mart. *R.* *Tinct. Mart. 26. vel 30. vel Vitriol*
Mart. Ludovic. vel cum succ. cit. parat. sorbath. &c.
unc. S. detur ad Vit. S. Etachel Tinctur / darvon von
15. bis gegen 30. Tropfen auf einer Brühe zuneh-
men.

Bolus chalybear. *R.* *chalyb. prap. dr. i. charyoph.*
gr. 5. et cum Vin. S. q. F. M. F. Bol. qui nebulis involutus des
voretur super bibendo 3. vel 4. cochl. Vin. absinthit vel mal-
gat. & sic pro ceteris dosibus.

Electuarium Chalybeat. *R.* *limat. chalyb. prap.*
unc. i. S. conferv. fumar. unc. iiii. S. condit. cort. cit. unc.
vi. confect. alkerm. unc. S. syr. decort. cit. q. S. Vers
mische Etachel. Latwergen darvon einer Kysten groß
darvon zunehmen und ein wenig Wein oder Malwa-
sier darauff zu trincken.

Aliud. *R.* *Limat. mart. acet. prap. unc. vi. cinam.*
nuc. mosh. an. dr. iij Rhab. dr. ii. spec. arom. ros. dr. iii.
mell. opt. sacch. alb. an. unc. xiii. cum lento igne F. Elect.
dos. unc. 8. & horis anteprandium superbibendo unum vel
2. cochl. Vin. Mal. vel absinth.

Morselli chalybeat. *R.* *chalyb. prap. unc. i. cass. lig.*
ser. 16. croc. ser. 8. mac. ser. ij charyoph. scr. i. sacch. fin. in
aq. cinam. dissol. unc. iij. F. morsul. N. viij. capiat. M.
unum.

Tabellæ chalybeat. R. Chalyb. cum sulph. præp. vel pulv. cachect. quercet. unc. S. confect. alk. dr. ii. amb. grif. scr. i. sacch. fin. in aq. ros. & namph. dissol. unc. i. v. f. tabell. capiat dr. ii. quotidie mane.

Pilulæ Chalybeatæ Sydenhamb. R. limat. mart. subtiliss. gr. viii. cum S. q. extract. absinth. M. f. pilul. No. viii. sumantur summo mane, repetanturq; hora quinta pomeridiana per dies 30. superbibendo haustum vin. absinthii. vel malvat.

Utiles quam maxime in affectu hysterico, chlorosi, ac omnibus morbis chronicis ex acido oriundis.

Aliz in morbis Chronicis usuales. R. limat. mart. subtiliss. gr. xv. Rhab. pulv. scr. i. cum succ. absinth. S. q. M. f. pil. No. xv. vel xxi. superbibendo brodium amarum & diureticum.

Aliz chalybeatæ Riverij. R. chalyb. cum sulph. præp. unc. S. aloes opt. senn. S. agar. troch. Rhab. el. an dr. i. spec. diarrhod. alb dr. S. troc. scr. S. cum syr. ros. sol. f. mass. pilul. de cuius dr. i. form. pilul. No. xxiii. deaur. quas capiat ager m. singulis diebus, 3. horis ante pastum continuando per 15. dies.

Pulvis chalybeatus anticachecticus. R. Pulv. cachect. quercet. dr. S. S. Stachel-Pulver fünfzeben Tag lang Morgens nüchter auß einer Brähe zunehmen.

Alius. R. chalyb. præp. dr. vi. sal. absinth. tamarrise. Card. b. an scr. i. facul. aron. dr. i. ocul. canc. præp. scr. iv. chryst. tart. unc. S. pulv. charyoph. scr. iv. M. f. pulv. datur cum pondere plumbeo unius dr. sumatur omni mane dr. i. ex brod.

Alius. R. Chalyb præp unc. i. S. cass. lig. opt facul. aron. chryst. tart an dr. ii. ol. charyoph. gut. xx. cinam gut. vii. sacch. rosat. tabul. dr. vi. M. dos. dr. i. m. ex Infusula.

Alius simplex in suppressis mensibus utilis. R. Mart. cum sulph. præp. dr. vii. cass. lig. dr. i. M. f. pulv. divid.

divid. in xvi. p. 29. de his una quotridie sumatur ob-
ambulando desuper per 1. vel 2. horas, & tertio quo-
libet die 4. horis a pastu magnitudinem castaneæ de
Elect. laxat. sumendo. Cura hæc teste Sorbaith intra
16. dies plerumque hunc tollit affectum.

§. VI.

De Officio Medici in suadendo usu, Theæ, Caphee & Chocolatæ.

1.

THeæ folium fruticis cujusdam, quem plures in-
 ter species *sumach.* referunt, in China & Jappo-
 nia nascens, atque inde siccando involutum, &
 conglomeratum in Europam delatum, quo ad quali-
 tates primas calidum est in primo gradu, & siccum
 ferè in secundo duplicem possidet substantiam, quarum
 una volatilis, & spiritiosa odore suo suavi, & jucun-
 do aquæ communicatur; altera verò fixa & terrestris
 sapore suo amaro, & nonnihil adstringente se prodit
 commendatur hæc herba. 1. ad somnum pellendum &
 cana præsertim assumptum, quod præstat, tum quia
 calor actualis, quo potatur, spiritus agitat, tum quia
 spiritiosa volatili, & odorifera parte spiritus dissipat-
 os reparat: amara verò & diuretica alimentorum hu-
 miditatem somno necessariam absorbet, & per urinam
 pellit, tum quia superius orificium constringendo va-
 pores ad somnum necessarios frænât, & impedit. Ob
 easdem causas prodest etiam in vertigine, affectibus
 soporosis, catarrhis. 2. Medetur doloribus
 capitis impediendo cruditates ac Vapores discutien-
 do. 3. Solvit ebrietatem, corpusque nimis Baccho
 pessum datum integritati suæ restituit. 4. Moderatè
 siccât, cerebrum purgat, memoriam firmat, mentem
 purificat, ac alacriorem reddit. 5. Stomacho, digges-
 tionique

tionique Iuvandæ inseruit aciditatem nimiam corrigendo, ac stipticitate fibras constringendo. 6. In Nephritide calculo & arthritide cæteris paribus præservat, cum experientia testetur, chinenſes hujus potui indulgentes hiſce affectibus non eſſe obnoxios. 7. Alii etiam commendant ad lumbricos, vapores hypochondriacos & hyſtericos, phryſim quoque, ſi lactis Vaccinicalici, quod leviter prius ebullit aquæ duos cyathos, in quibus dr. 1. Theæ infuſa admilcueris cum ſacchar. unc. 5. & calidè per meſes. 2. propinaveris.


II.

Modus utendi Theæ in hoc conſiſtit, ut accipiatur cyathus aquâ plenus, qui immittitur in vas peculiare adhuc uſum deſtinatum, quod igni apponitur, & dum aqua efferveſcit, ab eodem removeretur, & dr. 5. *ſol. dr. i. fol. Theæ* iniicitur, hinc vas tegitur, ac folio fundum perente in vaſculum porcellanum vel faventinum effuſum calidè ſorbillatur addito ſi placet paucò ſacchar. Quod in fundo remanſit folium, etiam ſecundæ vice adhiberi non ineptum eſt, ſed tum cum aqua coquatur neceſſe eſt. Japponenſes pulverem foliorum aquæ ferventi iniectum ſimul hauriunt. In Perſia partim anis. Fænic. vel charyoph. iniiciunt. Sumi poteſt manè, vel in affectibus ſtomachi ac capitis per conſenſum Ventriculi ſtatim à prandio vel quacunque hora, ac pro ſomno impediendo, à cæna.

III.

Sicuti autem uſus hujus herbæ Theæ ſubinde maximè proſicuius, ita ejus abuſus, ac frequentior compoſitio improbatuſ præſertim inſubjectis calidioribus & ſiccioribus, dum humidum nativum cito nimis abſumit, caloremque ac vitam inſtar flammæ lampadis oleo conſumpto extinguitur, ut adeo extrema non ſolùm in morali Philoſophiâ, ſed & in Medicinâ vitioſa ſint. Cæterum plures hiſ temporibus proprietates Theæ adſcriptas inveniunt quoque ſimplicibus ſub noſtro cælo creſcentibus,

quæ



quæ substitui haud immerito possunt, si eodem modo præparata sumantur. Sic in affectibus capitis uti possumus *Rosemarino*, *betonica*. In affectibus pectoris *salvia*, *Veronica*, *pulmonaria*. In affectibus renum *Veronica*, *gran. luniper*. In arthriticis *chamedris* &c.

IV.

Capheè, caffè, *Capheè* est leguminis peregrini species magnitudinis nostratium fabarum, a quibus non admodum abluat orta ex arbore *Evonymo* vel *ceraio* simili ex Arabia felici in Europam delata, quæ debito modo pulverisatur ac torretur ut phlegma Spiritus ejus irretiens exhalet, usque dum semiusta & colore castaneo vel subnigro tincta appareat, ac panis veluti adusti odorem referat. Coctio ejus paratur, dum accipitur olla ansata stanno obducta, illique infunduntur *aq. unc. x. vel lib. i.* quibus, cum super igniculo carbonario efferbuerint, injiciuntur pulv. dr. iij. sedulo cavendo, ne quidquam effundatur, cum pulvere aquæ immisso illico celeriter in spumam agatur, unde, quamprimùm aqua ollæ labia attingit, igne amovenda rursumque admovenda, usque dum duodecies circiter ebullierit hinc cineribus calidis imponenda, donec magma fundum petierit & decoctio flava & limpida super sit, tunc calici Porcellanio vel faentino infusa calidè sorbillatur addito si placet pro delicatis paucis sacch.

V.

Qualitates primas quod attinet, capheè calidum & siccum statuitur. prius deducitur ex amaritie & acuto sapore: Posterius ex tostione, reliquæ exinde emergentes qualitates, cum sulphure & sale volatili scateat, sunt roborare stomachum, detergere, obstructions reserare, Urinam movere, vapores in cerebrum ascendentes recondere, somnum avertere &c. Affectus quod attinet, convenit illud i. in adjuvanda coctione stomachi, ubi Vinum locum non habet ut v. gr. in abstemiis, cephalalgia decenteris, laborantibus stomacho ex prægressa ebrie,

ebrietate, idque præstat rum volatili ac subtili sua substantia nimiam fermenti stomachici aciditatem obtundendo ac terrestri adstringendo & humiditates exsiccando, tumaleali suo acidas cruditates absumendo & corruptioni resistendo. 2. In necandis lumbricis. 3. In reserandis obstructionibus, in Chlorosi, suppressione mensium. 4. In præservando Hydrope, calculo, Podagra. 5. In febribus intermittentibus diuturnis. 6. In cephalalgia per consensum stomachi. 7. In somno arcendo poros cerebri apertos tenendo, liberumque spiritibus transitum sternendo. 8. Cum lacte decoct. vel cum aqua decoct. & cum æquali vel majori parte lactis mixtum aut ante vel post lac assumptum prodest in Phytis.

VI.

DE hoc decocto Capheè sumitur manè unus vel alter crater. Qui ad stomachi invaletudinem eo utuntur, sumunt immediatè post prandium additis *caryoph. conzuz* vel *cinam.* vel *cardam.* vel *sacch. ambrat.* Sicuti autem in prædictis affectibus suo modo locum habet, atque indicatur usus Capheè, ita minus idoneus ac contra indicatur in nimium macilentis, biliosis, stomachi nimium calidis, eisque, quibus vasa sanguine subtili, rapidiusque circulante sunt repleta. Item quibus tussis, & sputum frequens ab acriori sanguine oriundum, uti & Phyticis consummatis.

VII.

CHocolata seu Succolata est species solidæ Pastæ Americanis frequens, & forma Pastillorum vel tabellarum ad nos delata ac ex variis ingredientibus, quorum præcipuum est *Cacao* quæ est fructus cujusdam arboris ac species quædam amygdalarum composita. Ex hoc fructu exprimitur succus, inspisatur, additurque *cinam.* *piper mexican.* *charyophill.* *Vanilla.* *achiosa* & *sacch*

sacch, alii etiam addunt *aq. namph. amb. mosch.* alii alia addunt, ut adeo inter authores pro locorum usu vel præcujusque sapore aliqua discrepantia in ejus compositione observetur. Ut bona sit, ne mucidum oleat, nec Vermiculis crosa sit, nec masticando quid displicens, aut nimis aromaticum sapiat. Modus ejus bibendi vulgarissimus est, dum aqua bulliens infunditur Crateri, quem ebibere cupis ad medietatem: inde chocolatz Tabella una aut altera dissolvitur donec, inspissata satis appareat, mox probè ligno denticulato agitur & in spumam vertitur: tandem reliqua Crateris medietas aqua calida cum saccharo repletur, ac calidissime sorbillatur. Aliqui dissolvunt eam in aqua frigida, ligno denticulato agitant, spumam elevatam in alio reponunt vase, reliquum cum s. q. sacch. igni apponunt, & ubi adhuc calidum est, spumæ prius separatæ affundunt totumque epotant. Aliqui citò eam parantes aquam calefaciunt, eiderasam chocolatz Tabellam admiscens, dissolvunt, ligno agitant & necdum separata spuma hauriunt. Sunt qui anteejus haustum aq. frigida hæustum sumunt, aut biscostorum par intingunt. Alii eam glacie refrigeratam potant, quæ palato potius quàm valetudini conveniens est. Si sanitatis gratia bibatur, sufficit ad 2. vices quotidie ad summum & potius horis matutinis eam sumere. Diebus canicularibus eadem abstinere melius est.

VIII.

Qualitates ejus quod attinet, temperata est, si præcipue piper & Charyophilli eximantur, prout nonnulli faciunt frigidis cacao Particulis ab ingredientibus calidis temperatis. Bibitur à plurimis potius ex consuetudine & deliciis, quàm morbi curandi aut præcavendi gratia, Interim utilis est stomacho debili, ex hausto & statulento. Vtilis iter facientibus & quidem tam manè, antequam itineri se committunt, & vespere

absoluto Diei penso. Item prædicatoribus seu ante seu post sermonem. Ante eum enim pectoris & vocis vires diutius quàm Iusculum sustinet, post verò exhaustas corporis vires reparat. Vtilis etiam ob vim ejus unctuosam ac nutritiam Fæctis & atrophiciâ laborantibus, præterea semen auget, ac in scorbuto acidum salsum temperat inprimis si cum lacte sumatur. Abstineant ab ejus usu Iuvenulæ chlorosi laborantes, aliique omnes obstructionibus detenti ac chylo corrupto, & crudis indigestisque humoribus in stomacho stabulantibus præditi, tollendus etiam abusus, ac nimia ejus Potatio, cum pingues ac butyrosæ ejus partes, quibus abundat non ritè ubique per corpus distribuuntur, & necessario in venarum angustiis hæreant ac obstructions & infarctus generent.

S. V.

De Officio Medici in præscribendo Laudano Opiato.

I.

L*Audanum Opiatum* sic dictum, quasi Laudatum ex Opio Medicamentum. Paratur enim ex Opio, qui est succus expressus & condensatus vel capitum papaveris eujundam Peregrini præsertim Thebaici thyrſis seu scapis vulneratis, vel ex tota planta, & hoc à nonnullis dicitur *Meconium*. Præparationes fere tot sunt, quot auctores. Optima ejus correctio consistit in eiſdem depuratione, in leni sulphuris færidi, inflammabilis, immaturi evaporatione, ac virtutis extractione per menstrua, qualia nonnulli accipiunt *salina lixiſa* ut v. g. alchæst vel tinct. rart. alii *sulphurea* ut spirit. vin, quia opium abundat sulphure, quia vappidas & halituosas opii particulas naturæ amicas reddit, neque vires ejus obtundit, alii *aquea* ut v. g. aq. destillat. vel destill. ros. maiat. quia

quia opium non privant virtute salina ut acida, nec illam secum auferunt, ut spirit. vin. alii tandem *salina acida* adhibent ut v. g. acet. destillat. suc. cydon. &c. tum quia acidum eius correctivum & venenis adversatur, tum quia acrimoniam & caliditatem eius corrigit, tum quia sal volatile ab acidis fixatur, ac acida etiam stomachum roborant. Nobis hic in usu est Augustanum, & quod priori multo præstantius, minusque caput turbat, laudanum cydoniarum Helmont.

II.

Qualitates eius quod attinet, statuunt aliqui illud esse frigidum, quia effectus producit frigidos ut stuporem, somnum profundum, quia corrigitur calidis, & propinantur calidissima, sipericulum ab assumpto opio imminet. Alii calidum pronuntiant, quia frigidity in tam modica quantitate nocere non posset, quia odore grave, sapore amarum, quia inflammabile sudorem etiam excitat, pruritum & sitim causatur. Alii vim eius Narcoticam occultæ adscribunt qualitati. Alii in eodem partes heterogeneas agnoscunt calidis tamen prædominantibus, alii juxta principia eius chymica (cùm constet sulphure copioso vaporoso cum sale volatili præsentibus etiam partibus aqueis & terreis una cum salinis fixis in capite mortuo residuis) vim agendi adscribunt effluviis vaporolis, quæ porulos cerebri apertos & dilatatos obstruunt, spirituum animalium effrænem influxum impediunt, eisdem volatili sulphurea visciditate figunt, ad invicem agglomerant, ligant, sopiunt & quasi torpidos reddunt.


III.

Usus Generalis laudani opii est, ut sit veluti Panacea omnium dolorum, fluxionum, evacuationum nimiarum & vigiliarum. Specialem quod attinet, convenit. 1. *In febribus intermittibus* præmissis emeticis, & purgantibus mixtum pulveribus antifebrilibus. 2. *In*

continuis malignis cautè cum iis mercandum, nisi inmixtis alexipharmacis in minori dosi & inprimis vel in augmento morbi tum quia spiritus, ne tam citò resolvantur quasi coercent, tum quia graviora mitigat symptomota vel præcipuè in declinatione, si jungantur dolores intensi, vel excretionès humorum quæcunque impetuosæ ac in specie cattarhi, tusses, vomitus, diarrhææ, Instante crisi vel die Critico non temerè dandum, ne natura in conatu suo impediatur. In *varriolis* & *merbillis* dandum mixtis expulsiuis tum pro sistendo alvi fluxu & præcavendis nervosi generis symptomatibus tum pro mitigandis urgentioribus symptomatibus & promovenda excretionè cutanea, cum etiã sudorem moveat, hinc theriaca & Midrithatium dempto opio nullum vel parcum excitant sudorem. Videtur autem excitare sudorem vel quod natura refocillata excretionem per sudorem molietur, vel quod somnus fluxiones omnes sistat excepto sudore, vel quod sulphur ejus tenuius a sale volatili propulsum per cutim expiret.

IV.

Quod ad affectus capitis prodest *Laudanum opiatum* in *Cephalalgia* & *hemisrania* mixtum præcipuè cum specifico cephalico, in *vertigine* per consensum figendo humores ac subtiles spiritus, in *mania* sanguinis fervorem, ejusque inordinatum motum spirituumque effrænem imperum sistendo, somnũque, à cuius defectu delirium augetur, procurando. *Epilepticis* mixtum quoque prodest acrimoniam humorum vellicantium sistendo vel eos in centro ligando & partem roborando maxime in infantibus ac adultis, ubi simul tormina & partium membranarum vellicationes adsunt. Videndum tamen, ut cautè procedatur ne si natura ad exteriora contendat expellere causam morbificam hæc motu inhibito circa cor restitet, & suffocationem excite



citet, *Cattarrhos* tenues & acres ad miraculum usque sistit, eosque ad pepasum deducit.

V.

Quo ad affectus *Pectoris* optimè prodest laud. opiat in *tussi* exorta à materia tenui & acri, si thorax non est infarctus à materiæ copia. Sunt qui nullam tussim sine opiatis feliciter tolli posse putant unde, licet minus convenient, ubi viscosi crassi & glutinosi humores in Bronchiis pulmonum continentur, tamen & in hoc casu convenire possunt dosi refracta & secundaria cum incidentibus maritata, vel interposita, cum archæum sopiant, naturam roborent, tussim sedent, ac materiam concoquant. Prodest quoque in *Asthmate hypochondriaco*; non verò in *Asthmate hydropicorum*, vel ubi stagnans ichor spiritualibus partibus jam intentat periculum. In *pleuritidis* initio specificis volatilibus misceri potest parcius, sicuti in declinatione fixioribus. Expectoratio enim sic melius succedit, vires confortantur & ipse morbus longè felicius ad finem decurrit. In *Phthysi* optimum est, si oriatur ex defluxu humorum acrium & salforum ad pectus vel a sputo sanguinis: non verò, si ab ulcere pulmonum, cum sic sputum sistat & ægros suffocet maximè, si dosi ordinaria exhibeatur, dosi enim refractâ commodè etiam hic in usum vocari & cum aliis misceri potest.

VI.

In affectibus *Cordis* à resolutione spirituum oriundis co-dialibus parcissimè admixtum maximè prodest sic quoque in *palpitatione cordis*, *lipothymia* aliisque symptomatibus *hystericis* & *hypochondriacis* nihil præsentius laudamus opiato solventibus & præcipitantibus mixto, sic additum pulv. absorb. Vvedel. plurima in his affectibus eodem teste præstitit. Quoad affectus *Ventriculi* utilissimum est in *Cholera*, dum modo non intempestivè

pestivè exhibeatur cohibendo causam morbigicarnā.
 Solatur etiam *Cardialgia* mixtum carminativis vel
 præcipitantibus. In *singultu* quoque prodest mixtum
 castorearis. In *Vomitu* quoque seu ab hypercatharsi seu
 ab aliis causis excitato mixtum cum *Theriac. & confect.*
alk. vel datum in pilul. cum *ol. ment.* vel *cinam.* in *appeti-*
tum nimio valet datum cum absorbentibus. In *hypochon-*
driacorum & scorbuticorum quibusdam affectionibus in-
 quit *Vallis.* se malle quovis medicamentorum genere,
 quam opiatorū usu destitui, non enim solummodo con-
 tra dolores & vigilias pertinaces verū in Paroxysmis ,
 Asthmaticis, in vomitu, diarrhæa, quin etiam in ver-
 tigine & Pathematibus convulsivis nullum præstantius
 expertus est remedium.

VII.

QUoad symptomata *Intestinorum* prodest in *doloribus*
Colicis modo non adsit humorum in intestinis infar-
 ctus, cui prius medendum, tam per se exhibitum præ-
 fertim in colica biliola quā cum purgantibus dosi re-
 fracta mixtum. In *Ileo* est sacra anchora & extremum
 solatium vel mixtum cum purgantibus, ut una fidelia
 & dolor & materia mortifica tollatur vel quod magis in
 praxi & usu primò doloribus succurrendum per opia-
 tum, hinc purgante alvinæ fæces exstimulandæ. In
Diarrhæis, statim sapè fluxum sedat magna cum ipsius
 ægri & adstantium admiratione. In *Dysenteria* licet
 opiata quibusdam malè audiant, & narcotica necroti-
 ca dicantur, tamen sine iis vix vera dysentericæ curatio
 fieri potest, neque enim tam fluxum sistit opium, quā
 cum moderatur & corrigit dolores minuendo, mor-
 bumque in centro detinendo. Datur optimè marita-
 tum cum bezoarticis præsertim in Epidemica. Si dolor
 & fluxus urgeat, majori dosi opus est. In *Dysenteriiis*
 indolentibus & ex inflammatione intestinorum ortis
 cautius eodem utendum. Prodest etiam in *Hæmmor-*
roidibus immodicis & dolentibus.

VIII.

VII.

QUO ad affectus *renum & articularum* prodest quoque in *calculo* dextrè adhibitum, idest, si dolor & vigiliæ urgeant additum temperatioribus, lithontripticis & nervinis v. g. *ocul. canc. succin. Cinab &c.* præsertim si calculus nondum renibus fuerit egressus, vel saltem leviter inde morus: immo dum iam hæret in urteribus, dato laudano non in totum sopitur expultrix facultas, ut nihil ampliùs agat, sed dolores sopiuntur, ut facultas expultrix roborata eo valentiùs insurgere possit, in *Podagra*, si diri ac diuturni dolores ac vigiliæ infestent ut causæ vestem induant, & urgendo ad securationem trahant, ad laudanum ceu asylum confugiendum, alias cautè procedendum cum malum contumacius reddere, motumque naturæ impedire posset, maximè prodest in arthritide vaga scorbutica p. p. Exteriùs quoque in articulari morbo prodest mixtum cum *spirit. formic. lumbric. & sal. arnon.* Cavendo tamen, ne opiatibus humor peccans in tophaceam duritiem transeat.

IX.

IN affectibus *hystericis, hysteralgia, mensibus immodicis, fluore albo* divinum est auxilium seu mixtum castoreo seu aliis appropriatis vel absorbentibus. Cum ambratis maritatum *aphrodisiacum* evadit non contemnendum. An in amputatione crurum *spacelatorum* narcotica sint adhibenda dubitatur, aliis id negantibus cum levia non juvent, & valida sint periculosa: aliis affirmantibus, ut sanguinis fervor, motus ac inflammatio inhibeantur. Alii circumstantias omnes benè attendendas esse jubent, neque obstare arbitrantur quominùs præcedente operationem nocte opiarum moderatâ dosi propinari possit, cum æger hinc animo sit alacriori & multa præcaveantur symptomata. Par ratio est in sectione calculi.

X.

Quo ad *usum externum* variis dolorum generibus auxiliatur opium. Sic in doloribus capitis, mania, Phrenitide, vigiliis unguentis additur Illinendis temporibus & naribus, vel Epithematibus. Ad Podagram opium cum lacte muliebri dilutum commendatur. Agit autem extrinsecus non stuporem partis excitando prout credebant veteres, sed quatenus per poros subtilior pars sulphurea & mercurialis sanguini communicatur & hinc vires suas ordinarias, licet remissiori longè gradu & refractè exserat. Sistit etiam extrinsecus hæmorrhagiam à vulnere, narium, ab evulso dentē oriundam. Item prodest in dolore dentium pilulā ejus denti excavato indita. In clysteribus id etiam nonnulli addunt, si extremi urgeant dolores sed non in magna dosi v. g. Philon. Rom. vel theriac. rec. ad dr. i. vel laud. opiat. gr. v. vel vii. sed cautè, cum usus internus longè tutior sit. Suppositoriis additum prodest exulcerationi infestorum, quod tamen ultra quadrantem horæ non detinendum.

XI.

Pro debito Regimine ac legitimo hujus usu sequentes Medico observandæ sunt cautelæ. 1. Laudanum opiatum exhiberi posse forma *solida, media & liquida*, in forma solida vel in electuar. cum confect. alk. vel in Pilulis cum aliquo extract. vel in trochisc. vel in pulv. cum sacch. cand. vel magist. mat. perlar. immo omnibus pulveribus misceri potest. Sic mixtum cum cc. phil. præp & cinnab. nat. laudatum est medicamentum in arthritide vaga, sic quoque misceri potest cum pulv. cephalico, bezoart. Adstringente &c. Potest etiam talis pulvis miseri emulsionibus. In forma liquida exhibetur sub titulo tincturæ anodynæ, essent. aut tinct. opii, potest etiam laud. opiat dissolvi in syrup. aq. destill.

still. emuls. vino, brod, aliisque liquidis. 2. Dosis laud. opiat. vel esse *ordinariam* vel *extraordinariam*. Ordinaria est *infima*; *media* & *summa*. Infima in adultis est gr. dimid. vel 1. *Media* gr. ij. vel iij. *summa* gr. iv. v. quæ tamen non faciliè exhibenda, nisi præcedentes doses absque effectu jam sint exhibitæ. Præterea notandum ex praxi medica, laudantium opiatum præscribi vel intentione *primaria* v. g. dolores vel vigilias, vel excretâ, aliâque symptomota urgentia attendendo, & sic ad gr. i. ij. iij. præscribendum vel intentione *secundaria* v. g. ad reborandum, sanguinem fluxilem concentrandum, addendum illud apperientibus, hysteriis, cephalicis &c. Et sic in dosi refracta & remissa. 4ta. Nempe tertia vel dimidia pars grani miscenda, prout in formulis sylvianis videre est. Dosis *extraordinaria* variatur tum ex consuetudine, tum ex morbi urgentia, tum ob temperamentorum diversitatem, hinc si adsit urgens indicatio, nec dosis minor juvet, ad gr. viij. vel scr. S. ascendendum. Interim in omni dosi perpetuo observandum, tutius esse infra subsistere, vel repetita vice voti compotem fieri, quàm peccare in excessu & extrema tentando opprobrium sibi accersere.

XII.

Insuper. 3. Notabit, ubicunque materia peccans in majori quantitate reperitur, quàm ut subigi & vinci possit, illud locum primùm habere præmissis universalibus, vel saltem tutius ac felicius tunc operari, nisi dolorum, aliorumque symptomatum nimia adsit urgentia, quo in casu etiam citra illa præmissa exhiberi valet. 4. Non exhibendum esse viribus valde imbecilibus existentibus, sed in tempore usurpandum, si vires adhuc consent. In rebus enim desperatis, & ubi æger vix non agonizat & viribus penè Ecclipsantibus mortem accelerat. 5. Illud etiam contraindicari in Phthysica ulcerosa dispositione, asthmate humoroso, hydro-

piciis

pis &c. Cùm in talibus sit viaticum ad vitam æternam dosi primaria præsertim datum. 6. Quod ad tempus exhibendi, si detur primaria intentione, tempus nocturnum optimum esse 2. vel 3. horis à cæna, sin secunda-ria, etiam manè & post meridiem. In dosi primaria una die bis non facilè dandum. 7. Post assumptum Narcoticum purgationem altero desuper die institutam debitâ operatione destitui. 8. Cavendum esse, ne exhibeatur in ipsis Parozysmis v. g. hemicrania, februm & Epilepsia, ne natura à pugna suscepta revocetur- interim tamen hoc ipsum limitari potest ab urgentibus circumstantiis, illudque concedi in dosi succisa, idem di-cendum de aliis motibus criticis, ut diarrhæa varriol- lis morbillis &c. Item de partu instante, cùm dolores necessarios inhibeat.

XIII.

PRÆTEREA. 9. Observabit, illud minus convenire in affectibus frigidis quàm calidis, item in humoribus crassis, pituitosis & viscidis, item in affectibus ventricu-li, nisi urgente dolore inflammatorio fugiendum esse opium monet *sepal.* prout etiam in iis, quibus debilis appetitus, qui facilem habent alvum & infirmum ven-triculum. In his enim appetitum prostermit, & alvum solvit, vel etiam prout subinde observatur, vomitum ciet, quod videtur contingere vel à relicto sulphure fa-rido ventriculum relaxante præsertim si ritè non fuerit præparatum, vel à cacochymia humorum in ventriculo existentium. 10. Damnari quoque ab aliquibus opium in doloribus aurium & oculorum lippitudinibus, cum ob amorem mordeat, & dolores augeat. In odon-talgia quoque melius esse idem interius assumere, quàm dolentibus partibus applicare. 11. Ratione ætatis infan-tibus & pueris rariùs & parciùs illud dandum esse, licet, dum indicatur exhibitum dosi ipsis proportionata non multum noceat restante quotidiana experientia. Sc-nibus quoque non adeo convenit, ac aliis ætatibus.

Interim

Interim si moderatè detur usus ejus tutissimus. 12. Cùm Narcotica plerumque corpus exsiccent, nunquam offerenda esse sine humectantibus vel ante vel post ejus assumptionem exhibendis, ultimò videndum, ut opium ritè sit præparatum, neque statim desperandum esse, si legitimâ observatâ Methodo datis opiatís æger per longum tempus dormiat præsertim si vigiliæ continuatæ præcesserint.

XIV.

EX dictis Patet, quod laudanum opiatum ritè exhibitum sit manus quasi divina & sacra vitæ anchora: cymba autem charontis in manu Imperiti & gladius in manu furiosi. Nonnulli præsertim misochymici illud damnant, quia. 1. Odorem habet virosū. 2. Quod sit venenum. 3. Quod multi ex ejus usu interempti fuerint. 4. Quod tutiora sint hypnotica. 5. quod opium sæpius adulteretur. 6. Quod palliativam solum præbeat curam nec tollat causam morificam, hincque ad exiguum tantum tempus profit. verum R. ad 1. odorem virosū corrigi & tolli, neque omnia fatentia virosa esse. ad 2. non esse venenum propriè dictum, quod peculiari vi cordi infestum, & vitæ omnibus modis insidiatur, sed posse dici venenum impropriè dictum, quod nimia copiâ assumptum enecare possit. ad 3. abusum non tollere usum. ad 4. hypnotica sæpius nihil proficere. ad 4. observandas esse notas bonæ electionis opii. ad 6. subinde etiam ipsam causam tollere; sæpius verò urgenti occurrere symptomati. Satiùs enim est cum Galen. symptomatibus occurrendo ad causæ continentis ablationem roborare naturam, quàm cum morbo ægrum de medio tollere, non enim solis utendum opiatís, sed causæ simul invigilandum, stultum tamen est, semper causæ ablationi intentum esse neglecto urgentiori symptomate. Redit quidem sæpè dolor, redit excretio simul ac evanuit vis medicamenti, sed Interim natura

natuta perhas inducias confortatur, ut promptius de in
contra causam mor bificam insurgat.

S. VI.

De Officio Medici in prescribendis formulis remediorum opiatorum.

Syrupus Narcoticus. R. Syr. fl. papau. Errat. unc.
S. confect. alk. dr. S. laud. ap Helm. gr. ii. aq. cinam.
bugl. dr. iii. vel violar dr. vi. M. S. Ruhe = Safft.
auffeinmahl 2. oder 3. Stundt nach dem Nacht-Essen
einzunehmen.

Emulsio opiata. R. Sem. mel. excort. dr. ii. sem.
papar. alb. dr. iii. aq. nymph. viol. solan. an unc. i. S. M.
F. Emuls. add. magist. perlar. cum gr. ii. laud. op. in mor-
tar. subact. scr. i. spirit. ros gut. vii. man. christ. perl. dr.
i. M. S. Schlaf. Milch vor der Schlaf. Zeit einzuneh-
men.

**Bolus Narcoticus in nimio vomitu, hypercatharsi
& singultu.** R. Theriac. dr. S. confect. alk. scr. i. laud.
op. gr. i. vel ii. M. S. Stöll-latwergl oder Zucker. Vel
R. Theriac. andron. scr. ii. lig. aloes ver. scr. S. ol. destill.
mac. gut. ii. laud. op. gr. i. M F. Bol.

Alius. R. conf. ros. vitriol. dr. i. confect. alk. vel de
hyac. dr. S. terr sig. scr. i laud op. gr. i. vel ii. ol. destill.
cinam. gut. i. cum f. q. myv. cyd. M. F. Bol.

Alius in Diarthæa. R. Conf. ros. rub. dr. i. ther. and.
scr. i. laud. op. gr. ii. magist. corral. perlar. an gr. v. M.
F. Bol.

Bolus Narcoticus. R. Laud. op. Helm. gr. iii. mi-
drith. opt. confect. alk. an scr. i. M.

Bolus stegnotico - anodynus. R. conf. symphis. dr. i.
pulv. sipt. Croll. vel stegnot. Guttman. scr. i. laud. op. gr.
S. M.

Electuar.

Electuar. opiarum antidysentericum usu & praxi P. P. probatissimum, R. Conf. ros. vet. unc. i. theriac. vet. diascord. dr. i. terr. sigill. corall. rub. præp. sem. plantag. anser. i. S. c. c. philos. præp. scr. i. lap. bez. occident. gr. vi. laud. op. Helm. gr. iv. cum. S. q. syr. deros. succ. M. F. Elect. S. Stöll- Latwergen / darvon jede 4. Stund eis ner Kösten groß zunehmen.

Pilul. opiat. in tussi & Cattarrho tenui, R. mass. pilul. de cynogloss. gr. vii. ol. sem. coriand. gut. ij. M. F. pilul. N. iv. vel R. mass. pilul. de cynogloss. dr. i. S. succ. Glych. inspiss. scr. i. S. succin. alb. præp. scr. S. M. F. pilul. N. xxiv. asperg. pulv. ros. rub. S. Huesten vnd Cattar stillende Pillulen / darvon N. zwo oder 3. Stundt nach dem Nacht-Essen zunehmen.

Aliæ in Phytis incipienti utiles, R. Antihect. Poter. scr. i. sacch. sat. scr. S. extr. croc. gr. iv. laud. op. Helm. gr. ii. vel iii. cum S. q. Bals. peruv. M. F. pilul. N. xx. pro 2. dosibus.

Pilulæ opiatæ in Colica. R. extr. castor. gr. iv. laud. op. gr. iij. M. F. pilul. N. v. vel R. extr. lig. alo. castor. zeduar. laud. op. an gr. iii. cum syr. de papar. M. F. pilul. N. vi. vel ix.

Aliæ anodynæ in doloribus Podagricis. R. Extract. papau. errat. dr. i. castor. gr. vi. sal. vol. c. c. vel succin. gr. iv. cinnab. nativ. scr. S. laud. op. gr. ii. M. F. pilul. N. xxx. dos. a. gr. vi. ad scr. S.

Pilulæ opiat. antidysentericæ & contra hypercathartism. R. Extr. theriac. gr. vi. torment. scr. S. laud. op. gr. ii. M. F. pilul. N. ix.

Pulv. absorbens opiat. Wedel, videatur de præparantibus.

Alius, R. Cinnab. nat. scr. i. corall. rub. præp. c. c. phil. præp. an gr. xv. marg. præp. gr. x. laud. op. Helm. gr. ij. ol. charyoph. gut. iij. M. F. pulv. cuius dos. scr. i.

Pulvis Diaphoretico-anodynus in Arthritide. R. ocul. cancr. præp. conch. præp. an gr. xv. cinnab. nat. scr. S. laud. op. gr. ii. vel iii. M. F. pulv. pro 2. dos.

Alius

Alus Nephelico-anodynus. 3. ocul. can. p. p. ser. 4. cinnab. nat. vel antim. ser. S. laud. op. gr. i. vel ii. Ar. F. pulv.

Mixturis quoque quibuscunque unum vel alteram gr. laud. opiat. pro indicatione nesciri potest, ut necesse non sit plures hic subnectere formulas.

C A P U T VIII.

D E

De officio Medici in affectibus
exigentibus Alexipharmaca, anti-
febrifuga, anthelmintica, carminativa
& lithontriptica.

S. I.

*De Officio Medici in ordinandis & prescri-
bendis remediis Alexipharmacis.*

I.



Edicamenda *Alexipharmaca* sunt, quæ venenis & malignitati humorum resistunt, dicta etiam *Alexiteria* & *bezartica*. Est autem *Venenum* illud, quod particulis machinæ humanæ per-
eigrinis & destructoriis cirra aliam causam manifestam corpus humanum, ejusque principia vitalia violenter destruere, ac in vitæ periculum vel mortem conucere valet. *Venenum* hoc vel corpori infertur & proprie dicitur *Venenum* vel in eodem producit & dicitur *malignum* seu *veneno* analogum. 2. Aliud *venenum* lædit
inspiratu,

inspiratu, ut seminaria pestis & febrium malignarum; Aliud *haustu*, quod ore sumitur, aliud solo *contactu*, ut *vel morfu*. 3. aliud est *externum*, aliud *internum*. 4. Aliud magis *citum* & *actuum* quod exiguo temporis spatio interimit, aliud *lentum* & *temporarium* quod efficaciz remissioris post multos demum dies necat. 5. Aliud est *soli homini* tale, aliud *Brutis*, multa enim homini sunt venena quæ aliis animantibus in alimoniam cedunt, & vicissim ob diversum nexum principiorum vitalium. 6. Aliud est *universale*, quod omnibus ac singulis animalibus adversum, ut v.g. arsenic. mercur. sublim. aliud *particulare*, ejus in homine aliud nervis & spiritibus animalibus inimicum, ut solanum furiosum, aliud pulmoni ut lepus marinus, aliud ventriculo, ut omne corrosivum, aliud vesicæ ut Chantharides. 7. Aliud magis officit partes *spirituosas*, aliud *humidas*, aliud *solidas*. 8. Aliud est *Vegetabile*, ut aconitum, cicuta, napellus. Aliud *animale* ut scorpius, vipera, canis rabidus, aliud *minerale* ut arsenicum mercur. sublim. cobaltum.

II.

VENENA non tam occultis, quam manifestis quoque agunt qualitatibus adeo ut sint vel *corrosiva* vel *fermentativa* vel *vaporosa* vel *mixta*. Corrosiva ventriculo, escharam & necrosim inducunt atque talia plerumque sunt mineralia, hinc si statim revomantur delictiori Archæi sensu & naturæ robore, non nocent, uti etiam siingerantur in ventriculum plenum, vel pinguibus præsumptis repletum acrimoniâ nempe obtusâ & faciliori, consequente vomitu. Fermentativa motum in M. S. præternaturalem, cumque vel absolutè lethalem, vel summè periculosum inducunt, unde calor febrilis, æstus, deliria &c. Atque tali vi fermentativa peregrina agunt potissimum venena animalia, quatenus cum saliva ejusmodi sal peregrinum irato præsertim animali in vulneratam partem illatum mox serum & sanguinem

P

iminuit

immutat, ut corrumpantur, fermentationem præter naturalem & necrosini patiantur, hinc facta statim exsuctione vel destructione hujus fermenti peregrini vel non nocent planè vel citius debellari possunt. Vaporosa spiritus præsertim animales obnubilant, suffocant & destruunt, atque hujusmodi vaporositatem peregrinam agunt potissimum venena vegetabilia, quatenus sulphure v. g. impuro, mucilaginoso, ac nervis inimico pollent. Mixta pluribus vel omnibus nunc recensitis modis nocent. Sic v. g. venenum in corpore genitum in febribus malignis nunc fermentationis peregrinæ solutes, nunc simul etiam irritatione & vaporositatem nocet, sic pestis venenum corrosivum demonstrant carbunculi, dysenteria, cardialgia. fermentativum febres, bubones, anxietates &c. Vaporosum deliria, sopores, vertigines.

II.

Sicuti igitur diversus agendi modus in venenis, ita etiam alexipharmacorum diversa est agendi ratio. Nam; præter occultam qualitatem aliqua horum putredini resistunt, ac balsamo nativo roborato, calore item exsuscitato, circulatione ac motu sanguinis & lymphæ restituto fermentum peregrinum excludunt. 2. Alia veneni particulas acutas & corrosivas involvunt, & obtundunt 3. Alia in veneno vaporoso poros cerebri referant, illamque volatileni, & figentem glutinositatem attenuant, & in halitus resolvunt. 4. Alia fermentativum despumant, & orgasmum malsæ sanguinæ invertunt. 5. Alia ichoreſcentiam, resolutionem & rarefactionem sanguinis nimiam impediunt, atque. 6. Alia tandem sanguinis ac feri motum promovent, ejus coagulationem impediunt, ac fermentum malignum per sudores eliminant. Sicuti igitur diversa sunt venena, ita etiam diversa sunt bezoartica, cum nullum sit alexipharmacum, quod omnibus æque venenis ex æſſe conveniat.

IV. Cir-

IV.

Circa usum & legitimam horum administrationem Medicus notabit. 1. Alexipharmaca alia dici *universalia & communia*, quæ ubique exhibentur, si veneni natura specialis haud sit cognita ut v. g. *Theriac. Orvietan. tinct. bezoart. &c.* Alia *particularia* seu *antisthoda*, quæ huic vel illi veneno speciatim adversantur. 2. Venenis mineralibus generalem præbere antitodum, quæcunque corrosivitati sunt opposita qualia sunt tum pingua, quibus inviscari & obtundi solent particulæ salinæ acres, ac obliniri & defendi parietes ventriculi ut v. g. ol. amygd. d. butyr. rec. &c. Tum præcipitantia, & acorem corrosivum infringentia ut Chrysell. præp. 3. Alexipharmaca in malignis præcipue febribus usurpanda alia esse fixa & quidem vel mineralia ut v. g. *antim. diaph. unicorn. foss. &c.* Vel animalia ut v. g. *lap. bez. unicor. ver. &c.* Alia *volatilia* & quidem vel *macra salina* ut v. g. *sal. vol. cc. viper. succ. cit. &c.* Vel *aromatica & sulphurea* ut v. g. *theriacalia.* Item alia simul esse *opiata* ut *Theriac. diascord. &c.* Alia *Camphorata.*

V.

Flixiora locum magis habent in statu & declinatione, ubi alteratione & præcipitatione magis opus, con- quiescente jam tumultu & devictâ jam per præmissa potentiora malignitatis atroicâ. in statu enim violentiora exhibere esset novas turbasciere in massa sanguinea, æstum intendere, ac varia capitis pathemata inferre. Item prosunt, ubicunque volatilia contraindicantur, ut in infantibus, quorum sanguis est textura tenuioris, ut facili nimis efferari possit, vel in gravidis, ne in orgasmum ruat sanguis & menses cum abortus & vitæ periculo superveniant, vel in fluxibus sanguinis ob nimiam ejus rarefactionem, vel in debilibus cum


pulsu frequenti, qui alias in malignis, si à principio calis sit, plerumque funestus.

VI.

Volatilia salina macra locum habent, ubi calor febrilis paulò intensior. *Aromatica* verò & *sulphurea* in principio & incremento morbi, dum adhuc sudare possunt ac solent ægri. Activiora enim & magis Heroinca primò hosti sunt opponenda ad maiorem penetrationem & citiorem discussionem, præsertim ubi mitior urget æstus, Intimior est malignitas, ac febris mitis vel nulla adest, hinc principiis, si ullibi sanè in peste & similibus febribus obstandum maturè sumendo antidotos antequam cibus capiatur, vel somnus ineatur. Sic enim sæpius in ipsa radice morbus Jugulatur, cum aliis promptè vitalia subeat malum, radicéque figat vix nisi cum morte finiendas. Præterea conveniunt ubi natura ab ex pulsione v. g. petechiarum, varriolarum vel morbillorum cessat, vel hæc exanthemata retrocedere videntur, neque hoc in passu timendus calor utpote productum seminii morborum brevi compescendus modo exclusum sit peregrinum hunc motum excitans.

VII.

Remedia *Camphorata* tum maximè conveniunt, cum adsunt inquietudines, deliria, vigiliae &c. Cum præter vim veneni correctivam simul aliqualem vim spirituum quasi fixativam obtineant, hinc *Estmüllero* teste Medicus in peste absque camphora, est miles in prælio sine gladio, interim cautius his utendum in illis ægrotis, quibus caput debilius, vel alias camphora inimica existit. Alexipharmaca, quæ simul *opiata* sunt locum præcipuè habent in augmento morbi tum quia sudorem magis promovent, tum quia spiritus, ne tam citò resolvantur quasi coercent, tum quia potissimum graviora mitigant symptomata, ut vigilias, inquietudine, imminentiâ deliria &c. Interim sciendum Medicamenta hæc Alexipharmaca



pharmaca varianda & subinde fixiora volatilibus interpo-
landa ac variè invicem miscenda esse pro vario maligni-
tatis aut putredinis gradu, pro varia febris intensione vel
remissione, pro vario ægrotum temperamento, aliis-
que circumstantiis.

VII.

PRæterea. 4. observabit Medicus, potentiora sudori-
fera tutius usurpari posse, si corpus perspirabile
sit, & ad sudorem inclinet, secus mitioribus utendum esse,
ne turbetur & magis exagitetur massa sanguinea. 5. cor-
pora impura volatilibus magis agitari & lædi, unde hoc
in casu præmittenda vomitoria. 6. Alexipharmacis aro-
maticis & sulphureis interponenda esse subinde acida ac
in specie compositiones theriacales in vehiculo acido
propinatas melius & citius operari. 7. Quo major est
malignitas, eo frequentius & copiosius provocandum
esse sudorem, adeo ut in malignioribus ter sint propi-
nenda intra 24. horas. Interim cavendum, ne nimius
exciterur sudor, cum ex hoc ultra ephoriam imperato
sæpè peius habeant ægri, hinc prudenter agunt, qui vi-
rium habitâ ratione ægrum linteis aut stragulis non op-
primunt, sed tolerabiliter saltem tegunt, vel primâ sal-
tem vice sudorem imperant: non vero amplius se-
quentibus præbis, cum plûs sæpè præstet udor. 8. Ne
serum nimium exhauriatur, illud potu largiori resarci-
endum esse, & pro viribus conservandis post sudorem
vel etiam eodem actu fluente blandis acidulis uten-
dum, hinc malè agunt, qui continuo udore cruciatis
etiam potum denegant, cum potu & levetur sitis ac si-
mul etiam magis promoveatur sudor.

IV.

Tem. 9. Notabit: sudorem continuandum esse per
horam dimidiam integram vel etiam ultra, habitâ ra-
men ratione sedulâ naturæ ægri raræ vel densæ, virium
infirmarum vel validarum, malignitatis majoris vel

minoris. 10. Sudorifera etiam continuanda esse licet maculæ, bubones vel anthraces cum levamine appareant, ut saltem impediatur recidiva. 11. Ægrum sudantema somno arcendum esse utpote impediante convenientem veneni per sudorem expulsionem, hinc eodem infestante spongia aceto camphorat. Imbuta naribus applicanda. 12. Post sudorem ægrum nonnihil leviter abstergendum esse linteis probe calefactis & fumigatis, maximè cavendo, ne frigidior aer eum offendar. 13. in peste conjuncta cum febre ardente uti jam supra innuatum, theriacalia excepto diascord. Fracast. minus tuta esse, vel saltem non nisi acidis temperata, sicuti e contra si febris nulla vel mitis adsit, illico naturæ suppetiæ ferendæ, eaque spirituosius volatilibus multum ignis vitalis foventibus adjuvanda, quæ fermentum stomachicum resuscitant, sanguinem vigorant, ejus coagulationem impediunt, spiritualescentiam promoveant, ac vacillantem vitæ flammam multiplicant. 14. Acida in his febribus nunquam ommittenda atque nunc sudoriferis addenda, nunc in sudoris declinatione vel post eum usurpanda, cum ægrum reficiant & simul malignitati resistent: Ipsis tamen etiam semper aliquid sudoriferi addendum, ut corpus si non in perpetuo sudore, saltem in perpetua diaphoresi plus minus aucta contineatur.

S. II.

Officio Medici in præscribendis remediis Alexipharmacis.

POTIO Alexipharmaca. R. Elect. diascord. fracast. scr. iv. pulv. rub. pannon. aut spec. de hyac. vel spec. liberant scr. i. sal. vol. cc vellap. bez. an. gr. vi. aq. card. b. scabios an. unc. i S. syr. acetos. ter. unc. S. M. S. Gist austreibendes Schweiß-Trankl auff einmahl einzunehmen.

Alia.

Alia. R. aqua scabios. unc. ii. S. scord. ꝑunc. S. succ. cit. rec. expr. dr. vi. theriac. vel diascord fracaſt. ſcr. iv. vel dr. ii. antin. diaph. vel ſpec. liberant. dr. S. camph. gr. v. ſyr. card. b. unc. S. M. S. ut ſupra.

Alia fortior. R. aq. card. b. è typh. cervor. an. unc. i. S. ſal. vol. c. c. gr. xv. vel ſpirit. cc. dr. S. Elect. diascord. theriac. opt. vel elect. deov. an. dr. i. acet. theriac. camph. dr. i. M.

Emulſio Alexpharmaca Craton. R. Sem. card. b. dr. i. S. cit. dr. S. nap. dr. i. aq. card. b. q. ſ. M. F. emulſ. add. ſyr. acetof cit. unc. S. poſſunt quoque addi cc. phil. prep. ocul. canc. terr. ſig. lap. bez. S. auſtreibende Milch.

Bolus Alexipharmacus. R. diascord. fracaſt. ſcr. ii. conſect. de hyac. ſcr. i. cc. phil. prep. ſcr. S. lap. bez. orient. gr. vi. M.

Alius R. theriac. conſect. hyac. an. ſcr. i. S. lap. bez. or. gr. xii. vel hujus loco ſpec. liberant. aut antim. diaph. ſcr. i. vel ſt. ſulph. dr. S. camph. gr. iv. M.

Electuar. Bezoarticum. R. Spec. liberant. dr. i. theriac. diascord. an. dr. i. S. conſect. de hyac. ſcr. ij. condit. cort. cit. arant. rob. rib. an. dr. iii. ſyr. acetof cit. q. S. M. F. Elect. S. Auſtreibende Schmitz. Latwergen / darvon Morgends / Abends vnd Nachts einer Köſten oder Nuß groß zu nehmen vnd darauff zu ſchmitzen.

Electuar. Præſervativum à peſte & febribus malignis R. Pom. cit. rec. N. iv. incid. una cum cort. & ſemin. coq. ex S. q. aq. roſ. ad conſiſt. pult. & trahic. per cribr. add. ſpec. liberant. ſ. aloe. de hyac. degemm. fr. cordial. temperat. an. dr. i. conſect. alk. dr. ii. S. ſpirit. rub. id. dr. i. ſyr. acetof. iſt. q. S. M. F. Elect. S. Præſervatiu Latwerg Morgends nüchter einer Nuſſen groß darvon zu nehmen.

Morſelli Præſervativum in Malignis. R. Spec. liberant. dr. ij. de hyac. dr. i. Bol. armen. terr. ſig. lign. alo. an. dr. S. rad. zeduar. contraierv. an. dr. i. S. condit. rad. ſcorz. annul. Angel. an. dr. iii. cort. cit. dr. vi. conſect. alk. dr.

q. sacch. in aq. bez. oart. sol. lib. i. M. F. Morfell. S. præser-
vatiu Morfellen / darvon einen Morgens zu nehmen.

Alii. R. Conditi. nar. lugl. unc. i. cort. cit. rad. scorz. an-
dr. vi. st. cit. dr. iij. confect. alk. dr. ij. spec. de hyac. dr. i. li-
berant. dr. i. S. diatriosant. dr. S. extr. Angel. z. e-
duar. an scr. i. sacch. albiss. in aq. cort. cit. sol. unc. x. M.
F. Morfel. S. ut supra.

Trochisci Alexipharmaci præservativi. R. cort. cit.
sicc. dr. i. S. cubeb. dr. i. cardam. dr. S. z. eduar. scr. s. e-
caß. lign. acutiss. dr. i. ol. dest. Angel. cit. an. gut. vi. sacch.
albiss. lib. S. mucilag. tragac. cum aq. bez. oart. extract. q. S.
M. F. troch. S. Præservativ. Gelelein / darvon eines wann
man auß dem Hauß / oder zu solchen Kranken gehet /
unter der Zungen zu halten vnd vergehen zulassen.

Pulvis Alexipharmacus. R. Spec. de hyac. vel pulv. rub.
Pannon. cc. phil. prap. an. scr. i. lap. bez. orient. vel sal.
vol. cc. gr. vii. M. F. pulv. S. Giff vnd Hiß außstret-
bendes Pulver auff einmahl einzunehmen.

Alius. R. Spec. liberant. dr. S. camph. gr. v. st. sulph. scr.
S. M. F. pulv. S. ut supra.

Alius. R. flor. sulph. ter. Sigill. spec. liberant. corall.
rub. prap. bez. orient. an scr. S. croc. vel camph. gr. iij. M.
F. pulv.

Alius pretiosus. R. Spec. de hyac. dr. ij. cc. phil. prap.
scr. v. unicorn. Ser. oss. decord. cerv. lap. bez. marg. prap.
an scr. i. M. F. pulv. dos. scr. ij.

Acerum Alexipharmacum præservativum Timæi. R.
Orvietan. unc. i. diascord. fracaß. dr. iij. ther. androm.
unc. S. rad. Angel. contraiter. Ennul. torment. pimpt.
nell. scorz. di. amn. alb. petasit. an. dr. iij. fol. scord. rut.
millesol. an. pu. st. calend. tun. an. pi. cort. cit. fraxi. an. dr.
ij. baco. juniper. unc. i. mac. z. eduar. an. dr. i. S. camph.
scr. i. croc. dr. S. myrrh. dr. ii. acet. opt. vel rub. ida q. S.
mixta stent infusa in loco calido bene testâ, donec extraha-
tur in aqua Col. S. præservirender Giffi ößfig / darvon
des Morgens ein Löffel voll nüchter oder nach ge-
nommener Suppen / oder ein schnel Brodt darein
eingedunckt zu nehmen.

Vinum

Vinum præservativum. ℞. Rad. Ennul. pimpinell. scorz. an. unc. i. cort. cit. Frax. an. dr. Si. fol. card. b. scord. dellamn. cret. an. mi. comar. absinth. m. ii. grosso modo incisa indantur saccul. ex sind. alb. suspendendo in Vin. alb. lib. xxxviii optimè clauso doliola de hoc aliquid manè in jentaculo vel prandio bibendum.

Balsamus antipestilentialis. ℞. Ol. distill. Angel. cit. an. scr. s. rut. scr. i. lavend. sharyoph. an. gut. vii. cinam. gut. s. lig. Rhod. gut. xv. theriac. androm. scr. s. confect. alk. scr. s. mosch. & amb. in sp. ros. sol. an. gr. iij. M. P. Ball. S. In hîzigen Kranckheiten Præservirenden Gifte Balsamb die Nasen vnd Puls zu bestreichen.

S. III

De Officio Medici in usurpandis antifebrifugis & præcipuè cortice Chinachina,

I.

Remedia antifebrifuga seu antipyretica dicuntur, quæ febriles Paroxysmos sistunt, sicquæ febres intermittentes, quæ raro solis evacuantibus cedunt, ex integro tollunt. Exercent autem suam vim vel cruditates comminuendo ac aciditatem infringendo & absorbendo, sicquæ fermentum febrile corrigendo, vel effervescentiam ejus præcipitando, aut vi stiptica humores densando & figendo, vel fomitem febrilem alterando, per diaphoresim discutiendo ac vitiatam crasim massæ sanguineæ emendando vel sanguini compagem firmiorem reddendo, ut minùs in febriles effervescencias sit concitabilis.



II.

Pro debita horum administratione & usu Not. i. Ea non exhibenda esse, nisi corpore priùs sufficienter expurgato.

purgatio , ac universalibus præmissis , cum secus vel recidiva , vel multiplicatio febris , vel Colicæ , hydropes , cachexiæ vel pedum saltem tumores superveniant. 2. Eadem exhibenda esse una . duabus vel tribus horis ante Paroxysmi invasionem ita ut junctis viribus cum natura operentur. 3. Desuper sudorem imperandum esse , cum teste experientiâ febres , quarum Paroxysmi singuli cum sudore fiunt , longè breviores , & facilioris curationis sint , quàm illæ quæ absque eo desinunt , unde multis febris intermittens nulla tuto curata esse dicitur , nisi per sudorem successivè finita fuerit. 4. Si æstus multum urgeat , abstinendum esse à nimis calidis , volatilibus , aromaticis & theriacalibus. 5. Vbi frigus magis urget , salia fixa convenientiora esse. 6. Fixis calcinatis & aluminosis minus fidendum esse, cum facilius recidiva superveniat. 7. Opiata febrifugis usitatis mixta locum habere, vel quando Paroxysmi potius ex consuetudine naturæ febriendi sæpius recurrunt quam ex fomite morbofo , vel quando durante Paroxysmo graviora quædam vel etiam molestiora contingunt symptomata usu laud. opiat. corrigenda 8. Etiam exterius Carpis quædam applicari antifebrifuga quæ pericarpia vel febrilem fermentationis motum sedando vel particulas in massam sanguineam evibrando cruditatem ejus imminuunt, vel ipsâ ligaturâ , aut dolore aliquo excitato effectum hunc producendo. 9. Inter antifebrifuga maximè specificum ac decantatum effecort. chin. chin. de quo in sequentibus.

III.

Cortex china china est cortex arboris cujusdam, quam aliqui *gentianam indicam* vocant , in America peruviana crescens dictus etiam ideo *Peruvianus* & à virtute *febrifugus*. Olim etiam Pulvis adm. [R. R. P. P. Soc. Jes. appellabatur , cum hi ex peru redeuntes cum secum attulerint , ac Anno salutis 1649. non tantum per Hispaniam ,



niam, verum etiam Italiam Romam usque eorumope,
ac conatibus in primis Reverendissimi *Joann. Cardinal.
de lugo Soc. Ies.* Vltus ejus pervenerit. Vltitata quam
maximè in febribus intermittentibus tollendis, ac in-
primis tertiana & quartana tam simplici quam duplici,
vim suam exercet Iuxta nonnullos facultate stupico
amara cruditates minuendo, aciditatem infringendo,
fermentationes & effervescencias sistendo, ac sanguini
compagem firmiorem, roburque conciliando: juxta
alios fermentum febrile deleterium in spiritibus exis-
tens, qui dein M.S. agitant, & fermentant, vi quasi
Alexipharmaca antitodorum more infringendo ac si-
gendo. Ut autem hoc præstet, oportet eum esse germa-
num & sincerum, non fucatum, supposititium, spurium,
effæctum & putidum. Ille colore cinanomi, sapore aro-
maticè amaro, odoremucidum quid licet suave & aro-
maticum spitante, qui etiam dentibus attritus vel alio
modo fractus friabilis existit: hic colore nigricans,
injuçundè amarus, vel intensè acerbus, nihil muc-
idum spirans, viscidus etiam, glutinosus, crassus, lig-
neus, putidus.

IV.

Circa illius usum & exhibitionem Not. 1. cum effica-
cius operari exhibitum in substantia, modo in Pol-
linem seu alcool arte prius redactus fuerit, ut melius de-
glutiri ac per habitum corporis traici valeat. 2.
Eum prima vice in majori dosi exhibendum, ac ordi-
nariè ad. dr. ij. infus. in vin. malu. ut. absque colatura
2. Circiter horis ante Paroxysmum, cum sic plus ope-
retur talis dosi, quam decem aliæ. 3. Eam non facile
exhibendum, ubi magna adhuc crudilitatum congeries,
& corpus debite haud evacuatum nisi ob labascentes,
fractasque vires & febris acerbicatem ægri in summum
vitæ discrimen coniiciantur, ut ad corticem hunc ceu
sacram anchoram per curam saltem palliativam confu-
giendum

glendum sit, præmittenda igitur universalia & præcipue vomitoria. 4. Fugatis à Corticè Paroxysmis febrem post dies 8. 14. vel aliquot septimanas recrudescere ut plurimum, nisi ejus usus continuetur, hinc suadendum ac multis in usu & praxi, ut corticem adhuc ablatâ jam febre, per dies 8. vel 14. adunc, unam vel alteram continuant exhibendo 3tia vel 4ta 6ta. horâ. i. prædicti corticis subendo etiam, ut æger ab injuriis æris & diætæ erroribus abstineat. 5. Cùm Pharmacum hoc natura sua non admodum gratum sit & sæpius exhibendum, Medicum instructum esse debere variis formulis hujus febrifugi haustus nempe, boli, Electuarii, pilul. tinct. &c. ut æger nauseabundus vel præjudiciis in corticem præoccupatus honestè decipi possit. 6. Operari hoc Medicamentum sæpius per sudorem interdum per vomitum, raro per sedem, subinde etiam sine omnibus hiscè febrem profligare.

V.

PRæterea observandum. 7. In febribus diutius & perspicue intermittentibus ejus usum esse tutissimum, ac præcipue in tertianis & quartanis autumnalibus, nec non vernalibus minùs exquisitis: econtra minùs tutum in febribus magis æstuosis & calidioribus obscurius intermittentibus præsertim si temperies & anni tempestas calidior, hinc etiam, si nullum exinde sentiatur levamen, sed febris potius incandescat, ab ejus usu desistendum. 8. Post ejus exhibitionem propinata Purgantia vel vomitoria Paroxysmos prius abactos revocare, hinc si Catharsi à corticis usu exigatur, nonnulli eam instituunt lenioribus Catarcticis cum laudano & cortice mixtis. 9. Si præsertim ab appetitu minùs vigente recidivam morituram prælagire liceat, saltem ad spatium unius hujus intervallo nempe 8. vel 10. dierum unciam unam corticis repetendam esse, ita ut dr. i. in forma quavis gratissima ter in die assumat æger superbibendo vinum malvaticum vel aliud album generosum. 10. Corticem chinæ

china china ab aliis admixtis Medicamentis antifebris
 fugis vix ullam accedere virtutem : multam econtra læ-
 pè detrabi. Interim si simul febris jungatur cholera , vo-
 mitus , vel diarrhæa præsertim torminosa , colica &c.
 aliquid laudani opiatî eidem admisceri potest ij. regimen
 calidum , decubitus in lectulo , vinorum & cardia-
 corum generosiorum usum Corticis operationem
 eludere aut remorari, sic uleus quoque internum pulmo-
 num nempe , renum &c. Non solum ejus effectum pro-
 telare , sed nonnunquam eludere , & paroxysmos prius
 abactos paucis diebus revocare. 12. Paroxysmum ab
 ejus usu vehementiorem observari , qui tamen febris
 discessum plerumque præsignat , quod etiam significant
 Paroxysmus ab ejus usu diminutus aut in melius con-
 versus , item sudores liberales aut urina copiosa & lim-
 pida , quæ plerumque teste *Jydenhamb* ejus usum sequi-
 tur. 13. Corticem hunc non tantum febrem , sed nonnun-
 quam etiam hydropem inde exortum depellere , ac hæti-
 cis puerorum febribus occurrere cruditates absumendo ,
 & effervescências reprimendo.

VI.

Ulterius 14. Observandum , febres intermittentes
 subinde obscuras ac protheiformes esse alios quan-
 doque simulantes morbos , quæ tamen etiam corticis
 usui cedunt præsertim si urina intensè rubra sedimentum
 lateritium præcipitaverit , quæ febrilis fermenti delites-
 centis haud obscurum indicium. 15. Si in febribus cali-
 dioribus obscurè remittentibus ac continuas redolenti-
 bus urgenti aliqua de causa corticem usurpare visum
 fuerit , cum exhibendum esse in vehiculo frigido & aci-
 diusculo accedente potu ordinario frigido præmissa v.
 S. & clyst. aëre quoque ad frigidum magis vergente , nec
 ægro nimis integumentis onerato. 16. Corticem in
 liquore infusum & decantatum convenire magis in ven-
 triculo delicato & sordescente : citius verò , & cætiùs
 operari in substantia sumptum , licet diutius moretur

in ventriculo , interim tinctura saturata multoties repetita substantiæ ferè æquivalet , vel infusio simplex loco Potus ordinarii. 17. Ex observatione *Adriani Helvet.* Chinam chinæ à dr. ij. ad unc. i. aquæ ferventi benè mixtam frequentius in enematibus adhibitam easdem exetere vires , ut per os assumptam , quod pueris , aliisque corticem aliâque Medicamenta nanſcantibus commodum foret.

VII.

Licet corticis hujus magna in febribus tollendis sit efficacia & modo vix non ab omnibus ejus usus receptus , olim tamen plures & modo paucissimi ex modernis ejus usum improbant , quia. i. sæces deleterias & fermenta morbosa in corpore relinquit , unde novæ tragædiæ & funesta symptomata repullulant , hinc paucos ab ejus usu per septennium supervivere asserunt. 2. Febres tollit absque sensibili evacuatione , sicque non fidentum. 3. Cortex hic est nimis calidus , siccus , æstuosus , febrem augens , ac crassa & terrestri substantia humores magis coagulans ac incrassans. 4. Quia ab ejus usu febres plerumque recidivant , hinc Medicamentum insidum , & febrem potius suspendens , quam tollens censendum , sed hisce Responderetur ad. i. nihil metuendum , si debitis cum cautelis exhibeatur , cum insuper quo ad omnia reclamet quotidiana experientia. ad 2. Operari per sudorem , interdum per vomitum : rarius per sedem , neque semper sensibilem evacuationem requiri in tollendis morbis , qui sæpius per specifica & antitoda expugnantur. ad 3. multa alia antifebrifuga esse calidiora , quam hunc corticem terreo-salinum , immo febrem tollere , non augere , neque humores incrassare , sed acidum infringendo emendare potius humores viscosos , crudos , coagulatos. ad 4. Febris recidiva (quæ sæpius etiam fit , quod cortex non sit genuinus) impediri per continuatum ejus usum , & licet etiam febris

febris denuo redeat tamen induciæ interim procurantur & ut natura assiduitate Paroxysmorum attrita se recolligat, & robustior evadat.

§. IV.

De officio Medici in Prescribendis remediis antifebrilibus.

Decoctum amarum febrifugum. *R. fol. matric. card. b. com. absinth. sumit. cent. min. fl. chamom. an mi. sem. card. b. cit. an ii. sal. absinth. dr. i. S. coq. in S. q. aq. ad lib. i. S. Col. dos. unc. iii. vel iv. S. Fieber Tranc alle 4. Stundt ausser den Fieber in halbes Traggel zu trincken si laxare simul animus, add. fol. fenn. à dr. i. ad iii. in decocto calido infundenda.*

Mixtura antifebrilis Crollii. *R. sal. absinth. dr. S. spir. sulph. scr. i. aq. card. b. unc. iii. M. S. Fieber Wasserlein vor dem Fieber einzunehmen vnd wohl zu decket darauffschwigen teste River. raro ter sine effectu repetitur.*

Alia Potio antifebrilis. *R. aq. card. b. unc. i. S. spir. sal. armon. à dr. f. ad dr. i. ocul. can. prep. scr. i. ol. destill. charyoph. gut. ii. syr. card. b. dr. iii. M. S. ut supra.*

Infusum ordinarium Cort. chin. chin. expertissimum. *R. Cort. chin. chin. subtiliss. pulv. dr. ii. infund (2. horis ante paroxysmum) in vin. malvat. f. q. per 2. hor. detur absque colat. S. Chine chinæ. Tranc 2. Stundt vor dem Paroxysmum zunehmen vnd darauff zu schwigen. Rarissime fallit, præsertim si cortex genuinus.*

Vinum antifribile. *R. Cort. chin. chin. subtiliss. pulv. unc. i. sal. tart. scr. ii. herb. absinth. card. b. an. pi. vin. Rhen. seu alterius albi opt. lib. i. S. infund. per noct;*

mod. in loco calido per horas ix. Col. per Chart. S. Fieber
wein / darvon den besseren Tag Morgens / vnd vor
dem Schlaf / 4. Dingen zu nehmen wie auch 2.
Stundt vor dem Fieber.

Aliud. R. Cort. per \forall . subtiliss. trit. unc. i. Irror. spirit.
Vin. rectif. s. q. addito etiam ol. sulph. campanat. diggeran-
tur in vase clauso per horas aliquot, hinc add. Vin. matur.
mens. i. diggeratur rursus per dies aliquot, & Col.

Aliud. R. Cort. chin. chin. dr. vi. cort. qua lac. dr.
ij. sumit. cent. min. mi. cinam dr. ij. Charyoph. scr. ii. ocul.
canc. prap dr. i. sal. tart. dr. iii. M. F. pulv. infund. in Vin.
absinth. Vel Rhen. mens. i. S. subinde agitando. Vfus tem-
pore somnibus bene commixtis capiatur bonus haustus in
eterna quartâ quavis horâ, in tertiana tertia.

Tinctura antifebrilis. R. cort per \forall . erasse pulv.
unc. iii. coq. leniter in aq. font. lib. i. ad dimid. Col. reliquis
decocti rursus affund. eandem aqua quantitatem, coq. &
Col. iterum ut supra, idque tertia vice repete, donec tota
corticis sis ex tracta, hinc omnes colaturas misce add. si lu-
bet syr. fl. tun. unc. iv. de hac tinctura ager unc. iv. & vi.
ita quoque hora extra paroxysmum Vel sapius ad libitum
assumat

Bolus febrifugus. R. Cort. per \forall . subtiliss. trit. dr. i.
syr. de rub. ida. Vel fl. tun. q. s. m. f. Bol. mollis repetendus
ita Vel ita quoque hora ad R. ro. Vel 12. Vices extra paroxys-
mum superbibendo Vin. alb. Vel julep. cordial.

Electuar. Febrifugum. R. Cort. per \forall . in subtiliss.
pulv. redact. unc. i. Vel i. S. syr. de rub. id Vel alterius gra-
tioris q. s. Bals. per \forall . scr. i. M. F. Elect. de quo sumat ager
quantitatem in glandis Vel nucis moÿch. ita Vel ita quoque
hora.

Aliud. R. Cort. per \forall . subtiliss. trit. unc. i. sal. tart.
dr. ii. pulv. Siperin. antim. diaph. an. scr. v. rob. Tuniper.
q. j. M. F. Elect. cuius usus ut supra

Pilulæ febrifugæ. R. pulv. cort. chin. subtiliss. trit. unc. i.
vol. i. S. succ. absinth. Vel mucilag. gum. tragac. in aq. plan-
tag. ex tract. q. s. m. f. pilul. mediocres denturandæ, quorum

℞. x. Vel xii. 41a Vel ita quoque hora intermissionis de-
glutiat superbibendo Sin. alb. Vel maluat. parum.

Pulvis antifebrilis specificus. ℞. Antim. diaph. cc.
phil. prap. matr. perl. prap. ocul. canc. prap. corall. rub.
prap. pulv. antifeb. Croll. pulv. stomach. Poter. an scr. i.
sal. absinth. cent. min. Card. b. an. scr. S. M. F. pulv.
Detur ad catul. S. Fieber stellendes Pulver daran z.
Scrupl z. Stande vor dem Fieber einzunehmen.

Aliud. ℞. cc. phil. prap. corall. rub. prap. ocul. canc.
prap. ebor. s. igne prap. magist. sacch. satur. an. dr. i. S. M.
F. pulv. S. ut supra.

Alius ℞. Fl. chamam. subtiliss. pulv. scr. i. antim. diaph.
sal. absinth. an. scr. S. M. F. pulv. sumendus ex aq. de-
still. cent. min.

Alius Pulvis antipyreticus. ℞. Cinnab. nat. Vel antim
sal. Vol. c. c. an dr. ii. chin. chin. unc. i. M. F. pulv. in vase
clauso asservandus, cuius dos. dr. i. ante Paroxysmum.

Alius ex alumine. ℞. Alum. crud. scr. i. Vel dr. S. nuc.
mosch. scr. S. M. Vel ℞. Alum. crud. nuc. mosch an
dr. i. oliban. piper. an gr. vi. ol. Charyoph gut. i. M. F. pulv.
dos. dr. i.

Pulvis antifebrilis, ubi aestus prævalet. ℞. Sal. ar-
mon. scr. i. Vel dr. S. antisept. potcr. Vel arcan. duplic. minf.
scr. S. M. F. pulv.

Alius simul opiatu. ℞. Corall. rub. prap. sal. ab-
sinth. angr. xvi. ol. dest. charyoph. gut. ii. laud. op. gr. di-
mid. Vel i. M.

Unguentum antifebrile. ℞. Vng. popul. dr. vi. tel.
aran. dr. i. S. op. thebaic. cum acet. fl. sambuc. dissol. gr.
xvi. ol. ranar. parum M. imponatur pulsibus ante Paroxysf.

Emplast. simile. ℞. Fulig. fum. splendid. unc. i. S.
shereb. dr. vi. tel. aran. unc. i. camph. scr. ii. ol. aran. qd
s. M. F. empl. carpis manuum applicandum.

Cataplasma. ℞. Vngul. alii N. iii. contund. pistill.
dein add. sal. commun. dr. S. croc. pulv. scr. i. acet. parum M.
F. catapl. alligandum parvo digito sinistrae manus, ac
per 9, dies ibidem relinquendum. alii id parant ex fulig.

allio, cepe cum album, ou. & paucō acet. atque carpis applicant.

S. V.

De Officio Medici in præscribendis remediis Anthelminthicis, eorūque formulis.

I.

Medicamenta anthelminthica sunt, quæ lumbricos necant, quod præstant vel focum & mineram vermium destruendo, ac putredini resistendo, qualia sunt tum *amaricantia* & *Balsamica* tum *acida*, tum *nitrosa* partim ob amaritiam, partim ob acidum in iis emicans, partim quod putredini resistent. tum *acria* & *alevolatili* vel sibi relicto vel oleoso imprægnata, tum *terreo-alcalina* & *lixiva salina*, vel eos suffocando, & transpirationem, in qua vita vermium & insectorum consistit impediendo per *oleosa* & *pinguia* omnia poros obstruendo, vel eos specifica virtute interimendo, aut si malis per manifestas qualitates explicare, substantiam eorum mucosam, & glutinosam liquando, resolvendo, annihilando, & corrumpendo qualia imprimis sunt *mercurialia* vermibus & cuiusvis scinio animato summè inimica, vel tandem eos exturbando per purgantia, amara, acria & resinosa, qualia sunt *aloes colocynt. Rhab. agar. spec. diaturb. cum Rhab.*

II.

Circa horum exhibitionem & usum Not. i. anthelminthica præcipue propinanda esse lunâ decrescente. 2. Eadem optima esse, quæcunque simul expellunt & necant vermes, nam & nidi, & inibi nidulantes vermes exturbandi sunt. 3. Dulcia ut saccharata & mellita per se vermes non generare tum quia putredini resistunt.

resistunt, aliaque à corruptione præservant, tum quia facile bilefcunt, eos tamen agitare & commovere, cum vermium illecebræ existant. maritanda igitur anthelminticis, ut his ipsis inefcati pro melle fel ac pro lacte venenum hauriant, hinc optimè exhiberi solent cum lacte, vel mulla, aut panatella saccharata vel in forma rotul. 4. Eadem propinanda esse jejuno ventriculo, neque statim desuper aliud comedendum. 5. Eadem aliquando mutanda & varianda esse, ne vermes hisce assuescant. 6. Eadem quoque ad tempus continuanda, cum lumbrici sæpius præsertim lati contumaces sint, & à mitioribus sensim ad fortiora progrediendum.

III.

PRæterea. 7. Not. plures præsertim agyras pro potissimo remedio exhibere ipsos lumbricos vel etiam terrestres torrefactos & pulverisatos, cum plures exinde lumbrici deiciantur, cui tamen non fidendum, cum semina vermium hoc modo propagari, & lumbricos produci potius, quam enecari experientiâ plurimorum Authorum certum sit. 8. Mercurium dulcem maxime utilem esse addito præsertim stimulo *scam. sulph.* vel *resin. Gial.* in infantibus autem minus tutum esse, nisi robustioribus, cum omnia in hac ætate fluxilia & laxa sint, atque in primis ossa & nervi, quibus Mercurius inimicus. 9. Clysteres ex anthelminticis paratos non convenire, cum lumbrici eos averfantes superiora petant, ac gravissima excitent symptomata, nisi magna adsit præsumptio, eos morari in intestinis crassis, cum his vix amplius in intestina tenuia ascendere possint, hinc præferendi clyst. ex lacte melle & sacch. parati, ut eos inferiora versus alliciant. 10. Anthelmintica & purgantia etiam exterius umbilico applicari, quia est centrum abdominis, ac pars magis perspirabilis, & quidem præcipuè in subsidium remedium internorum ac pro solamine symptomatum ut

v. g. ad dolores, tormina &c. ii. vermes alcarides magis curari Balneis, suppositoriis, clysteribus & unguentis.
12. Anthelmintica etiam se extendere ad quævis animalia p. n. corpus affligentia ut pediculos, lendes, hausta buffonum vel serpentum semina, ulcera verminosa &c.

Formulae.

Remediorum Anthelminticorum.

Decoctum amarum vermifugum. ℞. Sumit. cent. min. fl. chamom. agrim. an m. S. sem. card. b. cit. an. dr. i. S. fl. calend. p. ii. rad. gent. dr. ii. jenn. dr. Si Rhab. dr. i. aq. font. lib. ii. coq. ad dimid. f. Col. pro. 3. vel 4. dof.

Vinum anthelminticum. ℞. Rad. filic. dr. Si. du. Ham. cret. unc. S. angel. Zeduar. an. dr. ii. cort. cit. frax. an. dr. iii. sem. santon. dr. 6. citr. portul. an. dr. ii. incis. & conquass. affunde Vin. absinth. lib. ii. stent in infus. per hor. 24. Col. dentur in 6. aliquot uncia.

Aqua vermifuga Helmontiana. ℞. Mercur. crud. vitè purgat. unc. i. aq. gram. portulac. an. unc. 16. maceretur per 3. horas sapè ac fortiter agitando, hinc aquam decanta & cola relicto in vase Mercurio. S. Wurmb tödtens Wasser / Darvon 3. mahl den Tag 3. Löfl voll gunchmen.

Electuar. vermifugum. ℞. Fol. Ellebor. pulv. unc. 6. mell. despum. unc. vii. M. F. Elect. cujus dof. à scr. 16. ad dr. 7.

Rotula anthelmintica. ℞. Sem. santon. dr. ii. carb. el. dr. i. Rhab. opt. dr. i. S. resin. Gial. f. a. sol. scr. S. corv. allin. dr. 8. ol. cast. gut. iii. sacch. albiss. in aq. fl. persic. sol. 9. S. M. F. rotul. 8. Wurmb Zellein.

Alia. ℞. Corvallen. sem. santon. plantag. cc. phil. prap. an. scr. i. Rhab. agar. troch. an. scr. ii. rad. distamm. scr. i. sacch. in aq. gram. dissol. unc. iii. M.

Alia non purgantes. ℞. Pulv. c. c. crud. ebor. an. dr. 6. cor-

Corrallin. dr. ii. sacch. alb. unc. fo. mucilag. tragac. q. s. F. rot. pond. dr. S. dentur N. ni. bis in die.

Aliz. R. Rad. gent. dr. S. agar. albiß. zeduar. tanacet. an scr. i. c. o. uß. mercur. dulc. an dr. S. sacch. in aq. gram. dissol. q. S. M. F. rotul. qua ab infantibus & pueris facile assumantur.

Pulvis anthelminticus. R. Sem. santon. unc. 8. fol. card. b. fl. tanacet. rad. filic. an. dr. s. Vitriol. calcin. scr. ii. M. in mortar. marmor. f. pulv. dentur. scr. iii. decrefcente luna ex hydromelite.

Alius. R. c. c. uß. Rhabarb. corrallin. sem. santon. an. p. aq. M. F. pulv. S. Warmb Pulver / darvon 200 gran oder ein halb Quintl zunehmen.

Alius. R. Myrrh. zeduar. cort. cit. an dr. S. cinab. anisim. scr. i. camph. scr. S. ol. destill. succin. rus. an scr. S. M. F. pulv. dos. scr. i. ex aq. zeduar.

Alius. R. c. c. uß. corrallin. an dr. s. rad. gent. scr. ii. myrrh. scr. S. ol. ejusdem gut. iii. tanacet. gut. 6. sacch. alb. unc. i. M. F. pulv. dos. scr. i.

Unguentum ad vermes. R. Ung. de arthanit. seu contra Verm. unc. 6. elix. prop. p. dr. s. M. Vel R. Ung. contra Verm. august. unc. i. fell. taur. impß. dr. i. ol. dest. absinth. tanacet. an. gut. 6. M.

Cataplasma. R. Farin. lapin. unc. ii. myrrh. alo an. dr. ii. fell. bov. q. s. ol. absinth. unc. ii. M. F. catapl. admo. Vendum Venter.

Aliud. R. Colocynth. dr. 6. tere. & cum fell. bov. ac Vin. mixt. impone umbilic. Vel. R. Fol. persicar. 6. absinth. contus. q. s. adde fell. bov. liquid. q. s. pro Catapl.

Emplastr. vermifugum. R. Pulv. alo. unc. S. colocynth. myrrh. an. dr. s. S. fol. sabin. rut. absinth. tanacet. rad. bryon. an. dr. s. cer. resin. an. unc. ii. ol. rut. unc. i. M. F. maß. Empl. pro umbilico.

§. VI.

*De officio Medici in Prescribendis remediis,
Carminativis eorumque formulis.*

Medicamenta carminativa dicuntur, quæ flatus tollunt, ac discutiunt utilia in affectibus quibus-
cunque a flatuum copia oriundis ut v. g. inflatio-
ne stomachi, lienis, Epatis, tympanitide, colica fla-
tulentia, vertigine, cardialgia &c. Exercent autem
vim suam diversimodè, nonnulla resolvendo & discutien-
do humorem stagnantem & vitiosè rarefactum, hinc
plurima sunt diaphoretica, quæ & carminativa existunt,
& quæ semper tanto excellentiora, quod & resolvant, &
per sudorem vel diaphoresin dispellant. Hæc quoque
calorem debilitatum restituunt, & halitiosa sua virtu-
te undique penetrant, ac vaporositate sua subtili & vo-
lacili exhalationem vaporum crassiorum adjuvant.
Alia id præstant fermentationem, ex qua flatus susci-
tantur, compescendo, acidumque fermentativum ab-
sorbendo, invertendo, & præcipitando, sicquæ Phlo-
goses impediendo, bilem quoque, si una simul rarefa-
cta concurrat, domando & infringendo. Alia id effi-
ciunt vel coctionem & calorem ac menstruum ventricu-
li corruptum roborando, hinc stomachica pleræque
carminativa, vel viam flatibus laxando aut partium,
quibus continentur, poros aperiendo, ut transpirare
possint, vel denique visciditate sua illos captivando,
ligandoque ad se invicem, vel etiam dolores leniendo.

II.

Circa usum & debitam horum, administrationem Me-
dicus Notabit i. carminativa displosiva, seu cali-
diora solventia præsentem calorem præternaturali minus
commo-

Commoda esse, sic v.g. in hypochondriacis, in quibus sæpe viscerum phlogoses concurrunt, ut plurimum temperatiora magis conveniunt. Sic Mercato monente calidiora carminativa in tympanitide non prosunt; ad frigidiora transcendendum esse. Sicuti igitur calidiora non conveniunt in flatibus conjunctis cum æstu & ardore, ita nec temperatiora humoribus crassis, viscidis & pituosis existentibus. 2. Non convenire carminativa, si adsit copia materiæ, si fæces duriores obstructions causentur, hoc enim in passu, nisi prius evacuatio fiat materiæ, & sufficiens depletio, frustra non solum sunt omnia, sed etiam in statum longe peiorem ægrum præcipitant. 3. Carminativis viam sternere non tantum purgantia, sed & imprimis bonam diætam vitando cruditatem, legumina, olera, humidocrementum abundantia, dulcia, pingua, crassa, lenta, fæculenta, fructus horarios &c.

III.

PRÆTEREA. 4. Not. in discutiendis flatibus magis causam, quam effectum respiciendum esse. 5. Pauciores flatus displodendos: Copiosiores educendos esse. 6. In flatibus semper respiciendum esse ad ventriculum. 7. flatus dolorificos maxime obtemperare carminativis, opiatibus seu anodynis & evacuantibus. 8. Clysteres carminativos maxime quoque ulvales esse mixtis emollientibus, quibus & fæces emolliuntur, & flatus simul discutiuntur. 9. Sicuti carminativa interius præstant in forma humida & liquida, ita exterius in forma sicca ut sacculorum &c.

Formulæ.

Remediorum carminativorum.

Mixtura Carminativa. R. aq. ment. unc. iii. nuc. mosch. dr. vi. spirit. vin. vel Elix vit. Matthiol. sp.

P. sal. scr. i. M. S. Binde massellum darauf zu schwingen.

Alia. R. aq. ment. chamom. an. unc. s. physagon. unc. q. spirit. anis. unc. s. Vel huius loco. Esix. Scr. Match. dr. ii. spirit. sal. dr. i. S. sacch. cand. rub. unc. i. M. S. ut supra.

Alia. R. aq. ment. cort. arant. an. unc. i. S. spirit. nit. dule. gut. x. syr. de cort. arant. dr. ii. M. Vel R. aq. zeduar. unc. ii. physagon. unc. iii. sp. mac. dr. i. M.

Aqua carminativa & simul anodyna. R. aq. dest. cinam. physagon. carminat. an. unc. i. S. tinct. cort. arant. dr. i. S. laud. op. Helm. gr. s. ol. dest. mac. gut. ii. M. dentur 3. Coch. urgente dolore.

Alia. R. aq. ment. chamom. zeduar. an. unc. i. essent. castor. dr. iii. spirit. sal. armon. dr. i. s. essent. op. scr. i. syr. de cort. arant. dr. iii. M.

Balsam. carminat. ex Brodio. R. ol. dest. anis. scr. ii. fanie. scr. i. cort. arant. gut. xii. chamom. gut. x. cis. gut. iii. M. ad vit. parsum. dos. gut. 6. vel 6. ex Brod. carn. vel R. ol. dest. mac. dr. i. succin. scr. i. M. Vel R. ol. dest. cort. arant. anis. carn. an. scr. S. M. dos. 6. gut.

Electuar. carminativum. R. Conser. rad. cich. unc. iii. ros. rub. unc. ii. condit. cort. arant. unc. i. citr. unc. s. spec. aromat. ros. dr. ii. diarrhoda ab. dr. i. conf. alk. dr. i. S. sp. cit. vel mac. dr. i. syr. de cort. arant. q. s. M. F. Elect.

Bolus carminativus. R. Theriac. vel misdrith. scr. i. pulv. cort. arant. dr. i. castor. pulv. gr. viii. ol. cort. arant. gut. ii. M.

Tabellæ Carminativæ. R. Cardam. crasse pulv. unc. s. flaved. cort. arant. minutim incis. dr. x. sacch. opt. in aq. ros. & cinam. dissol. unc. viii. M. F. tabell.

Aliz. R. Pulv. cort. arant. recent. spec. aromatis. an. dr. ii. sacch. alb. in aq. fl. arant. sol. unc. s. M. F. tabell.

Pulvis carminativus. R. Cort. flaved. arant. scr. s. mac. scr. S. ol. dest. cit. gut. vi. M. F. pulv. dissol. ad 2. v. aq.

Alius simul præcipitans. R. Cors. flaved. arant. unc.

h. s. maxill. lucis pisc. ocul. canic. an. dr. i. s. tal. lepor. succin. & eduar. an. dr. ii. M. F. pulv. cuius dos. à dr. S. ad dr. i.

Alius simul laxativus. R. Pulv. cort. arant. dr. ii. card. b. scr. ʒ. fol. semn. s. dr. iii. facul. arom. scr. iii. ol. fanie. gut. ʒ. sacch. ros. tabul. ad pondus omnium M. F. pulv. S. Winder Pulver / darvon 2. oder 3. Messer Spitz voll vor dem Essen zunchmen.

Alius R. Pulv. cort. arant. Rhab. et. chryst. tart. an. dr. ij. ol. mac. gutt. x. sacch. ros. tab. ad pond. omn. M. F. pulv.

Eleosaccharum carminativum. R. sacch. alb. unc. ij. ol. nuc. mosch. express. dr. i. ol. dest. chamom. scr. i. fanie. an. scr. S. cort. arant. gut. ij. M. dos. ʒ. ij. cum aq. carminat.

Tragæa carminativa. R. Spec. aromat. ros. dr. ij. cass. lig. acutiss. dr. i. S. cardam. min. scr. ij. sacch. ros. tabul. unc. ʒ. ol. dest. card. fanie. an gut. ix. cinam. gut. ʒ. charyoph. gut. iii. M. F. trag. S. Sonderlich Winder triset.

Alia R. Coriand. prap. dr. ij. sem. anis. fanie. an dr. i. cinam. acut. dr. ij. cort. cit. dr. i. cardam. min. dr. ii. sacch. ros. tab. unc. i. sacch. fin. q. s. M. F. Tragæa.

Sacculus Carminativus extra applicandus. R. Abens in sextag. calefact. ʒ. i. ʒ. i. ac vino lrrorat. q. pl. Vel cum m. miltu. furfur. ʒ. i. Ind. saccul. calidè applicando.

Alius R. fl. sambuc. chamom. aneth. an. ms. mil. m. i. S. sal. m. i. sem. aneth. card. cum m. an. dr. ii. bacc. laur. dr. ii. includ. saccul. Vin. coq. & applic. aut. calefacta ind. saccul. calidè applic.

Fomentum Carminativum. R. Fil. crudi ein una bleichten Stranggaren coq. in lixiv. Vel aq. Vel lact. jaden do simul cum m. unc. S. expressum applicetur calidè.

Placenta Carminativa utilis in dolore colico. R. Vintell. ʒ. N. ʒ. i. agitat. fortiter add. pulv. anis. fanie. cum m. an. dr. i. Vel fol. majoran. vel ment. absins. incis. ol. laur. Vel chamom. q. s. M. F. placent.

Unguent. Carminat. R. Vng. popul. unc. S. ol. laur. dr. ʒ.

dr. vi. ol. caro. scr. iv. M. Vel R. Vng. carminat. minuf.
unt. ii. ol. deß. charyoph. gut. v. mac. gut. iiii. lig. Rhod.
gut. iii. M. S. Windt. Salben zum ſchmierem.

Emplaf. Carminat. R. Empl. de bacc. laur. Gumma
tacamach. an. p. aq. malax. cum ol. chamom. & aneth.
ac extend. ſuper alut. obducta ſindone.

Clyſter carminativus. R. Herb. calam. rut. puleg.
an. mi. fl. chamom ſambuc. ſumit. aneth. an. M. S. ſem.
anis. caro. cumin. aneth. ſeſel. an. dr. ii. bacc. laur. unc.
S. inciſ. & conquaſſ. coq. ex S. q. aq. in Col. unc. x. diſ-
ſolv. Vin. malv. unc. iiii. Elect. de bacc. laur. unc. S. be-
ned. lax. unc. i. ol. rut. aneth. an. unc. i. M.

Alius hypochondriacis plurimum utilis. R. caput
i. caſtrat. ſeu vervec. ſem. cumin. unc. S. coq. in aq. lib.
iii. ad 3. p. conſumpt. add. fl. chamom. melilot. aneth. an.
p. i. coq. ruruſper mediam horam in Col. lib. i. diſſolv.
ſacch. rub. unc. ii. Elect. hier. ſ dr. iii. ol. chamom. cheir.
an. unc. i. 3. ſal. dr. ii. M. F. clyſt.

Alius R. Decoct. carmin. lib. i. diſſolv. elect. dia-
phan. unc. i. ol. cham. laur. an. dr. vi. caro. dr. i. S. Mell.
anthoſ. unc. ii. ſal. comm. pi. M.

Alius ſimulanodynus. R. Laſt. Vaccin. lib. i. S. ſem.
caro. M. S. fl. cham. mi. coq. uſq. ad lib. 3. col. add. mell.
crud. vel anthoſ. unc. i. 3. ol. chamom. aneth. lin. an. unc.
i. ſal. dr. S. M.

S. VII.

De Officio Medici in ordinandis & præſcri-
bendis remediis lithontripticis, eorum
que formulis.

I.

Medicamenta lithontriptica ea dicuntur, quæ ſa-
linis ſuis particulis amurcam tartaream, & coa-
gulum reſolvunt, ac ſabulum exturbant, vel
inci-

incidentibus, rigidisque suis parriculis in calculum continuo impeliendo cum paulatim atterunt, & abradunt, vel appropriatam proportionem cum poris calculi habentia texturem ejus penetrant, quæ proprie dicuntur calculum frangentia seu lithontriptica necessaria in calculis rerum & vesicæ qui ob magnitudinem aut viarum angustiam excludi nequeunt.

II.

Circa usum & naturam, horum remediorum Medici officium erit, Not. i. ea locum magis habere, dum calculus saltem mollior, sabulosus, & tephaceæ magis naturæ, quam siliceæ. 2. Dari talia medicamenta probari ab ipsa experientia subinde facta, licet rara ac paucissima sint, neque omnia in omnibus præstent, cum nimis multæ reperiantur condiciones ad medicamentum calculum dissolvens constituendum nempe, ut locum affectum tangat, ut habeat vim solvendi repagula calculi, sitque nec acidum, nec alcalinum sed compositum ex utroque, prout est calculus, ut longo transitu ad vesicam vi suâ lithontripticâ non infringatur, ut sit amicum naturæ, nec corrosivum, ut sit subtile ac quæqua versum distribui possit. 3. Talia remedia non tantum per os propinari, sed etiam in calculo vesicæ iniici per syringam Catheteri applicatam. 4. Exhibenda hæc esse quotidie manè iniecto prius Clystere Emolliente & refrigerante. 5. Usu horum sequi subinde febrem, calorem, sitim, dolores circa pubem, hinc succurrendum diætâ convenienti, abstinentiâ à vino, Intemperantia frigida, &c. 6. Boni effectus signum esse, si ab eorum usu primis diebus urina prodeat crassa & exigua, hinc copiosior cum remissione caloris, doloris ac excretionis fragmentorum calculi. 7. Interdum unum vel alterum diem quieti concedendum, ac ab usu eorum celandum.

III.

Praeterea sciendum. 7. In defectu remediorum lithontripticorum tentanda esse diuretica selectiora, quae etiam prophylacticè usurpanda, non tamen adeo frequenter, cum saepius malum augeant vel cruditates ad renes detrahendo, vel renes magis intemperatos reddendo, vel pituitam calculum obvoluentem abstergendo, cumque sic exasperando, vel cum maiorem in ureteres cum periculo deturbando. 8. Remedia theribinthinata pro calculi praeservatione ceteris praestantiora esse, cum alvum simul laxent & humores crassos evacuent. 9. Remediorum horum vim & efficaciam adjuvare clysteres, balnea, unguenta, sacculos &c. 10. Si lithontripticis nihil efficiatur, atque aeger in calculo vesicae lithotomiae se subicere nolit, curam palliativam institui debere per sola epicrastica & anodyna ut v. g. clyst. *Ex lacte bub. cum dr. i. phil. rom. ol. amygd. d. per os exhibiturum cum pauco succ. lim. ex brod. decoct. malv. da cam stem. aq. scr. lact. destillatam cum syr. de alth. fernel. Sel Emuls. cum praedicta aq. vel decoct. forest. addit. troch. alk. k. inieci. in vesicam ex lact. vel decoct. malv. vel Emuls. sem. papav. cum aq. solan. semicup. Sel foment. cum magna spong. imbut. decoct. emoll. sequente inunctione cum ung. alth. ros. popul. cum ol. viol. nymph. hyosc.*

Formulae.

Remediorum lithontripticorum.

Decoct. lithontript. Rad. fenic. petrosel. eryng. pim. pinell. ononid. rub. tinct. ennul. an dr. iii. herb. hader. serrell. veron. saxifrag. absinth. matrisylv. an m. 8. fl. genist. pil. gr. juniper. unc. i. cic. rub. unc. i. 8. fruct. alk. kekeng. N. Gu. sem. anis. urtic. fenic. danc. petrosel. aq. frig. mai. an dr. i. incus. co. cauguab. coq. ex f. q. aq. font. in Col. lib. 60. diffusa. mell. puriss. unc. ii. abull. semul. acq. utrum

iterum et cum album. ob. clarif. S. Prieß und Sande
treibendes Trank / darvon 3. mahl den Tag 4. Un-
gen zunehmen.

Julepus antinephriticus. R. Decott. pradis. Gel ad
calcutum forest. lib. i. syr. de alth fernel aceros. cin an un-
i. spirit. sal. dr. s. M. S. Sande Julep auff 2. oder 3.
mahl.

Alius utilis in Paroxysmo calculoso. R. aq. frag.
saxifrag. an unc. ij. Vin alb generos. unc. vi. ol. amygd. d.
unc. ij. spirit. Citriol. dr. i. M. pro 3. dos. prima detur cali-
de, quantum ferre potest ager, post horas 6. secunda et
hac etiam inefficax, quod teste Riverio raro contingit, de-
sur tertia.

Elixir antinephriticum. R. Sal. tart. albf. unc. i.
fol. in aq. petrosel. lb. i. diger. cum cort. cit. arant. an
unc. s. per 3 dies filtretur per chart. add. ol. de still. cort. arant.
mac. an gut. viii. M. diger. iterum per aliquot dies. S.
Elixier wider den Stein / darvon ein halben Löffel voll
 Morgens und Abends auß einen Rosel Wein zu
nehmen.

Nodulus vino vel cerevisia infundendus. R. Bacc.
Juniper. contus unc. i. fruct. cynosbat. sicc. et crasse pulv.
unc. ij. fol. heder. terrest. Geron. pariet an mi. absinth. M. S.
rad. eryng. ononid. an dr. vi. lig. nephrit. unc. s. et pass. enu-
cleat. unc. iij. M. incis. et contus. ad nodul infund. in Vin.
Vel cerevis. lib. viii.

Infusum Diureticum R. Raph. acerrimi draf. unc.
ij. Vin. alb. unc. ij. macerentur per aliquot horas. hinc for-
siter exprim. et Col. Valerian rad. armorac. Vin infusa
aliquoties hausta

Aliud Præservativum. R. Heder. terrest. mi caput, al-
bi N. ij. Vel iij. discerpis in frustula affund. sp. Vin. lib. i.
Semper dies aliquot bene clausa, hinc de agitato liquore
detur cochl. i. singulis noviluniis.

Emulsio antinephritica. R. Sem. a. frigid. mai. an
dr. ij. Sialar. dr. i. s. nucel. persic. dr. vi. decott. hord. cum
sem. danc. fact. unc. unc. vi. aq. petrosel. liq. berula de still.

an. unc. i. f. Emul. add. lapid. canc. præp. dr. i. sacch. cand. q. s. ad gratiam.

Brodium lithontripticum. R. Cic. rub. cochl. i. rad. petrosel. unc. S. coq. cum s. q. aq. vel Brod. Carn. col. unc. v. add. succ. lim. unc. i. sang. hirc. præp. scr. ii. myrrh. el. scr. i. Vel R. Iur. cic. rub. unc. x. Spirit. Iuniper. scr. ii. asell. præpar a scr i ad. dr. i M.

Bolus Nephriticus. R. Therieb. venet. coct. & pulv. dr. i. ocul. canc. præp. scr. i. tart. vitriol. scr. S. sal. vol. succin. gr. iv. syr. de alth. fernel. q. s. M. F. Pol. sumatur mane superbibendo liquorem aliquem diureticum.

Electuar lithontripticum. R. Sem. urtic. Milii sol. Bardan. an. dr. S. lap. Iudaic præp. magist. ocul. canc. chrystall. mont. an. scr. i. farin. lycopod. virg. aur sem. dauc. pulv. an. scr. ii. conf. ering. unc. i. S. cass. unc. i. cum s. q. syr. de limon. f. Elect. S. latwergen wider den Stein alle Morgens einer Kösten groß darvon zu nehmen.

Aliud Præservativum. R. Pulv. sem. hyperic. Julio vel autumno collect. & ex sic. unc. i. S. conf. ros. vel viol. lib. i. M. dos. unc. s. quali betseptimana 2. vicibus.

Pilulæ antinephriticæ. R. Ocul. canc. præp. dr. i. farin. semin. lycopod. scr. i. sal. fin. columb. gr. xii. volat. succin. gr. xv. therieb. cyp. aq. malv. lot. & coct. q. s. M. F. Pilul.

Pulvis Nephrocatharticus. R. Lap. lync. præp. Iudaic. præp. an. dr. i. s. ocul. canc. præp. dr. iii. sal. Iuniper. dr. i. asell. præp. dr. s. sem. lithosperm. dr. i. s. ol. succin. rectif. gut. iv. sacch. alb. unc. i. s. M. F. pulv. S. Griech. und Sandt Pulver 1. Quintils schwer auff einmahl einzunehmen.

Alius R. Magist. Chryst. mont. sem. mil. sol. lapp. mai. an. scr. s. Borac. urret. glaciæ Mariæ, pulv. priap. cerv. an. gr. v. M. F. Pulv. pro i. dos.

Clyster Vusualis in Parexysmo Nephritico. R. Fad. alth. dr. ii. malv. melitar. pariet. l. ord. an. vi. sem. lin. sang. an. dr. iii. fanie. dr. i. incisa bull. in s. q. aq. ad

consumpti 3. part. in Col. lib. i. dissolv. sacch. rub. unc. ii. thereb. clar. vitell. ov. dissol. dr. iii. vel. unc. s. ol. viol. chamom. an. unc. i. cum paucis sale M. F. Clyst. vel dissolv. cass. proclyst. elect. lenit. an. unc. s. vel diacathol. dr. vi. hier s. bened. laxat. an dr. ii. M.

Alius Spec. decoct. carmin. fl. verbasq. an. mii. pariet. m. ii. coq. in s. q. brod carn. in col. lib. i. dissolv. cass. proclyst. unc. i. thereb. vitell. ov. dissol. unc. s. sacch. rub. ol. chamom. an. unc. i. s. M. F. clyst.

Alius lacteus anodynus. R. Lact. vaccin. rec. mult. lib. i. sacch. rub. unc. ii. ol. chamom. unc. i. scorp. dr. ii. ung. rub. potab. unc. i. vitell. ov. N. i. M.

Alius ex solo oleo. R. Ol. aneth. chamom. an lib s. amygd. d. unc. ii. rutac. unc. i. vel R. Butyr. rec. ol. amygd. d. an unc. iv. calefiant & loco clyst. infundantur.

Vuguentum. R. Vng. de alth. unc. s. ol. amygd. d. dr. ii. scorp. dr. i. s. petrol. alb. dr. i. M. vel R. Vng. popul. vel infrig. Gal. ros. mes. de alth. an dr. vi. ol. scorp. simpl. succ. lim. an. unc. s. camph. gr. iv. M. S. Tendent Galbl.

Cataplasma R. Fol. malv. Pariet. an. mii. petrosel. cum rad. mi. raph. dr. ii. coq. in aq. vel lact. ad putrilag. & contund. adde cep. sub. cin. coct. N. ii. ol. amygd. am. lil. alb. butyr. rec. an. unc. ii. vel vitell. ov. N. ii. ol. scorp. unc. i. ung. de alth. unc. i. s. M.

Sacculi anodyn. R. Herb. malv. alth. pariet. saxifrag. fl. chamom. melil. aneth. an. m. iv. rad. alth. unc. iv. herb. charefol m. ii. sem. lin. fanugrac. an. mi. anis. dr. ii. M. incis. dentur ad Chart. pre 2. saccul. in aqua vel lactecoq. & alternatim applicandis.

Balnea vide supra de usu therm. & Balneorum atque hæc ex infinitis hac de materia conceptis remediorum Formulis pro praxi sufficiunt, uti & illa, quæ supra de diureticis insinuavimus. Sicuti enim illa & huc quoque spectant ita etiam pleraque horum ad illa reduci possunt.

CAPUT IX.

DE

Officio Medici in considerandis & præscribendis appropriatis & Confortantibus.

§. I.

De Officio Medici in ordinandis & præscri- bendis remediis Cephalicis.

I.



Medicamenta *Cephalica* dicuntur ,
quæ cerebro magis amica , ejusque af-
fectibus tollendis magis destinata sunt ,
hinc etiam pro varietate affectuum va-
ria sortiuntur nomina , ut *antiapoplectica*
quæ contra apoplexiam , *antiepileptica* , quæ contra epi-
lepsiam , *antispasmodica* , quæ contra motus convulsivos ,
antidynica , quæ contra vertiginem , *antilethar-
gica* , quæ contra lethargum *antiepileptica* quæ contra in-
cubum specifica & appropriata existunt , idem dicendum
de *antiparalyticis* , *antimelancholicis* , *anticatarrhalibus*
& similibus , agunt hæc medicamenta vel respiciendo
membranas & nervos , quorum irritationem , tensio-
nem ac vellicationem demulcent , acrimoniam causæ
absorbent , eamque discutunt , vel respiciendo humo-
res & imprimis lympham , quam temperant , corrigunt ,
excedentem absumunt , vel deficientem restaurant , vel
respiciendo spiritus , quos sopitos & deficientes excitant ,
restaurant , æstuantes & effratos ligant & compescunt ,
vel

vel respiciendo vapores & poros cerebri, dum illos dis-
cutiunt: hos vel nimis occlusos & obstructos aperiunt
præsertim volatilia & inprimis urinosa, vel nimis hian-
tes & dilatatos claudunt.

II.

Inusu horum Not. i. Medicamenta cephalica alia esse
volatilia & quidem vel sulphure oleoso aromatico sua-
vi pollentia, vel volatilia urinosa aut acida, alia fixa
& quidem vel terrea, vel acida, vel nitrosa: alia ex his
mixta. 2. Nimiscalida, oleosa, spirituosâ ac vaporo-
sa spiritus subinde nimis efferare, turbare ac caput feri-
re præsertim in iis, quibus systema cerebri & nervorum
sensibilius, spirituumque textura tenerior. 3. Ex his
camphorata præcipue iis nocere, quibus caput debile,
& spiritus tenerioris ac laxioris compagis. 4. Cepha-
lica hæc magis convenire & principaliter capite per se &
essentialiter affecto: minus & non nisi restrictè, &
secundario, ubi per consensum. 5. Lympham in ca-
pite nec nimis absumendam, nec nimis fundendam vel
concentrandam esse per cephalica. 6. Sicuti vitanda
spiritus nimis efferos reddentia, ita eos non nimium
ligandos esse per opiata incautius & frequentius data
præsertim in Infantibus. 7. Cephalica etiâ nervis
amica esse, ac symbolizare quoque cum stomachicis &
uterinis.

Formula.

Selectiores Remediorum cephalicorum.

Vlep. antepilepticus. R. æq. ceras nig. unc. 9. Epilepti-
tang. unc. 1. syr. fl. paon unc. 1, conf. alk. compl. dr. 5. Sp.
Spirsol. q. s. pro rata aceditate M. S. Notes vergichte
wasserlein Lösl voll weiß zugebrauchen. Suavis &
utilis est præsertim in infantibus.

Mixtura antapoplectica. R. Elix Vit. Mathiol. unc.
4. 3.

i. S. *sp. ceras nig. unc. iii. aq. cinam. unc. ii. essent. ro-
rism. dr. ii. man. Christ. perlat. unc. S. M. Vel. R. elix.
vit. Matthiol. unc. vi. sp. ceras nig. dr. vi. Iulp. ros. unc.
i. s. essent. amb. dr. iii. M. S.* Elixier wider den Schlag
darvon ein löß voll sowol zu Verhütung / als auch in
dem Paroxysmo einzunehmen.

*Alia. R. Aq. ceras. nig. meliss. lil. convall. an unc.
i. s. apoplect. dr. vi. cinam. dr. ii. elix. vit. Matthiol. dr.
i. s. conf. alk. dr. i. s. magist. corall. perlar an scr. i. man.
Christ. perl. dr. ii. M. S.* Schlag Mixtur darvon auff-
gerietter 1. oder 2. löß. voll zur Zeiten einzugeben.

*Aqua cephalica confortativa. R. Aq. apoplect. per-
lat. officinal. an unc. ii. cinam. bugl. dr. iii. marg. orient.
prep. corall. rub. prep. an scr. i. confect. alk. complet. dr.
s. sp. lil. convall. ceras nig. an dr. ii. cephal. anhalt. dr. i.
sacch. perlat. dr. ii. M. S.* Haupt- und Herz-Stärcken
des Wasser.

*Vinum anti Cattarrhale. R. Lign. sasaph. Juniper:
lentisc. an unc. ii. rad. charyophyllat. unc. i. herb. rorism.
rec. hyssop. cent. min. an mi serpill m. S. cinam. dr. ii. cu-
beb. cardam. an. dr. i. Incisis affund. vin. opt. mens. iv.
stent in infus. de hoc vino bibatur haustus in principio pa-
stus.*

*Emulsio antepileptica. R. Sem. Peon. dr. ii. c. c.
ust. prep. scr. iv. aq. ceras. nig. lil. convall. an unc. ii.
Borrag. unc. i. S. M. F. Emuls. add. lap bez. orient. gr. vi.
sacch. cand. alb. unc. S. M. possit etiam addi pulv. March.
antepilept.*

*Electuar anti Cattarrhale. R. Cons. fl. anth. unc.
iii. ros. rub. unc. i. nuc. indic. condit. dr. vi. medull. nuc.
ind. condit. dr. ii. cubet. dr. ii s. coriand. prep. dr. i. S.
thur. olib. scr. ii. essent. salv. dr. ii s. r. de ros. succ. q. s.
M. F. Elect. de quo v. sub horam decubitus magnitudo
nuc. Jugl. sumenda.*

*Electuar. confortans cephalicum. R. Conserv. ros.
damasc. fl. anth. salv. primul. ver. an. unc. i. s. cort. cit.
condit.*

condit. & incis. dr. x. calam. arom. condit. & incis. vel
 22. dr. vi. charyoph. incis. spec. arom. ros. an. dr. iii. syr.
 de cort. cit. q. s. M. F. Elect. S. Haupt stärckende Lat-
 mergen darvon Morgens vnd Abends einer Rosten groß
 zunehmen.

Electuarium antepilepticum. R. Conf. fl. Paon. un.
 i. nuc. mosch. condit. unc. ii. cort. cit. condit. unc. s. spec.
 aromat. ros. dr. i. s. syr. fl. Paon. q. s. M. F. Elect. Vel
 quod pretiosius. R. Pulv. epilept. unc. s. medull. nuc.
 ind. condit. dr. vi. conf. alk. de hyac. an dr. ii. tinct. lun.
 dr. ii. sp. til. lil. conuall. ros an scr. i. essent. amb. dr. ii.
 syr. de Paon. q. s. M.

Electuarium contra vertiginem. R. Conf ros. rub.
 unc. ii. ma. oran. bcton. an unc. s. nut. ind. condit. dr. ii.
 confect. alk. compl. dr. i. s. spec. diamb. contra apoplex an
 dr. s. specific. cephal. scr. i. vel succin. prap. syr. de cort. cit.
 vel de stachad q. s. M. F. Elect. S. Latmergen vor den
 Schwindl Morgens vnd Abends einer Nuß groß dar-
 von zunehmen.

Electuar. anti melancholicum. R. Conserv fl. anth.
 Borrag. nymph. bugloss. an unc. s. myrob. condit. dr. vi.
 conf alk. scr. iv. spec. latif. Rhas. de gemmis frig. an. dr.
 i. Elix. vit. Matth. dr. i. syr. corall. q. s. Vel quod pre-
 tiosius R. Confect. de hyac. unc. i. alkerm. dr. iii. lap.
 bez. scr. i. smaragd prap. scr. ii. ung. alc. s. igne prap. dr.
 i. magist. succin. alb. perlar. corall. rub. prap. an. scr. i.
 sp. ros rub. idalil. conuall. an gut. xiii. syr. fl. Paon q. s.
 M. F. Elect.

Morsuli cephalici. R. Spec. diamb. diamosch. d. an
 dr. ii. cubeb. dr. ii. cardam. dr. i. nuc. ind. condit. unc. i.
 cort. arant. condit. dr. vi. medull. nuc. ind. condit. dr. ii.
 macer. dr. i. sacch. albiss. in aq. la vend. solut. q. s. M. F.
 morsul. ol. destill. nuc. mosch. aspergendi. S. Haupt stär-
 ckende Morsellen / darvon nach belieben zu gebrauchen.

Tabellæ antapoplecticæ. R. Spec. diamb. dr. ii.
 pulv. rad. Paon. mar. zeduar. an. dr. i. s. marg. prap.
 dr. i.

dr. i. ol. succin. puriss. dr. s. sacch. albiss. in aq. Paon. sol.
 & ad tabulat. cost. unc. vi. M. F. tabell. pond. dr s.

Morselli pro confortanda Memoria. R. Confect. alk.
 dr. s. s. thur. opt. dr. ii. smaragd. prap. dr. i. marg. prap.
 dr. s. ol. nuc. mosch. express. scr. ij. s. cinam. gut. iii. lig. Rhod.
 gut. ii. amb. mosch. an. gr. i. & sacch. in aq. ros. dissol. q. s.
 f. confect. in morsell. s. **Gedächtniß stärckende Mor-**
sellen Morgens nüchtern zunehmen.

Alii. R. Spec. diamb. diamosch. dulc. an scr. ii. suc-
 cin. alb. prap. scr. s. confect. alk. compl. scr. i. ol. carv. scr. s.
 ol. succin. gut. & sacch. albiss. in aq. lavend. sol. q. s. M. Vel
 Sequentes Horstii R. Confect. anacard. dr. i. thur. ol.
 dr. ii. piper. z. z. an dr. s. sacch. in aq. major. sol. lib. i. add. ol.
 cinam. gut. & rorisim. gut. i. & M. F. tabell. de quibus dr.
 ii. dentur matutino tempore.

Rotulæ gratissimæ cephalicæ. R. Spec. diamb. dr.
 ii. confect. alk. compl. scr. ii. amb. gris. gr. & sacch. albiss.
 in aq. nuc. mosch. & ros. & cinam. dissol. q. s. M. F. ro-
 tul. alii addunt etiam succ. lim. q. s. S. **Haupt stärck-**
de Zeltlein.

Aliæ contra vertiginem. R. Ol. destill. carv. scr. s.
 nuciss. destill. gut. vii. confect. alk. rad. doron. pulv. an. dr.
 s. extr. lig. aloes gr. x. & sacch. in aq. sal. & beton. dissol.
 q. s. M. F. rotul. quibus ad finem addi potest mosch. ad. scr.
 s. amb. gr. iii. M.

Aliæ antapoplecticæ. R. Spec. diamb. complet. dia-
 mosch. an dr. i. succin. albiss. scr. i. ol. anis. gut. iii. sacch.
 in aq. lavend. sol. unc. i. & M. F. rot.

Pulvis Cephalicus corroborans. Fabri R. Confect.
 diamb. unc. ii. diamosch. dulc. unc. i. cubeb. mac. doron.
 cost. & ver. cass. lignea succin. alb. prap. lig. aloes an scr. i. amb.
 gris. scr. s. mosch. gr. & ol. destill. cinam. scr. i. fol. aur. N.
 & sacch. seu manus Christi. tabul. ad pondus omnium M. F.
 pulv. s. **Haupt stärckendes Pulver / darvon ein gutes**
Messer Spitz voll Morgens und Abends langsam
in den Wundt zergehen zulassen.

Pulvis

Pulvis antapoplecticus. R. Cinnab. nat. cinnab. antim. spec. contra apoplex. complet. an. unc. s. M. F. pulv. de quo m. & v. fumatur scr. i. ex aq. ceras. nig.

Alius R. Succin. alb. pulv. dr. ii. spec. diamb. dr. i. sem. carv. dr. s. M. F. pulv. subtiliss. de quo fumatur cuspid. singulis mensibus primo die post novilunium.

Pulvis antepilepticus. R. Pulv. de gusset. Vel march. epilept. dr. i. cinnab. antim. gr. xxv (subinde etiam lapid. bez. unicorn. an scr. s.) M. F. pulv. divid. in 3. p. aq. s. **Vergiecht Pulver auff 3 mahl.**

Alius. R. Pulv. march. mirab. epilept. mins. an scr. ii. cinnab. nat. prap. cinnab. antim. an scr. i. magist. cran. hum. magist. unguil. alc. an scr. s. M. F. pulv. dos. m. & v. cuspid. culcell. ex seq. aq. R. Aq. ceras. nig fl. til. Paon. an unc. i. Epil. lang. unc. s. syr fl. Paon. unc. s.

Tragæa specifica in vertigine. R. Fl. euphras dr. iii. mac. dr. i. corall. rub. prap. dr. i. succin. alb. prap. gr. xv. sacch. ros. tabul. unc. iv. ol. destill. carv. fanic. nuc. mosch. an gut. vii. M. F. trag.

Alia. R. Spec. diamosch. d. dr. ii. diamb. dr. s. mac. pulv. rad. doron. an. scr. iv. sacch. fin. unc. iii. M. F. trag. cui add. amb. gr. xv. Vel R. Sem. carv. prap. coriand. prap. anis. fan. an unc. s. cardam. cubeb. an dr. i. s. nuc. mosch. dr. i. mac. scr. s. charyoph. scr. s. sacch. q. s. M. F. trag.

Tragæa confortans cephalica. R. Spec. diamb. complet. diamosch. d. an dr. s. diaxyloalo. scr. i. cinam. opt. dr. ii. succin. alb. prap. marg. prap. an scr. i. nuc. mosch. dr. i. mac. cubeb. cardam. Charyoph. an scr. s. sacch. albis. unc. ii. fol. aur. N. ii. M.

Cucupha in Catarrhis. R. Fol. meliss. majoran. orig. anp. s. fl. ros. rub. dr. ij. lavend. stach. arab. rorism. Paon. tunic. an. dr. s. thur. nuc. mosch. cinam. Charyoph. gr. kerm. Vel succin. alb. prap. an dr. s. Gum. Elem. benz. an. dr. i. storac. calam. dr. ii. grosso modo trita includ. sind. rub. frequentique filo interb. sata in formam cucupha redigantur.

Alia in vertigine & incubo. R. Herb. rorism. major. salu. an pi. fl. ros. anth. Peon. chamom. an pi. storac. calam. mast. succin. an. dr. s. sem. coriand. prap. scr. ii. cubeb. charyoph. an. dr. s. nuc. mosch. dr. i. rad. Ir. flor. spec. diamb. an. scr. i. M. crassiusculé incid. & conquass. ac cura sind. rub. f. cucuph.

Alia spiritus animales confortans. R. Herb. major. rorismar. beton. meliss. puleg. an. M. S. fl. ros. rub. lavend. anth. an. pi. thur. mast. rad. Ir. flor. cort. cit. sandaracha. an. scr. i. charyoph. mac. cubeb. cardam. an. scr. s. spec. diamb. complet. dr. i. s. sem. coriand. nigell. an. dr. s. succin. cit. scr. i. s. mosch. gr. vii. amb. gr. iii. M. S. species pro cucuph.

Pulvis Trinalis. R. rad. cyper. long. calam. arom. ros. rub. an. dr. vi. benz. unc. s. xyloal. dr. iii. corall. rub. succin. an. dr. ii. farin. fab. unc. ii. rad. Ir. flor. unc. iv. M. F. pulv. subtil. add. mosch. zibeth. an. gr. v. M. S. Besonderes Haar Poudre das Haut vnd die Bedächtniß zu stärken: auch das Haar wachsen zumachen.

Odorament. in affectibus soporosis. R. Sp. sal. armon. urinos. velc. c. dr. i. s. indatur vitro angusti orificii. S. Besonder Geist zum riechen.

Odoramentum spiritus animales excitans. R. Aq. meliss. lil. convall. an. unc. i. apoplect. cum amb. & mosch. unc. s. acet. rutac. dr. i. M. S. anstreich Wasser an die Schläff vnd Nasen. Vel R. Aq. ros. in B. M. destill. unc. i. lavend. cinam. an. dr. vi. Elix. vit. Mat. thiol. dr. ii. acet. fl. tun. unc. i. ros. dr. vi. sp. ros. dr. i. M.

Nodulus & aqua odorifera. R. Fol. meliss. pi. cinam. mac. galang. charyoph. an. scr. S. M. incisa includ. 2. no. tul. ex sind. alb. in aqua sequenti modo faciendis. R. aq. ros. fragrant. unc. ii. odorif. fuschii unc. i. spirit. cephal. anhalt. compl. dr. s. acet. ros. rub. id. an. unc. ii. 2. sch. gr. ii. M.

Balsamus Cephalicus. R. Ol. nuc. mosch. express. scr. iv.

scr. iv. Bals. apoplect. scr. i. ol. rut. scr. s. succin gut. vii.
M. S. Hauptstärkender Balsam.

Alius antepilept. & contra vertiginem. R. Bals. rut.
scr. i. mac. charyoph. ros. an scr. s. ol. dest. succin. gut. v.
charyoph. gut. iii. M.

Alius antapoplecticus. R. Bals. apoplect succin. ma-
joran. nucist. an. scr. s. ping. castor. gr. i. M. S. Ver-
mishter Schaa-Balsam an die Nasen Schläf und
Wirbel des Hauptes zu streichen.

Alius memoriam confortans. R. Bals. apopl. scr. i.
majoran. succin. an. gr. v. ping. castor. gr. ii. ol. succin.
gut. ii. M.

Pediluvium anti Cattharrhale. R. Herb. absinth.
orig. arthemis. serpill. salu. fl. chamom. ros. rub. an. mi.
ciner. sal. an. mi. M. F. decoct. in aq. s. q. vel in lixiv.
excin. lig. juniper. Parat.

Aliud. R. Herb. salu. hyssop. orig. thym. beton. ma-
jor. an. mi. fl. cham. mi. s. stach. sumith. aneth. an mi.
Bacc. juniper. uno. ii. sal. unc. iii. incid. grosso modo pro
Pediluvio, à cujus abstersione plantapedum inungantur
calidissime medulla cervina.

Aliud simplex in dolore capitis. R. Aq. dulc. mens.
viii. sal. comm. m. ii. salu. hort. miii. acet. lib. ii. coq.
invicem pro pediluv.

§. II.

*De officia Medici in considerandis & præ-
scribendis remediis ophthalmicis.*

I,

Medicamenta Ophthalmica dicuntur, quæ oculis
amica affectibus eorum succurrunt, & quidem
dem vel eos roborando ac visum acuendo dum

R 4

con-

conjunctim spiritus, humores, nervos & caput respiciunt, atque hæc dicuntur *oxydoreica* ac proptiè *ophthalmica*, suntque cephalica ferè, nervina ac Balsamica utilia in amautosi, visûs imbecillitate, & caligine, vel exsiccando & detergendo in Cataracta, ungue, excrefcentiis &c. Vel demulcendo ac dolorem mitigando in doloribus oculorum, vel vi traumaticâ eis subveniendo in vulneribus, vel humores influentes repellendo ut in ophthalmia incipiente, vel consistentes sibi seu halitus & vapores, seu humores in coagulum abituros discutiendo, ut in saggillatione, ophthalmia. &c.

II.

Circa usum horum haud immeritò cautelæ quædam observandæ nam juxta vulgarem Paræmiam.

Non patitur lusu summa fides, oculus.

Not. igitur. 1. in oculorum affectibus non solum locum, sed & focus spectandum esse, nam licet locus sit oculus, focus tamen sæpissimè tum caput tum hypochondria, tum tota M. S. acris, serosa & scorburica. 2. Repellentia non debere esse nimis frigida adeo quidem ut repellant, sed non impellant, ac impingant, atque etiam locum magis habere capite evacuato præferim in ophthalmiis gravioribus. 3. Suppurationem præsertim interiorem oculis funestam esse & sic arcendam frigidiusculis, discutientibus, v. s. & vesicatoriis, hinc etiam emollientia, emplastica ac anodyna oculis inflammatis magis nocent, quam prosunt. 4. opiata caprè quoque in doloribus ac inflammationibus oculorum usurpanda esse, utpote quæ magis ob acrimoriam moritant, quàm dolorem leniunt. Idem ferè dicendum de lacte muliebri quod etiam tum ob unctuositatem suam, tum ob facilem acescentiam suspectum est in doloribus oculorum, saltem illud non diu ibidem relinquendum, sed singulis horis mutandum.

III.

III.

Praterea, 5. Notabit, acriuscula in tempore applicata optima esse ophthalmica. Observavit enim *Plater*. Cuidam ex casu mercurium sublimatum loco sacchari inspersum fuisse sine noxa. *VVedel*. idem observavit de spirit. vitriol. ut adeo oculus acriora ferat medicamenta. Interim non promiscuè inferenda oculis aciora, cum morficatis fibris, & citato affluxu inflammatio augeri possit. 6. In affectibus oculorum vitanda esse sternutatoria caput concutientia & lachrimas ex oculis cientia. 7. Remedia ophthalmica debere esse a sordibus optimè purgata, diligentissimè insuper erita & cribrata. 8. Topica in suffusione & gutta serena plus promittere, quàm præstare: interim tamen aliqua tentari posse. 9. Topica in ophthalmia debere vergere ad frigiditatem, si repellendum; Ad caliditatem, si discutiendum. 10. Topica adstringentia temporibus pro influxu intercipiendo applicanda esse.

Formulæ.

Remediorum oxydorcicorum & ophthalmicorū.

Vinum Euphragiatum. *R.* Rad. cunul. unc. iij. fol. & fl. euphras. m. iiii. sem. fanic. filer. mont. an. unc. ii. m. clusa nodule suspend. in musto, donec efferbuerit.

Electuar. ophthalmicum longo ulu probatissimum *Timæi*. *R.* Succ. euphras. unc. ii. fanic. unc. i. chelidon. rut. lavend. ros. pallid an. unc. s mell. Virg. probè despum. unc. ix. coq ad consist. Syrup add pulv. euphras. rec siccet. unc. i. sem. fanic. dr. ii s. filer mont. dr. ii. mac. cubeb. cinnam. an. scr. i s charyoph dr. s. *M. F.* Elect. **S. Latwera** gen das Gesicht zu stärken vnd zu erhalten / darvon einer Kösten groß Morgens vnd Abends zunehmen.

Aliud. *R.* Conf. fl beton, anth. an. unc. ii. myrob. cam. dis. N ii. ther. vet. dr. ii. cubeb. dr. ii. sem. fil. mont. scr. ij. succin. alb. prap scr. i. mac. scr. ii. spirit. euphras. dr. ii. Essent. rorisma. dr. i. cum syr. destach. s. q. *M. F.* Elect.

R s

Pulvis

Pulvis oxydorcicus. Rl. Sacch. cand. alb. canariens. confect. sem. fanic. an. unc. i. pulv. fl. euphras. dr. ii. sem. fanic. dr. iii. rad. Galerian. dr. vi. ol. destill. fanic. gut. xi. major. gut. lv. M. F. pulv. s. **Augen und Gesicht stärkendes Pulver.**

Alius. Rl. Rad. Paon. unc. s. Galerian. dr. iii. sem. Paon. dr. ii. fanic. dr. i. sal. euphras. dr. i. s. c. c. phil. prap. ungul. alc. prap. an. dr. i. tart. chalyb. dr. ii. anism. diaph. dr. i. s. cinnab. nat. dr. i. chryst. prap. dr. iii. man. Christ. perlat. unc. i. s. M. F. pulv.

Tragæa visum corroborans. Rl. Fol. Euphras. cum fl. una, s. sem. corian. acet. prap. dr. ii. fanic. dr. i. s. carv. scr. ij. s. cinam. acut. dr. i. nuc. mosch. scr. lv. pellicul. intern. Ventric. Gallin. scr. ij. rotul. man. Christ. unc. ii. s. ol. fenic. gut. xi. carv. gut. vii. nuc. mosch. gut. v. M.

Alia. Rl. Sem. coriand. prap. rapar. anis. fanic. an. dr. ij. pulv. euphras. filer. mont. charyoph. cardam. min. cubeb. cinam. an. dr. i. nuc. mosch. dr. ii. sacch. rosat. tabul. ad pondus omnium M. F. **Tragæa.**

Sal utualis oxydorcicus. Rl. Sal. comm. unc. ii. Euphras. sicc. dr. ij. nuc. mosch. dr. i. cinam. scr. ij. M. S. **Besonders Gesicht stärkendes Salz die Speisen darmit zusalzen**

Fomentum ophtalmicum Plempii utile in gutta serena & suffusione. Rl. Fanic. rut. Hyssop. euphras. chelid. Verben. beton. puleg. an. M. S. sem. anis. fanic. carv. ameos. filer. mont. an. dr. ij. euphras. unc. s. mac. cinam. charyoph. nuc. mosch. an. dr. i. incis. & conquaß. coq. ex s. q. aq. Vel si fortius agendum in Vino addito postmodum etiam sp. Vin. applicetur cum petiis duplicatis quoties die ter vel quater.

Aq. ophtalmica quercetan. Visum clarificans ac utilis in suffusione incipienti. Rl. Croc. metall. dr. i. aq. chelidon. m. unc. vi. infund. hujus aq. tepida 3. Vel 4. gutta homine resupino laeente intra oculos in funduntur ter vel quater de die, & quidem per multos dies.

Alia. Rl. Aq. fanic. chelid. m. euphrag. an. unc. i. Vi. triol. alb. scr. s. aloes scr. v. M. F. collyr.

Colly-

Collyrium antiophthalmicum expertum. *℞. Albumi*
of. N. s. agitetur cum frusto aluminis in Patina stannea
ad consistent. unguent. quod extend. super linteam & tepi-
dè oculis applicetur.

Aliud in forma aquæ expertissimum. *℞. Aq. ros.*
plantag. an. unc. ij. solan. unc. s. Vitriol. alb. scr. s. dissolv.
& colat. add. tut. prap. scr. i. alii etiam addunt flor. Zink.
scr. s. Vel sacch. sat. campb. &c. S. Augeni Basserlein.

Aliud. *℞. Aq. ros. alb. fanic. euphras. an. unc. ii. ℥.*
Sin. rectif. dr. s. sacch. alb. tut. prap. dr. an dr. i. M. S. ut
supra.

Collyrium aliud antiophthalmicum. *℞. Oſ. Gallin.*
adduritiem coct. & demptâ testâ & Vitello castati inde sacch.
sat gr. Si. campb. gr. ij. Vitriol. alb. gr. iij. mell. ros. unc. s.
postquam paulisper ita mixta steterint, forisiter exprim. & si
liquor nimis crassus, add. aq. ros. q. s. Alii castatema
replent. Vitriol. alb. hinc suspendunt ovum in cella, ut li-
quor in aquam ros. oppositam destuat. hunc exprim. & Ca-
lat. gutta aliquot in oculos infunduntur, linteoque madi-
do teguntur.

Collyrium in forma linimenti. *℞. Butyr. recentiss.*
q. pl. lapis calaminaris in alcool redact. q. s. ut fiat ung.
Vel ℞. Butyr. rec. q. aq. ros. lot. unc. s. tut. prap. dr. i.
campb. dr. s. Vel ℞. Axunz. porc. absque sale Sino lot.
unc. i. campb. scr. s. his mixtis add. sacch. satur. scr. i. tut.
dr. s. ocul. canc. prap. corall. rub. prap. marg. pra. an gr.
xv. M. de his ung. tempore somni magnitudo lentis immitt-
itur, cantho majori & palpebra inungantur.

Cataplasma anodynum expertum in doloribus ocu-
lorum & præsertim in contus. & vulneribus. *℞. Pom.*
dulc. N. iij. coq. ex aq. ros. & plantag. s. q. ad mollit. trahic.
per crib. pulpa add. sacch. albiß. dr. ss. campb. gr. xi. croc.
gr. v. M. F. Catapl. applicandum tepidè ac sapius Iteran-
dum.

Collyrium in vulneribus. *℞. Aq. ros. fanic. euphras.*
an unc. i. tut. dr. i. campb. gr. iij. siess. alb. s. op. & el. sacch
sat. scr. i. sacch. cand. alb. dr. i. M.

Colly-

Collyrium pro maculis & nebulis, detergendis. *℞.*
Croc. metall subtiliss pulv. dr. i. & triol. alb. scr. s. aq. ros.
rub. unc. s. flor. cichor. per deliq. unc. iii. macerentur sepe-
de per hora 6. filis.

Aliud *℞.* *tut. prap. dr. s. marg. prap. scr. s. camph. di-*
trisol. alb. angr. is. sacch. cand. alb. dr. s. M. F pulv. sub-
tiliss. m. & oculo pisi magnitudine inspergendus. Hoc
absoluto. ℞. Pingued. Thymal. pisc. Aschen. Schmalz
scr. ij. fel. lucii pisc. scr. s. M. F. mixt. m. & o. lentis quan-
titate oculis cantho majori indenda.

Aqua expert. Timæi in epiphora. *℞. Tormentill.*
grosso modo pulver dr. s. alum. gr. 6. aq. ros. plant. an.
unc. i. stent in loca calido per diem & noctem. filis.

§. III

De Officio Medici in considerandis & prescri- *bendis remediis oticis.*

I.

Medicamenta otica dicuntur, quæ auribus amica
 affectibus eorum succurrunt, & quidem vel in-
 trinsecus cerebrum roborando spiritusque vigoran-
 do, ut influant, nec stationem suam deserant, qualia
 sunt cephalica, vel extrinsecus, seu detergendo, mun-
 dando, ac obstructions referando, vel humiditates
 superfluas exsiccando seu discutiendo, vel flatus resol-
 vendo vel dolorem leniendo.

II.

In usu horum Not. i. in affectibus aurium etiam sem-
 per magis respiciendum esse ad caput: immo ad
 alia viscera, quam ad aurem ipsam. Sic in affectibus
 aurium quicunque, qui non oriuntur à sola causa
 externa, Medicamenta martialia, splenetica & hy-
 pochondriaca sunt optima. Sic etiam in otalgia dia-
 phoretica

phoretica unice pro sunt, cum lymp̃ha plerorumque, & non omnium affectuum aurium potissima causa sit. 2. Cavenda esse in affectibus aurium quæ spiritus vel nimis confundunt ut sternutatoria, vel obtundunt, ut frigida nimis actu vel Potentia. 3. Tepida debere esse otica auribus indenda, quæ blandè demulceant, cum frigida nervis & nervosis partibus sint adversa. 4. Priusquam topica applicentur, sordes aurium pròbè esse removendas, ut scilicet aditus pateat, nec viscositate illa sordida virtus remedii obtundatur. 5. Topica formâ sufficiens magis exsiccare, vaporosa humida magis demuliere, oleosa & spiritiosa magis discutere, in singulis tamen cavendum, nequid nimis, cum vaporosa frequentius usurpata partem debilitent, & aquea membra nullam laxent.

III.

PRæterea. 6. Not. præstare Injections & decocta clysteris modo parata amittere, nisi urgeat necessitas. 7. Si emolliendum vel demulcendum topica immediate instillari posse: contra quando roborandum, cum bombace immitti. 8. 3. vel 4. guttas de liquidis pro una dosi sufficere, neque enim consultum est hunc angiporum obruere. 9. Immissis topicis in autem oppositam cubandum esse, ut melius penetret, & profundius illabatur medicamentum. 10. Valdè unctiosa & viscida, quæ meatum obviscant, non temerè auribus indenda esse, hinc non conveniunt olea crassa, rancida, pinguedines, linimenta &c. Si ol. amygd. & pingued. anguillæ vel serpent excipias. 11. Acriora auribus nunquam instillanda esse cum tenuis membrana lædi, & facile erodi possit, unde dolor & inflammatio. Valet id imprimis in oleis destillatis, quorum hæc sit differentia, ut imprimis quædam possint ad paucas guttulas immitti ut leniora, si præsertim refracta dispergantur, hinc commodissimè possunt olea carminativa permisceri cum ol. amygd. amar. quædam verò bombacæ excepta possint saltem indi ut v. g. ol. destill. anis quæ.

quædam verò planè vitanda sînt , vel non nisi parè
 gliis remiscenda ut v. g. ol. destill. Iuniper. succin. aliâ-
 que calidiora. 12. Immissistopicis autem obturandam
 esse cottone moschatò , qui solus subinde prodest. 15.
 Masticatoria in applicatione topicorum non esse negli-
 genda , ut meatus auditorius , qui ab aure ad os tendit,
 magis aperiatur , hinc masticeetur cinam, vel cubeb. Vel
 mastix, &c.

Formulæ.

Remediorum Oticorum.

Injectio auricularis in surditate & dolore. R. Anth.
 mÿ coq. in urîm puer. lib. i. s. ad lib. i. Col. add. Rhodamel.
 unc. i. M.

Decoctum pro Evaporatione in aures. R. Ment.
 sal. puleg. rorism. cent. min. cinam. abrot. an. mi. bull. in
 Vin. alb. generos. s. q. ad 3. part. consumpt. Vel R. Sem.
 carv. dr. ij. batt. laur. N. ij. fl. chamom. fol. sal. rorism.
 an mÿ coq. in s. q. aq. tempore detubitus excipiat vapor.
 Hinc R. Zibeb. gr. i. mosch. gr. ij. ol. dest. sal. rorism.
 angut. i. hanc mixtura imbuatur cotto, quo aures obturentur.

Aliud. R. Herb. serpill. major. meliss. rut. puleg. ab-
 sinth. tanacet. cent. min. an. mi. rosm. m. s. ros. la. cend. be-
 ton. stach. sal. an. m. s. batt. laur. unc. ij. Iuniper. unc. i.
 coq. ex aq. & Vin. alb. s. q. colatura s. i. Vetur pro evapora-
 tione masticando sub ea mast. & eînam. à fomentatione
 auribus imponatur Gossypium made factum Elix. Git. matib.
 Vel aq. apoplest. Vel essent. acovist. mins. Vel spirit. anbal.
 aut aq. Regin. Hungar. vel pingued. anguill. aut serpent.
 cum paucis guttis ol. destill. anis. Vel succin. Vel cum Bals.
 per. &c. Vel R. ol. amygd. amar. dr. ij. Bals. per. &c. scr. i.
 ol. destill. rorism. gut. ij. M.

Aliud fortius. R. Elieb. alb. dr. ii. pulp. colocynth. scr.
 s. cassia. dr. s. orig. serpill. rut. an. m. s. fol. laur. unc. s.
 cubeb.

cubeb. dr. s. coq. in Vin. & aq. an p. aq. excipiatuꝝ vapor.

Suffitus siccus. R. Thur. mast. succin. an. unc. i. castor. scr. i. lign. quaiac. dr. i. s. ladan. benz. an. dr. ii. confract. & incus. dentur ad scat. S. Auch zu den Ohren. Post suffitum. R. Bals. peru. gut. xv. ol. dest. anis. gut. ii. zibet. opt. gr. ii. M. insing. bombac ac particula ejus auribus imponatur.

Alius. R. Lign. aloes dr. s. mast. thur. an. scr. & alipt. mosch. gr. & M. profumo, quem accipiat ager per infundibulum in Versum ter de dre. Hinc R. Ol. dest. lig. Rhod. gut. & anis. gut. iii succin. gut. ii. amb. gris. gr. & dissolv. s. a. & M. cum bombac moschat. ad scr. ii s. detur in Charta. S. Vermischter Bisam Baumwoll darvon ein Stücl ins Ohr zu thun.

Alius. R. Lig. alo. dr. i. thymiam. benz. an. scr. & mast. dr. i M. pro suffit. hinc R. ambr. gr. iij. mosch. gr. ii. rotul. man. Christ. N. ii. M. exactissime & insperga bombac. madefact. cum ol. anis post suffitum immitte particulam auribus noctu & repete aliquot diebus.

Mixtura experta. ptateri in tinnitu aurium ex casu. R. Aq. Vit. cochl. i. succ. rep cochl. dimid. ol. dest. spic. gut. & M. & auribus instill.

Turundæ acovisticæ. R. Galb. pic. nat. al. an. dr. ii. Elleb. alb. pulv. scr. & zibeth. gr. Vi. M. divid. in p. viii. Gel x. forma instar charyophyllorum in sindone rarissima involvendas filo ad extremitates majores appenso, ut ex aure extrahi possit.

Mixtura in dolote aurium vehementi. R. Ol. amygd. d. Gel lact. mulieb. dr. ii. castor. croc. an gr. i. s. pulv. op. gr. iii. cum gossypio indatur auri dolenti calide.

Evaporatio anodyna. R. Fol. plantag. solan. an mi. fl. chamom melilot. an pi. coq. in lact. pro suffumig. Vel R. Malv. bismalv. Violur. lactuc. an. mi sem. malv. cydon. an. dr. i. z. fl. cham. melil ros. an pi. f decoct. pro evaporat. Gel foment. Hinc. R. Lact. mulieb. unc. ii. album. & in liquorem versi unc. s. instill. repide.

Cata.

Cataplasmata anodyna. ℞. Herb. malv. bismalv. an.
 in medull. pan. alb. unc. ℥. coq. in s. q. lact. Sac. vel capr.
 ad consist. pulv. addo Vitell. ov. N. in ol. ros. unc. ii. croc. scr.
 i. M. F. Catapl. moderate calide applicandum. Vel ℞.
 Cep. sub cineribus coct. N. i. butyr. rec. unc. ii. ol. chamom.
 ros. an. unc. i. croc. scr. i. M. applic. tepide.

J. IV.

**De Officio Medici in prescribendis remediis
 odonticis, aliisque oris & faucium affe-
 ctibus destinatis.**

I.

Medicamenta odontica sunt, quæ dentibus amica
 eos roborant, sordes detergendo dealbant, vitio-
 sum acidum gingivis & dentibus hostile absorbent,
 & blanda vradstrictoria gingivarum tonum conservant
 & roborant. Ad hæc referuntur hæc etiam remedia,
 quæ in affectibus linguæ, gingivarum vuulæ ac faucibus
 conveniunt, ut ex infra annexis formulis videre est.

Formula.

Predictorum remediorum.

Pulvis dentifricus. ℞. Oss. sep. cc. ust. pumic. præp. an.
 unc. iij. mosch. scr. i. asperge spirit. ros. nunc s. & sicca.
 hinc ℞. Gr. kerm. sant. rub. an. unc. s. sp. Sin q. s.
 pro extrahenda tinctura, qua irrorata aliquoties prædictum
 pulv. & sicca.

Alius. ℞. Mandib. luc. pisc. corall. alb. cc. ust. alum.
 ust. radi. Ir. an. unc. s. sal. gemm. dr. i. M. Vel ℞. Rad.
 bistort. alum. corall. alb. an. unc. i. M. F. pulv. subtiliss.
 Vel ℞. Lapid. pum. subtiliss. pulv. unc. s. pulv. Ir. dr. 19.

Gall.

Gall. mosch. ver. dr. i. ol. ros. rosmar. sal. cinam angui. G.
 silic. fl. albiss. calcin. & pulv. unc. v. pau. silig. tost.
 pulv. G. crib. unc. ij. cin. rosmar. sal. luniper. tabac. an
 dr. i. S. mastich. oliv. sang. drac. an dr. i. myrrh. alum. rock.
 an dr. S. M. f. pulv. tingi possunt, si placet; hi pulveres
 vel tinct. lantal. & gr. Kerm. vel coccioniglia in aq. alu-
 minosa solut. & pulveribus aspersa, qui exinde rubescunt;
 vel leni admoti igni purpurascunt.

Aqua Dentifricia. R. aq. font. dilue in ea ffirrit. Si-
 triol. vel alum. q. S. ne nimium acescat. hoc lavamentum
 quotidie m. & v. cum laccinia lanea fricentur dentes.
 vel R. alum. usq. subtiliss. pulv. dr. ij. cinam integ. dr. i. S.
 aq. ros. fontan. an unc. v. bull. in phiala vitrea supra ci-
 meres calidos ad 3. p. consumpt.

Pasta Dentifricia Dominantium. R. chryst. præp. dr.
 s. S. pulv. later. lap. pum. an unc. S. oss. sep. corall. ut. an
 dr. ij. margarit. charyoph. rad. Ir. fl. an dr. i. Mosch. gr.
 v. syr. de ros. sic. vel mell. ros. q. s. ut fiat pasta mollis præ
 dentibus fricandis tollendo postmodum bis Simo.

Dentifricium Infantum dentientium. R. buir. rec.
 unc. i. mell. despum. dr. G. corall. rub. præp. unc. S. f.
 mixt. quâ fricentur Gingiva bis vel ter in die ad dentitio-
 nem facilitandam.

Opiata Borrelly dentes mundificans, corrobo-
 rans, ac cariem gingivarum restituens. R. parum
 alum. solv. in unc. i. sp. sulph. add. cons. ros. vel bugloss.
 unc. G. M. G. deterso dentium tartaro admoveatur.

Alia. R. alum. dr. S. dissolv. ad ignem in unc. ij. aceti.
 hinc add. mell. ij. coq. simul; donec redeant in formam
 opiata moll. hac mixtura m. G. & gingiva fricentur.

Dentilavium scorbuticum. R. rad. bistort. sem. co-
 chlear. an dr. ij. alum. dr. i. mast. dr. ij. coq. in aq. font.
 S. q. ad lib. i. col. ad. mell. ros. unc. ij. M. f. lot. S. Wunder
 Wasser öfters warm in den Mund zu halten.

Aliud in Gingivarum erosione. R. herb. cochlear.
 Veron. sal. prunell. an inj. polyp. q. unc. S. mast. myrrh.

an dr. ij. alum. dr. s. incis. & contus. coq. in aq. salu. lib.
 & Col. add. mell. ros. nnc. i. M. S. ut supra.

Gargarismus expertus in Prunella febrium. R. herb.
 semper viv. rec. mij. canc. viv. N. iv. aq. semper viv.
 maj. unc. iv. acetos fl. nymph. an unc. iij. M. contund. &
 exprim. add. acet. fl. sambuc. ros. an unc. i. S. dissolv. sal.
 nit. prap. scr. i. diamor. unc. i. M. S. Bewährtes Gur-
 gel-Wasser in der Bräun.

Alius. R. aq. prunell. unc. iv. acetos. frag. plantag.
 an unc. ij. semper viv. mai. unc. i. diamor. dr. vj. vel
 unc. j. vel mell. ros. diamor. an unc. s. troch. de nit. prap.
 scr. i. vel dr. s. vel spirit. vitriol. gut. x. M. f. garg. à
 cujus usu lingua & fauces llinantur diamor. unc. i. syr.
 viol. dr. vj. sp. vitriol. gut. iv. M. vel R. aq. semper
 viv. M. prunell. an lib. j. succ. semper viv. m. unc. i. sal.
 prun. vel armon. dr. i. M.

Gargarismus albus in aphtis & anginae principio. R.
 aq. plantag. ros. rub. spermat. ran an unc. iv album.
 ov. in aquam agitando. redact. N. iij. sacch. cand. vel
 chrysellin. unc. i. M.

Gargarismus in dolore, ulcere & inflammatione uvu-
 lae & tonsillarum. R. Decoct. hord. cum mi vel ii fl.
 malv. hort. aut ros. rub. lib. i. rob. diamar. mell. ros. an.
 unc. i. s. vel diamor. mell. ros. syr. de ros. sicc. an unc. s.
 sp. vitriol. scr. s. M. pro Gargaris S. Gurg Wasser zum
 ein sprigen

Alius in angina. R. aq. plantag. solan. ros. capri-
 fol. vel equis. an. unc. iij. vel R. rad. bistort. dr. ii. ca-
 pul. g'and. dr. i. fl. ros. rub. m. s. balauft. pi. herb. plan-
 tag. scabios. an. m. s. incis. & conquass. coq. ex aq. s. q.
 in Col. lib. i. dissolv. mell. ros. unc. s. diamor. unc. i. s.
 aliteriam addunt sp. sulph. q. s. ad notabilem acidit.

Alius simul anodynus foresto maxime usualis. R.
 lact. capr. aq. plantag. an. lib. s. M.

Gargarismus suppurans si ex decoct. ficuum & malv.
 in lacte cum integro croco vel R. Rad. alth. dr. vi. glych.
 dr. ii.

dr. ii. fl. malv. lil. alb. an. m. s. sic. arid. N. vi. coq. cum
aq. malv. vel lact. ad 3. in col. lib. i. dissolv. mell. ros.
unc. i. m.

Gargarismus in faucium ac gulæ exulceratione, fis-
suris ac ardore utilis. R. Hord. mund. mi. cc. rass-
unct. i. s. herb. prunell. fl. malv. arbor. an. m. s. fol. sem-
perviv. m. mi. sem. cydon. plantag. an. dr. ii. Gammar-
fluvv. contus. N. vi. incis & contus coq. ex aq. font. lib-
iii. ad. 3. p. consumpt. colaturâ hac sæpius os collvatur
sorbillando subinde unc. i. vel ii. hinc de sequenti mix-
tura cochl. i. sensim frequenter lingat. R. Mucilage
sem. cyd. aq. ros. fact. mell. ros. an. unc. ii. succ. semper
viv. rec. cochl. iv. M.

Gargarismus detergens in rupto abscessu. R. Scabios-
fl. ros. an. mi. coq. ex aq. hord. s. q. in col. lib. i. dissolv-
mell. ros. unc. ii. M.

Alius in ulceribus faucium. R. Herb. prun. coch-
lear. plantag. an. mi. coq. ad lib. i. in col. dissolv. diamor.
mell. ros. an. unc. i. s. sp. sulph. scr. i. M. vel seq. in mor-
bo Gallico probatus. R. Ros. rub. balaustr. an. mii. Gall.
dr. ii. gland. unc. s. plantag. sic. m. i. s. cort. arant. alum.
ust. an. dr. iii. coq. in aq. plant. ad consumpt. 3. p. add.
mell. ros. col. unc. iii. M.

Collutio oris in dentium vacillatione. R. Corn-
gran. unc. i. s. balaustr. dr. i. ros. rub. dr. s. alum. dr. i. s.
herb. salv. mi. rovis. dr. i. s. sem. coriand. dr. ii. incis &
contus. dentur. ad chart. de his cochl. i. bull. in. s. q. vin.
aq. & acet. teneatur in ore.

Alia in Gingivarum laxitate. R. fl. ros. rub. balaustr.
malv. arbor. an. dr. s. fol. nasturt. aquat. ment. satur. an.
mi. hyssop. salv. an. m. s. f. decoct. in aq. fab. ad lib. i. in
colat. dissolv. alum. dr. i. diamor. mell. ros. col. an. unc.
i. s. M. hinc fiat inunctio. R. mell. ros. col. diamor. an.
unc. i. sp. vitriol. q. s. M.

Linctus in Prunella. R. Mucilag. sem. pshl. cydon.
malv. cum aq. rub. idæ vel spermat. ran. extr. an. unc. s.
succ.

fact. semper &c. M. Vel syr. Viol. aut. portul. dr. ss. nit. de pur. dr. s. Vel scr. ij. M. Cassel vor die Bresln.

Alius in faucium & Palati excoriatione à calore febrili. *R. Sem. psyl. cydon. an. dr. i. s. Gum. tragac. dr. s. cum s. aq. ros. extrahatur mucilago satis liquida add. syr. Viol. parem. quantitatem. f. instar Gelatin. quâ utatur aper frequenter ex cochl. diuq. in ore contineat.*

Linimentum Melluminatum ad ulcera faucium & Gingivarum *R. Pulv. aquileg. sal. ment. nuc. mosch. an. dr. ii. alum. ust. unc. i. mell. unc. ii. M. S. Mundfeil Salbl.*

Aliud. *R. Alum. crud. dr. i. s. fl. aquileg. fol. sal. an. dr. ij. rad. Ir. flor. dr. s. s. myrrh. el. scr. ii. mell. ros. cum sp. sal. acific. q. s. M. F. linim. Vel. R. Syr. de ros. succ. mell. ros. an. dr. ii. s. mast. elect. pulv. dr. s. sp. Vitriol. gut. iii. M.*

Cataplasma in angina. *R. Rad. alth. unc. i. s. fol. malv. Violar. an. mi. fl. cham. melil. an. ps. coq. in aq. ad mollit. pist. add. farin. sem. lin. fanugrac. hord. an. unc. i. nid. hirund. in pulv. redact. unc. ii. ol. amygd. Viol. butyr. rec. an. unc. ii. ol. cham. unc. i. M. F. catapl. ab aure ad aurem per collum calidè applico.*

Aliud. *R. Farin. hord. fab. an. unc. ss. nid. hirund. unc. ii. sterc. canin. alb. ex sic. unc. i. s. mell. unc. ii. ol. ros. q. s. M. F. Catapl. Vel R. nid. hirund. N. i. stercor. can. alb. mi. coq. in Vin. Vel lact. ad consist. pulv. vel pistentur cum mell. & axung. porc.*

J. V.

De Officio Medici in prescribendis & considerandis Medicamentis Thoracicis.

I.

Medicamenta Thoracica seu Pneumonica sunt, quæ pulmonibus sunt, quæ pulmonibus appropriata, eorum tonum sartum, et eorumque conservant. humo.

humoresque in iis contentos ad anacatharum præparant. Actionem suam exercent vel humores crassos, viscidos incidendo, attenuando, & detergendo, ac membranam internam ad contractionem & excretionem irritando, atque hæc dicuntur præ ceteris *Bechica* & *arteriaca*, quæ conveniunt in tussi, asthma, expectoratione difficili, catarrho suffocativo &c. De quibus supra, vel humores tenues, acres, salios titillantes & rodentes inorassando, pepasum inducendo, orgasmum tollendo, & acrimoniam fluxilem retundendo atque hæc audiunt *interceptientia* utilia in tussi ferina, hæmoptysi, catarrhis salis. &c. Vel stagnantem sanguinem, ferumque spissescens & in coagulum abiturum resolvendo & disiciendo ut in asthma, vel pulmones læsos, erosos & ulcerosos vi Balsamicâ & vulneraria detergendo & consolidando ut in Phrysi &c.

II.

Circa usum horum Not. i. in Becchicis semper humoris expectorandi qualitatem attendendam esse, ut inter incidentia & incrassantia accurata fiat distinctio, neque dentur incrassantia, ubi viscosi & tenaces peccant humores, nec incidentia & attenuantia, ubi tenues, salii & acres. 2. In affectibus thoracis subinde magis prodelle resolventia, quam expectorantia, cum sint quasi anima pectoralium. Sic in pleuritide & asthma magis resolventia: in tussi & Phrysi magis Becchica conveniunt. interim pro re nata hæc variè misceri possunt. 4. In pectoralibus vitanda nimis exsiccantia, vel saltem cum humidis miscenda. 4. Vitanda quoque nimis laxantia tam interna, quam externa. Illa tonum debilitant, ventriculum deiciunt, ac inappetentiam cient. hinc becchicis linctibus in magna copia & continuo uti non est consultum: hæc verò poros ampliando & magis dilatando ad affluxum recipiendum magis disponunt. unde in unguentis pectoralibus etiam cautio esse debet. 5. Becchica sensim magis ac pedetentim, quam una vice

deglutienda pituitando nempe & sorbendo , ut scilicet pars ad asperam arteriam feratur & derivetur magis. 6. Decocta pectoralia præferenda sæpius esse linctibus dulcibus. 7. Pectori inimica esse frigida , acida , salina , nitrosa , & vitriolica , illa serum coagulando : reliqua partim irritando partim fundendo. Intelligentia tamen hæc singula de pectore vel debili vel eroso & essentialiter affecto hinc acida in genere conveniunt aliquibus in casibus , sed ordinatiè pulmonibus nulla erosione contaminatis , sic v. g. profunt in pleuritide pro tussi luanda & conservanda , in astmate incidendi sine mixta tamen & refracta cum dulcibus.

Formula.

Remediorum Thoracicorum.

Decoctum Pectorale in Pleuritide & peripneumonia ulvalc. R. Rad. liq. unc. s. tussilag. dr. iii. herb. scabios. capill. ven. chære fol. heder. arbor. card. b. an. m. s. fl. bellid. papau. Errat. an. pii. viol. p. i. fic. N. v. Iuub. sebest. an. N. ix. passul. min. mund. unc. i. sem. melon. excort. malv. an. dr. ii. coq. ex aq. hord. s. q. in Col. lib. i. dissolv. syr. fl. Rhead. unc. i. s. de liq. de succ. card. b. an. nne. i. spirit. sulph. acid. gut. xv. M. S. Druffe. Transauff 3. oder 4. mahl.

Decoct. ad tussim , aliasque Pulmonum læsiones. R. Rasur. lig. sasaph. unc. i. maceretur in aq. font. lib. vi. add. rad. levisst. unc. s. ennul. dr. iii. herb. heder. terrest. scabios. pulmonar. an. mii. sem. anis. fanic. an. dr. iiii. coq. ad 3. addendo in finem rad. liq. unc. s. passul. min. conpassul. dr. vi. Col.

Aliud ad Tussim. R. Rad. ennul. Ir. an. dr. vi. herb. scabios. rueran. hyssop. heder. terrest. an. mi. fic. ping. N. v. sem. anis. dr. iiii. incisa coq. ex cerevis. vel R. Fic. N. vii. passul. mi. xibeb. unc. s. Iuub. N. 2. filiq. dulc. dr. vi. mell.

vi. mell. unc. ii. s. coq. in s. q. ad 3. addendo sub finem
acet. opt. unt. iii. Col. & clarif. dentur lib. iii. bibat
quottidie bis lib. s.

Apozema antiphtysicum. R. Rad. chin. incis. dr.
iii. rasur. ebor. dr. i. ras. cc. dr. i. s. dactyl. N. vi. infund.
in aq. font. s. q. per noct. manè add. fol. arnogleff. bugull.
agrimon. veron. virg. aur. capill. ven. an. p. ii. bord. pii.
vu. pass. enuelcat. m. s. coq. ad lib. ii. col. add. cons. ros.
rub. unc. ii. stent simul per horas 3. Col. s. **Brust-Tranc**
widder die Zungen-Sucht / darvon Morgens / Abends
und Nachts ein Trunc zu thuen.

Aliud. R. Rad. chin. in talleol. incis. unc. i. sasaph.
sant. cit. an. unc. s. macerentur in aq. font. mens. ii. s.
add. herb. hed. terrest. pulmon. scabios. an. mii. som. anis.
fanic. an. unc. s. rad. liq. dr. iii. passul. min. conquass. unc.
i. coq. ad 3. Col.

Aliud. R. Rad. symph. mai. glych. an. unc. s. fol.
marub. tussilag. pulmonar. veron. sanic. agrimon. bugul.
an. m. s. fl. scabios. viol. an. p. ii. passul. min. dr. vi. sant.
rub. dr. ii. s. coq. in s. q. aq. in Col. lib. i. s. dissolv. looch.
de pulm. vulp. de symph. fernel. de Iuiub. an. unc. s. vel
in iuce cons. ros. rub. rec. unc. i. s.

Iulapium Pectorale. R. Aq. farfar. scabios. veron.
hyss. p. an. unc. iii. syr. de Iuiub. deliq. an. unc. i. s. M. S.
Brust-Zulep auff 4. mahl.

Mixtura Pectoralis antiasthmatica Timai. R. Looch
san. & expert unt. i. aq. astmat. unc. iv. cinam. unc. iii.
fanic. unc. ii. veron. scabios. an. unc. i. s. sp. card. b. an.
gel. an. dr. i. M. S. **Lufft-Wasser wider die Enge löst**
voll weiß, zugebrauchen.

Aqua asthmatica. R. aqua ceras. nig. hyssop. va.
ron. fl. acac. an. unc. i. astmat. unc. i. spirit. anis. es.
sent. sacch. an. dr. ii. Bals. sulph. anis. therebinth. an. scr.
i. confect. alk. incompl. dr. s. extr. proc. gr. vj. sacch. per.
lat. unc. s. M.

Alia

Alia. R. Pulv. Gummi. ammon. dr. i. aq. hyssop. Rhen. an. unc. ij. M. Vel R. aq. ceras. nig. hyssop. an. unc. ij. Epil. lang. asthmat. an. unc. s. spirit. ceph. anhalt. Vel Elix. Vit. Marsh. dr. ij. auis. opt. dr. ij. s. mosch. amb. an. gr. i. sacch. cand. alb. unc. s. M.

Aqua Pectoralis & antiphtylica. R. aq. antiphtys. mins. unc. ix. magist. corral. perl. an. scr. ij. lact. sulph. dr. i. fl. sulph. scr. i. s. sacch. cand. alb. pulv. unc. s. M.

Mixtura antipleurítica. R. aq. card. b. scabios. char. fol. an. unc. i. s. ocul. cane. prap. antim. diaph. an. scr. i. Vel dent. apr. mandib. lucis pisc. spirit. sal. armon. scr. s. laud. op. gr. dimid. Tul. Viol. dr. ij. M.

Emulsio antipleurítica. R. Sem. mel. excort. unc. s. Card. Mar. card. b. an. dr. s. amygd. d. dr. ij. pinear. dr. ij. aq. scabios. fl. Rhaad. card. b. an. unc. i. s. M. f. Emuls. add. pulv. antipleurit. scr. i. Vel ras. dent. apr. ocul. cane. an. scr. s. man. christ. perl. dr. i. s. M.

Emulsio in Phthysi utilis. R. sem. melon. excort. dr. ij. papav. alb. dr. i. amygd. d. excort. N. xxx. pan. alb. probe tost. unc. i. s. aq. Veron. scabios. hyssop. an. un. ij. Borrag. Viol. an. unc. i. s. sacch. cand. alb. unc. i. M.

Brodium antiphtysicum. R. pullum exenteratum. ac in Gentre pone sacch. ros. unc. ij. item Veron. heder. terrestr. Vel aliam herbam antiphtysicam coq. lento igne in olla cooperata in S. q. aq. relinquatur per noctem supra cineres calidos, mane sumatur pullus contusus cum Brodio.

Aliud. R. Succ. express. nasturt. bellid. char. fol. ad cochlear. ij. Vel ij. cum pauxillo mell. ros. dissolv. in S. q. brod. carn. Vel R. herb. predictae aut alias hujus virtutis ad mi. Vel ij. contus. affund. brod. carn. non saliti ebullient unc. i. s. Vel v. Col. add. mell. parum.

Brodium antiasthmat. R. sperm. cet. dr. i. dissolv. in S. q. brod. carn.

Aliud antipleuriticum. R. ol. depur. lin. unc. ij. ol. ans. gus. sa. dissolv. in S. q. brod. carn.

Decoct: Galliveteris in affectibus Thoracis. R. rad. capul. suffilag. an. dr. ij. liq. unc. s. herb. heder. terrestr. scabios.

hys. an mi. Veron. pulmon. cussil. an mi. tare alb. unc. i.
agar. dr. ij. incisa indantur Venter. Galli Venter. exenterat.
coq. in aq. s. q. tamdiu, donec omnis caro ab ossibus absc-
dat, exprim. & col. dos. quotidie unc. fō. Vel 6. cum gust.
ix. Bals. sulph. anis.

Electuarium antiphtyficum. *Rz. Cons. ros. Venter. unc.*
ii. pulv. haly rec. prep. dr. ii. antihact. Peter. dr. s. Bals.
sulph. anis. gut. vii. syr de symph. fernel. q. s. M. F. Elect.
vel Rz. Cons. ros. rub. fl. bellid. an. unc. i. loach. san. & ex-
pert. de pulm. Gulp. de farfar. an. unc. s. pulv. Haly. ano-
nym. an. dr. s. sulph. scr. i. spec. diatr. ag. fr. scr. ii. syr. Viak.
papa. Errat. an. q. s. M. F. Elect. s. Besondere Lata
mergen wider die Lung. Sucht / darvon drey mahl
des Tags einer Nuß groß zu nehmen.

Electuar. Asthmaticum. *Rz. Fl. sulph. unc. i. s. cinam.*
dr. s. Zz. scr. ii. croc. dr. i. mosch. gr. vi. mell. despum. unc.
iii. Vel q. s. M. F. Elect. s. Brust Lathwergen wider die
engeden Tag 2. mahl 3. Quintl. schwer darvon zuneh-
men.

Ecclegma antiphtyficum ex succis. *Rz. Succ. symphit.*
maj. lib. i. sanguisorb. Veron. ros. rub. sal. min. heder.
terrest. farfar. portul. an. unc. fō. depur. & cum s. q. sacch.
albiß. redig. in formam looch.

Looch. album. *Rz. Ol. amygd. d. sacch. penid. an. p.*
aq. M. exacte, ut abeant in massam albiß.

Looch domesticum. *Rz. Ol. amygd. d. rec. unc. fō. syr.*
lusu. capill. Ven. an. unc. ii. sacch. alb. dr. ii. M. in mort.
marmor. s. Brustsaft.

Linctus contra tussim, pleuritidem & asthma vid. su-
pra de expectorantibus.

Morselli pectorales. *Rz. Looch san. & expert. dr. 6.*
spec. diatr. dr. ii. condit. rad. ennul. unc. i. cort. arant. dr.
vi. fl. benz. gr. 6. sacch. albiß. in aq. fanic. sol. lib. s. M. F.
morsul. s. Brustsaft.

Trochiscipectorales. *Rz. Extr. glych. dr. ii. amygd. dr.*
vi. mosch. z. beth. an. gr. s. s. ol. anis. gut. vi. sacch. albiß.
unc. vi. mucilag. Gum. tragac. q. s. M.

Rotulæ antiphtyicæ. R. succ. glych. inspiss. une.
s. spec. diatr. scr. iv. fl. sulph. spec. diatr. frig. an dr. i.
sacch. penid. unc. i. s. ol. anis gut. vii. cnm S. q. mucilag.
trag. f. troch. maiores. s. Besondere Brust- und Husten-
Zeltlein darvon nach Belieben zu nehmen.

Alia. R. pulm. vulp. præp. dr. i. extr. ennul pulv.
glych. haly an scr. ii. S. fl. sulph. scr. i. benz. gr. v. sacch.
fin. in aq. ruffilag. dissol. unc. ii. s. M. f. rotul. add.
ol. anis gut. x.

Alia præstantes. R. antim. diaph: ex regul. dr. i.
fl. benz: dr. s. succin alb. præp. mastich: subtiliss: pulv.
spec. diatr. frig: an scr. iv. croc. orient: gr. xv. essent:
amb: succ. gr. xvi. ol. anis: gut. vi. fenic. gut. iv. sacch.
albiss. in aq. ceras niq. dissol: unc. iii. M. f. confect. in
rotul:

Pulvis antiphtyicus. R. fl. sulph. unc. i. s. diatr:
tabulat unc. s. M. F. pulv. S. Lungen-Pulvers / darvon
eines Duggaten schwer auff einem frisch-gefottnen Ayr
zu nehmen.

Alius. R. Bals. sulph. dr. ii. impast. cum sacch.
cand: alb. unc. ii. pulv. succ. Glych. rad. ennul. Ir. flor:
lact. sulph. an scr. ii. spec. diatr. frig: dr. i. M. F. pulv.
Vel R. fl. sulph. ter sublim: scr. ii. s. pulv: anonym: pulm:
vulp: præp: Haly. an dr. i. sperm: cet: dr. i. sacch. penid:
unc. i. M. F. pulv.

Alius. R. Pulv. haly. spec. diatr. diatr. fr. an
dr. i. fl. sulph. ter sublim: scr. ii. benz. gr. xv. sacch. cand.
alb. unc. ii. s. fol: aur: N. vii. M. F. Pulv. S. Lungen-
Pulver / darvon i. Quintl mit dem Gersten-Schleim
zu nehmen.

Alius. R. Visc: querc: herb. salu: an unc. i. pulmon.
veron: an unc. s. rad. ennul: pulm: vulp: præp: an dr. ii.
ex succ. & seorsim pulveris add: sacch. albiss: rad pondus
omnium detur, ter in die ad cochl. i. super buccella pan:
vino madid.

Pulvis antipleuriticus. R. sal. prun. dr. ij. pulv. fl. papav. errat. corall. rub. an dr. i. magist. dent. ap. & el mandib. luc. pisc. ocul. cancr. an scr. i. sacch. viol. unc. S. M. f. pulv. dos. à scr. i. ad. ij. ex aq. papav. Errat.

Pulvis antiasthmaticus. R. fl. sulph. dr. i. benz. dr. s. M. Vel R. spec. diamosch. d. compl. scr. s. Gumma. ammon. gr & benz. gr. s. & croc. aust. gr. & M.

Pulvis pectoralis Michaël. R. rad. aron. crud. pulv. unc. i. sulph. opt. commun benz. pulv. an dr. ij. antisept. Poter. unc. S. sacch. q. S. & el pro lubitu. M. f. pulv. cuius dos. à dr. S. ad dr. i.

Tragæa in affectibus Pectoris. R. liq. ras. dr. ij. sem. anis. fanic. an dr. i. S. cass. lign. dr. ij. cubeb. dr. i. rad. tr. flor. dr. i. S. sacch. ros. tabul. unc. s. ol. destill. an. f. & el fanic. gut. xj. M.

Lotio pedum in asthma. R. herb. major. rorisem. an mj. hyssop. orig. la vend. serpill. fl. chamom. an mj. ros. calend. an mj. M. pro lavacro pedum. S. species zum Fußwasser.

Unguent. pectorale. R. ung. pectoral. unc. i. de albi unc. S. ol. Irin. amygd. d. an dr. ij. croc. scr. i. M. Vel R. pulp. cep. sub cineribus coct. unc. ij. cui add. ol. viol. Irin. lin. an unc. f. ung. pectoral. unc. i. croc. orient. scr. i. M. S. Brustsalben.

Aliud antipleuriticum. R. ung. de alb. pingued. mur. mont. an unc. i. ol. amygd. d. unc. s. camph. scr. i. M.

Cataplasma pectorale expectorationem promovens. R. hord. crud. ad mollit. coct. in aq. malv. lib. s. pistetur add. ol. viol. amygd. d. an unc. i. croc. scr. i. M.

Aliud in dolore pleuritico. R. rad. alb. lil. alb. an unc. ij. fol. malv. violar. parietar. an m. i. sem. lin. farin. grac. an dr. ij. fl. chamom. melil. papav. Errat. an p. coq. in f. q. lact. ad mollit. contus. add. ol. amygd. d. chamom. lil. alb. an unc. i. s. prog. Gallin. & el ung. rub. patab. unc. i. farin. sem. lin. q. s. M. f. Catapl.

Ex speciebus prædicti decocti parari etiam possunt sacculi & fomenta &c. Plura de his vide superius in remedijs expectorantibus.

I. VI.

De Officio Medici in considerandis & præscribendis remedijs Cordialibus

I.

Medicamenta cordialia seu cardiaca sunt, quæ cordi familiaria illud respiciunt, vel flammulam vitalem depressam, nec satis emicantem instaurando. & particulis suis volatilibus sulphureis, seu oleosis & Balsamicis, seu spirituosissimis alacriorem sanguinis in corde rarefactionem, & in spiritus exaltationem promovendo qualia conveniunt in languoribus cordis, lassitudine cum malignitate, senio, pallore, frigore, cachexia, virum debilitate aliisque affectibus, ubi spiritus deficiunt, ac particulae sulphureae volatiles & spirituosae vel obtusae, vel non sufficienti quantitate vigoratae sunt, vel illud respiciunt eandem luculam vitalem p. n. exardentem, ut alienis quasi urat flammis, particulis suis aqueis, acidis, nitrosis, mucilaginosissimis & adstringentibus refrigando, sulphureasque, balsamicas & mercuriales volatiles particulas nimis effertas deprimendo, obtundendo & præcipitando, vel agunt sanguinis grumescentiam & coagulationem corrigendo, acidumque illud inspissans & coagulans absorbendo, vel nimis fusam & rarefactam M. S. ut spiritus suos vix contineat, constipando, firmando ac sulphur concentrando, vel peregrinum malignum fermentum calidum vitale oppugnans discutiendo, vel spiritus recreando, restaurando, vel eos veluti torpidos & sopitos excitando.

II.

Quoad legitimum horum administrandi & applicandi modum Not. i. alterationem excessivam in utramque partem cordi non convenire, hincque cavendum esse

esse & à nimis refrigerantibus, quæ motum spirituum præpediunt, & ab excessivè calefacientibus quæ eundem dissipant. 2. In debilitate virium non statim ad confortantia cordialia, nec ad illa quidem sola confugiendum, sed causas insuper removendas esse, nisi urgeat indicatio vitalis: præterea convenire ærem liberiores & diætam convenientem. 3. Cordialibus volatilibus, rarefacientibus & solventibus interponenda esse tonica, quæ calorem conservant, ac villos & fibras nerveas tuentur. 4. Cordialia debere esse quàm maximè penetrantia tum præcipue interna, tum etiam externa, hinc epithematis acetum & camphora additur, ac eadem ex penetrantibus spirituosis composita ommissis fixioribus, quæ in poros non admittuntur, non sunt de nihilo. 5. Cordialia omnino non posse omnia, sed eadem ab invicem distinguenda, neque confundenda fixa cum volatilibus, generalia cum specialibus, neque alimenta cum Medicamentis. Sic fixa præstantiora sunt, si humores acidi absorbendi; vel fermentatio & orgasmus biliosus sedandus: volatilia verò & aromatica, ubi spiritus magis intendendi & excitandi. 6. Moschatidis & ambratis non abutendum esse, cum nimis rarefaciant, ac in motum cieant spiritus eosque inquietos reddant præsertim in febribus, palpitatione cordis & hæmorrhagiis.

Formulæ.

Remediorum Cordialium.

Julepus Cordial. ℞. Aq. Borræg. buloß. rub. idæ. an. Junc. s. cinam. bugl. dr. ii. succ. cit. rec. dr. vi. confect. alk. dr. s. syr. de rub. idæ. unc. s. M. S. *Herz-Julep Löff voll weiß zugebrauchen.* Vel ℞. syr. rub. idæ. unc. i. conf. alk. scr. ii. spir. ros. scr. s. aq. ceras. nig. unc. iii. ss. Vitriol. q. s. M.

Julapium vitæ. ℞. Citell. oß. rec. N. ii. sacch. albiss. ans. s. ol. cinam. gut. iii. Vin. alb. Vel Hispan. aut malvæ. unt.

unc. ʒj. M. exactè si efficaciorẽ Velis add. amb. gr. ij. ob.
dest. cit. gut. iij. conf. alk. scr. ij. M.

Julapium perlatum. R. aq. cit. Borrage. meliss. ceras.
nig. an unc. iij. spirit. ceras. nig. unc. i. sacch. albiss. dr. ʒj.
marg. prap. dr. i. S. M. agitentur optimè S. à. S. **Perl**
Zulep 3. oder 4. Löffel voll in der Schwachheit ein
zugeben.

Aqua cordialis in febribus malignis. R. aq. Borrage.
bugl. an unc. i. S. ceras. nig. acetos. an unc. i. ros. cinam an
dr. ʒj. marg. prap. à scr. i. ad dr. i. bez. orient. gr. ʒj. man.
christ. perl. dr. ʒj. M. S. **Herz und Perl Wasser.**

Alia. R. aq. Borrage. bugl. fl. cit. scorz. an unc. i. S.
card. b. card. M. an anc. S. cinam bugl. dr. ij. spec. de
hyac. smaragd. prap. an scr. i. S. bez. orient. scr. i. man.
Christ. perl. q. S. ad gratitud.

Aqua cordialis in hypercatharsi & fluxibus alvi. R.
Aq. cord. frig. unc. ij. S. rub. id frag. ros. an unc. i. cinam
bugl. unc. ij. carbunc. unc. i. marg. prap. scr. i. cc. ust. scr.
ij. corall. rub. prap. scr. i. smaragd. prap. scr. S. spirit. rub.
id. dr. s. ros. scr. i. myo. cydon. unc. S. M. S. **Besonderes**
Krafft Wasser zustärken / und zu stellen.

Aqua perlata. R. aq. 4. cord. ceras. nig. an. unc. i.
cit. ex toto namph. an unc. S. cinam bugl. unc. S. marg.
orient. prap. scr. ij. magist. corall. scr. i. S. cc. ust. prap. scr.
i. man. christ. perl. dr. ij. M.

Aqua confortativa cum confect. alkerm. R. aq.
Borrage. bugl. an unc. i. s. ceras. nig. acetos. ros. an unc. i.
cinam unc. s. conf alk. compl. dr. i. marg. prap. scr. i. Vel
dr. S. man. christ. perl. unc. S. M.

Alia in fluxibus sanguinis. R. aq. perlat. usitat. ce-
ras. nig. cordial. temperat. borage. bugl. an unc. i. cinam
cydoniat. dr. iij. corall. rub. prap. marg. prap. an scr. i. cc.
ust. prap. scr. i. s. lap. bez. orient. gr. iij. syr. acetos. cit. unc.
S. man. Christ. perl. dr. ii. M.

Aqua confortativa in gravidis. R. aq. perlat. usi-
tat. ceras. nig. cord. temper. Borrage. an unc. ii. cinam
cydon

cydoniat. unc. s. Bals. Embryon. unc. s. lap. bez. or. gr
 &ii. marg. prap. corral. rub. prap. cc. philos. prap. an scr.
 s. confect. alk. incompl. dr. i. syr. gran. man. Christ. perl.
 an unc. S. M.

Emulsiō perlata Montagnana R. aq. Borrage. è flor.
 in Vit. destill. lib. i. marg. prap. dr. iii. aq. cinam unc. i. M.
 in mort: marmor.

Alia Craton. R. marg. orient. prap. Gel magist. perl.
 dr. i. Gel magist. matr. perlar. dr. i. perlar. prap. dr. s. aq.
 fl. Borrage. unc. iii. cordial. frig. unc. s. cinam bugl. unc. s.
 lul. ros. q. S. M. S. **Perl Milch.**

Alia. R. amygd. d. excort. dr. &ii. sem. 4. fr. m. ex-
 cort. an dr. i. aq. Borrage. bugl. an unc. i. S. è ryp. cer &
 unc. i. M. f. Emuls. add. magist. perlar. dr. s. sp. ros. rub.
 ida. an gut. xi. man. christ. perl. q. S.

Electuarium Cordiale. R. conf. ros. rub. Vitriolat.
 unc. &v. pulp. cit. condit. unc. ii. cendit. cort. cit. unc. i. S.
 fl. cit. condit. unc. i. magist. perlar. corral. an scr. ii. conf.
 alk. de hyac. an dr. ii. syr. perlar. orient. & gran. dulc. an
 q. S. M. f. Elect. S. **Hertzstärckenge Latwergen.**

Aliud. R. conf. ros. rub. unc. &v. bugl. unc. ii. af-
 fund. sp. Vitriol. gut. xiii. M. in mortar. lapid. add. conf.
 alk. dr. ii. stirt. rub. id. dr. i. syr. fl. tun. q. S. M. F. E-
 lect. regend. fol. aur. S. ut supra. **Darvon zu Zei-
 ten einer Keften groß zunehmen.**

Aliud in palpitacione cordis. R. conf. ros. rub.
 unc. ii. uelß. cit. an unc. i. conf. alk. de hyac. an dr. i.
 spec. diamarg. fr. diarrhod. abb. an dr. S. corral. rub. prap.
 scr. s. syr. de limon. q. S. M. f. Elect.

Morselli Cordiales. R. confect. alk. de hyac. an unc.
 s. pulp. cordial. Tima dr. ii. condit. cort. cit. unc. i. S.
 fl. cit. dr. &ii. sp. ros. rub. id. an dr. i. sacch. albß. in succ.
 cit. sol. lib. i. M. S. **Hertzstärckende Morsellen.**

Alii simul stomachici. R. confect. alk. compl. spec.
 pro morsul. Imperat. an unc. S. cort. rec. cit. arant. an
 dr. iii. amygd. d. excort. unc. i. sacch. in aq. ros. sol. lib.
 s. M.

Tabulæ Cardiacæ. R. Cort. extir. in condit. dr. iij. *limon. unc. s. arant. dr. ii. confect. sem. fenic. dulc. dr. s. E. coriand. dr. iij. card. dr. s. incid. in pulv. & leſſer con-*
sund. add. nuc. mosch. pulv. dr. s. spec. aromat. ros. scr. &.
amb. gris. scr. s. sacch. opt. unc. &. mucilag. sem. cydon. q. s. M. F. tabul. s. d.

Aliæ pretiosæ. R. Marg. præp dr. ii. corall. rub. præp. *succin. alb. præp. dr. i. magist. cc. ebor. an. dr. s. s. sacch.*
alb. unc. ii. mucilag. sem. cydon. q. s. M. F. tabell. bulla

Rotulæ Cordiales. R. magist. corall. perl. un. dr. i. *conf. alk. dr. ii. ol. destill. cinam. gut. iij. cit. gut. ii. sacch.*
albiß. in aq. Carbunc. sol. unc. ii. Vel q. s. M. F. rotul.

Pulvis Cordialis. R. Corall. rub. præp. dr. &. marg. *præp. dr. ii. sacch. opt. unc. s. ol. destill. cinam. gut. iij. M. F.*
pulv. s. Herbs Pulver.

Pulvis Cordialis analepticus. R. Corall. rub. præp. *dr. ii. ocul. canc. præp. dr. s. marg. præp. dr. s. pulv. ana-*
lept. frig. Mins. dr. ii. mac. scr. s. sal. acetosell. gr. &. sacch.
albiß. unc. in M. F. pulv. de quo post pastum cochleari int-
inu. Vel per se Vel cum pane vino imbuto sumatur.

Tragæa Cordialis. R. Marg. præp. succin. præp. cor- *rall. rub. præp. cc. ust. præp. magist. ocul. canc. matr. perl.*
an. scr. ii. man. Christ. s. unc. s. s. amb. gr. &. ol. cinam. gut.
ii. charyoph. gut. &. fol. aur. N. &. M. ad scat. s. Herbs
stärkender Triseltz: darvon nach dem Essen ein Klei-
 nes Löfelle voll auff einer Schnitten Wein und Brodt
 zunehmen.

Aliæ pretiosa. R. Marg. orient. præp. corall. rub. præp. *scr. &. lapid. s. pretios. an. scr. s. cc. ust. præp. scr. &. amb.*
opt. scr. s. mosch. gr. &. matr. Christ. s. unc. iij. s. fol. aur.
N. &. M.

Epithema Cordiale frigidum in febribus bile. R. aq. *meliß. Borrag. laſend. ros. an. unc. iij. acet. ft. tunc Vel.*
ros. aut ft. samb. Vel rub. ida. unc. s. Vel ii. spec. pro epith.
cord. dr. s. s. gr. kerm. pulv. Vel spec. diatrionisant. aut cor-
dial. temper. Vel lig. uioes aut Cort. cit. dr. s. Croc. camph.
an. scr. s. album. &. conguß. N. s. M. s. Herbs und Pulv.
Überschlag. Aliud

Aliud quo spiritus vitales subito reficiuntur. R. aq. melleis. lib. a fl. cit. ros. an lib. s. spec. cord. temper. dr. ij. diamb. diamosch. d. an dr. s. succ. cit. unc. ij. acet. ros. unc. i. Vin. alb. lib. s. M. pro Epithem.

Unguenti: Cordiale. R. ung. ros. unc. ij. spec. pro epithem: cord. subtiliss. pulv. dr. s. diamb. dr. s. ol. lig. Rhod. Vcl Bals. ros. scr. s. camph. scr. i. M. possunt etiam addi ol. dest. cinamgus. & mac. scr. s.

Aliud. R. ung. pomat. unc. s. ol. lig. Rhod. gut. & j. charyoph. cit. angust. & s. spec. cord. temper. scr. ij. mosch. gr. ij. M.

Sacculi Cordiales pro corde & pulsibus. R. spec. cord. temper. dr. ij. fl. ros. rub. laend. an dr. s. mosch. gr. & s. M. f. 2 saccul. cum sind. rub. pro pulsibus & annus pro Corde. madefiant seq. liquore. R. aq. ros. laend. an unc. ij. aq. cinam. unc. s. acet. ros. dr. x. croc. scr. s. camph. gr. & s.

Alij. R. fl. borrag. bugl. Vlot. meliss. anth. an pi. spec. cord. temper. pro Epith. cord. an scr. ii. cort. cit. rec. dr. s. M. f. 2. saccul. madefac. aqua seq. R. aq. Borrag. unc. s. cinam. meliss. an unc. i. odorif. fuchs. dr. & s. acet. ros. unc. s.

Aqua odorifera. R. aq. odorif. fuchs. unc. s. sp. cephal. anhalt. camph. dr. i. aq. cinam. destill. dr. i. s. M. Vcl R. aq. ros. fragrant. odorif. fuchs. an unc. s. acet. rub. idat. dr. ij. s. Anstreich Wasser an die Nasen/ Herz und Puls.

Alia. R. aq. ros. frag. unc. s. laend. cinam. Elix. Cit. an dr. & s. acet. fl. tun. unc. s. ros. dr. & s. spirit. ros. dr. i. M.





§. VII.

De Officio Medici in considerandis & prescribendis remedijs stomachicis.

I.

Medicamenta stomachica sunt, quæ stomacho appropriata illi succurrunt, & quidem vel particulis suis volatilibus ignem vitalem adjuvando, & calorem stomachi promovendo & conservando, vel particulis incisivis cruditates liquando, vel villos seu fibras ejus constringendo, sicque sanguinem & spiritus ejus magis uniendo, atque talia locum habent in anorexia, dysorexia, læsa chylicatione, ructibus, singultibus, cardialgia, inflatione stomachi, vertigine sympathica, alijsque ventriculi a frigiditate oriundis symptomatibus, suntque vel aromatica, vel oleosa Balsamica, vel sale volatili inprimis oleoso referta, vel spirituosæ, vel amara, vel carminativa, vel leniter adstringentia, vel stomacho succurrunt fermentum ejus iners & deficiens acuendo & instaurando, qualia sunt omnia sale vel acido vel volatili potissimum referta, vel fermentum excedens acrimoniâ sive salinâ, sive biliosâ corrigendo, qualia conveniunt in omni excessiva acredine ut Cholera, diarrhæa, cardialgia, singultu, soda, alijsque ejusmodi affectibus.

II.

IN usu horum pro debito Regimine Notæ 1. in omnibus remedijs adhibendis videndum esse, quomodo se habeant erga ventriculum, ac ita semper corrigendum esse fermentum, ne calorem vel tonum ventriculi negligamus, ipsique noxam inferamus, & vice versa ita calorem temperandum, ne negligamus fermentum: præ omnibus vero ejus Parietes, & villos moderatè adstringentibus

gentibus firmandos esse. 2. Nimum refrigerantia ventriculo nocere, cum sit viscus natura sua frigidum, uti etiam nimum laxantia, ut tepida, pingua, oleosa, &c. 3. Ita alterandum esse ventriculum, ne contrarius præternaturalis status inducatur. 4. Cavendum esse, ne in alteratione ventriculi alia visceralæ damus, sic in externis providendum, ne lædatur Epas, quod proximè incumbit: in internis verò, ne vel nimis calefaciendo bilem acuamus, vel nimis refrigerando eam reddamus inertem. 5. Stomachicis calidis minùs ex toto resolubilibus minùs fidendum esse, quia grossiores particulæ remanent, & ventriculum gravant, vel irritant. 6. Non obtuendum esse ventriculum copia medicamentorum quorum vistum sibi, tum alijs dicatorum. 7. Roborantia magis vacuo ventriculo danda exceptis alimentis medicamentosis, interim spirituosæ quædam ventriculo à repletionè gravato modicè concedenda esse. 8. Topica stomachica frequentius & usitatus parte antica applicari, ubi Epate ex parte regitur, aliquando tamen postica, ubi orificium superius recumbit.

Formulæ

Remediorum stomachicorum.

D Ecoctum amarum vid: superius de antifebrisugis.

Aliud in anorexia proficuum. R. fol: agrimon: absinth. cent: min: an mi. coq. in S. q. aq: font: ad lib. s. dissolv. sacch. unc. i. M. Vel R. rad: cichor. herb. absinth. Rom. card. b. an mi cent. min. m. s. coq. in vin. & aq. cichor. an. mens. dimid. ad 3. p. consumpt. Col. detur m. & v. bonus haustus.

Julapium stomachale. R. aq. cinam opr. unc. vi. ment: meliss. an unc. iii. ol: vitriol: ritè parat. gut. xii. cinam gut. vi. syr. de ment. unc. i. s. M S. Magens Zulep, darvon 2. oder 3. löffel voll zu nehmen.

Aqua clareta stomachalis. ℞. cinam crassiuscule
trit. unc. i. maceretur in lib. i. aqua vit. per se in vase vi-
treo. in alio vase vitreo per se & seorsum macer. sacch. alb. iij.
unc. vi. aq. ras. lib. s. stent seorsim in infus. per 2. vel 3.
dies sapius de die agitando tandem simul miscantur, & per
Manicam trantmittantur. dos. cochl. i. vel ij. ieiuno stoma-
cho.

Vinum Hippocraticum. ℞. Cinam acutiss. unc. ij.
mac. charyoph an dr. ij. Cardum min. dr. i. s. Cort. Cit.
extern: unc. i. infund: in Vin. alb. generos. lib vi. stent in
loco tepido per triduum Colat: edulcor: Sacch. alb. unc. x.
Col. iterum bis vel ter per manicam Hippoc.

Resa solis ℞. ror. sol. rec. m. ij. nuc. mosch. Co-
riand. anis. ros. rub. sicc. an unc. s. galang. 22. charyoph.
an dr. ij. glych. unc. i Cardam Zeduar gr. parad. Calam.
aram. an dr. s Sant. cit. dr. i. Sant. rub. Cinam an dr.
vi. aq. vit. opt. lib. vi. infunde per dies aliquot Col. per ma-
nicam Hippoc. add. sacch. opt. lib. i. M. dos. Cochl. i. vel
alterum.

Vinum absinthiacum. ℞. herb. absinth. lib. ij. s.
Card. b. rorisum. an lib. s. sumit. cent. min. unc. ij. rad.
charyophyllat: lib: s. fl. Sambuc. Cort. cit. arant. an unc.
ij. M. incis & contrus. ad saccul: pro amphora musti s. spe-
cies zum Wermuth Wein. Mutata dosi etiam in mi-
nori quantitate lib: aliquot vini infundi poterunt, vel so-
lus spiritus absinth. in vin: dissolvi.

Aliud vinum stomachicum. ℞. rad. ennul. dr. vi. 22.
vel Zeduar. dr. iij. herb. ment. crisp. absinth. an mi. sem.
anis. dr. iij. cinam acut. dr. ii. incis. dentur ad modulum
premens. ii Vin. alb.

Mixtura stomachica. ℞. Elix. propriet. P. dr. ii.
Essent. absinth. scr. ii. sol. mac gut. vi. M. S. Magen
Essenz / darvon 12. oder mehr Tropffen auf einer
Brühe zunehmen: Alij etiam addunt iud. Chalyb.
Vel sp. sal. armon. Alij solum elix. prop. P. ad gutt. s.
vel 12. propinant.

Electuarium stomachicum calidum. ℞. Conserb.
rorism.

rosism. unc. iii. fl. tunic. unc. ii. condit. 22. chinens. unc. iii. cort. arant. unc. i. s. spec. diacinam arom. ros. an dr. 6. eubeb. unc. i. cardam. dr. ii. syr. de cinam q. s. M. f. Elect. S. Magen. stärckende Lartweg / darvon dess Tags 2. oder 3. mahl einer Nuß groß zu nehmen.

Morsuli stomachici. R. Spec. pro morsul. Imperat: unc. i. condit. 22. chinens. cort. cit. nuc. ind. an unc. i. cardam q. i. s. Cubeb. dr. ii. ol. destill. cinam gut. 6. mac. gut. 6. Charyoph gut. 6. Citr. gut. iii. sacch. albiß. in aq. Sasaph. cum cinam dissol. lib. 1. M. f. morsul. S. Magen. Wersellen.

Alij. R. gr. paradisi dr. ii. affund. aq. cinam unc. 6. stent in infus. per noct. manè Col. in Col. dissolv. sacch. albiß. unc. ix. add. spec. arom. ros. dr. ii. diarrhod. dr. i. Cardam min. scr. ii. Cubeb. dr. ii. Condit. cort. cit. arant. Cydon. an dr. 6. 22. Chin. dr. ii. Condit. 8. aromata incidantur grosso modo f. s. a morsul. asperg spixit. ros. in quo amb. gr. 6. dissol.

Alij. vaporum ascensum ex stomacho prohibentes. R. Sem. Coriand. acet. prap. unc. s. spec. aromat. ros. diarrhod. an dr. i. Condit: nuc. ind. unc. s. Carn. Cydon. dr. 6. nuc. mosch. scr. 6. Consf. ros. Vet. unc. i. sacch. albiß. in aq. ros. sol. lib. s. M. f. morsell.

Alii contra Sodam. R. Spec. diacret. Mins. dr. 6. ebor. ust. dr. i. ocul. Canc. prap. unicorn. foss. Corall. rub. prap. an scr. ii. nuc. mosch. dr. i. cum sacch. in aq. portulac. S. q. solut. M. f. morsul. S. Wersellen wider dem Saag

Rotulæ stomachales. R. Rotul. man: Christ: S. unc. ii. ol. destill. cinam gut. 6. Charyoph. nuc. mosch. an gut. iii. cit. gut. ii. M.

Aliæ etiam bibitoræ dictæ. R. Sem. Coriand. prap. scr. i. sanc. anis. Carv. an dr. i. nuc. mosch. scr. ii. mac. scr. i. 22. Cardam. Cubeb. Charioph an scr. i. pipere alb. long: an gr. 2. cum S. q. sacch. in aq. Carminat. Solut. M. f. rotul: S. Magen. Zeltlein.

Aliæ contra Sodam. R. Succ. liquir. inspiss. sacch. cand.

cand: alb. an unc. i. cret. colon. dr. ii. cum mucilag. gum.
tragac: vel arab: ex aq. veron. fact. M. f. trochisc. lupi-
nar. S. Zeltlein wider den Saar.

Pulvis stomachicus. R. pulv. stomach. Birman:
unc. s. vel i. detur ad scarul: S. Magen-Pulver / dar-
von 3. Messer-Spiß voll auß einer Brühe oder Wein
zu nehmen.

Alius. R. pulv: cort: arant: dr. ii. tart. vitriol.
sal. absinth. an unc. i. M. f. pulv. Vel R. rad: aron.
succ: pulv unc ii sal. armon unc. s. rad. calam. aro.
mat. dr. ii. cinam mac. an dr. i. Charyoph. ser. i. M. f.
pulv.

Alius. R. Pellicul. interior ventria capen. unc. ii.
nuc. mosch: mac. sem: Coriand: anis: fenic: an dr. i. S.
ment: dr. s. glych dr. i. Rhodofacch. unc. i. M. f. pulv.
cuius dos. 2 dr. i. ad dr. ii.

Pulvis Pepticus. R. flaved: cort. exter. arant. can-
de fact: & minutim incif. unc. ii. confect. sem: coriand.
un. ii. anis: carv. fenic: an unc. i. spec: arom. ros dr: ii.
sal. absinth dr. s. ment. pulv ser. ii. facch: cand. ad pon-
dus omnium M. f. pulv. gross. dos. dr. i. post singulos
pastus.

Tragæa stomachica. R. Cubeb. dr. ii. cardam.
zz. nuc. mosch. an dr. i. charyoph: dr. s. cinam. acut. dr.
ii. ol. cit. gut. ix. facch. ros. tabul. ad pondus omnium M.
f. trag: S. Magen-Ersetz / darvon ein Löffel voll
nach jeder Mahlzeit entweder für sich selbst / oder auff
einem Schnitt Wein und Brodt zu nehmen.

Alia. R. Coriand: prep. unc. s. sem: fenic. anis: an
dr. ii. cinam. charyoph. an dr. i. s. facch: ad pondus om-
nium duplum M. f. pulv. de quo capiat cochl. i. post singu-
los pastus nihil de super edendo vel bibendo.

Alia. R. sem: anis: fenic. coriand. an dr. i. pan. bis-
coct. Hispan: nuc. mosch. an dr. ii. charyoph. ser. iv.
cinamom: dr. ii. facch: fin. unc. iii. M. f. trag.

Alia R. sem. coriand: prep. unc. s. cinam spec. arom: ros. xx. mac. sant. cit. rub: an scr. i. confect. man: Christ: unc. iv. S. M.

Alia in ardore stomachi. R. Nuc. mosch: No. ii. magist. ocul: tanc: mat. perl. succin: prep. cc. usq. prep. an scr. i. sacch. cand: aib. unc. ii. fol. aur. No. vii. M. f. pulv.

Linimentum stomachicum. R. ol. nuc. mosch. per express. dr. i. s. succin: rectif. bals. peruv. an scr. i. M. Vel R. Bals. peruv. ol. nuc. mosch. express: an dr. ii. tharyoph. scr. i. mastich. destill. scr. s. laurin: dr. ii. gumm: ladan. in ol. absinth. dissol. dr. vi. M. S. Magen-Salbl.

Balsamus stomachalis. R. ol. dest. juniper. dr. i. ment: absinth. an dr. s. mac. charyoph. an scr. s. cinam gut. v Bals. peruv: scr. i. ol. nuc. mosch: q. S. M. f. Bals. S. Magen-Balsam / den Magen und das Herzgriebel darmit warm zu schmieren / und ein warmes Tuch darauff zu legen.

Emplast. stomachale Craton. R. Ladan. unc. ii. cer. unc. iv. ol. nuc. mosch. expr. dr. iii. M. S. Magenpflaster mit Zendl überzogen / auflegen.

Alud. R. Empl. de mast. unc. i. spec. arom. ros. dr. i. ol. nuc. mosch: expr. q. S. M. f. Empl. Vel R. cerat: stomach: Galen: un. i. ladan. el. unc. s. ol. mast. vel nuc: mosch. q. S.

Aliud. R. Empl. de crust. pan. de tacamach. an dr. iii. malax. cum ol. mastich: add: Bals. peruv. parum. Vel R. Gumm: iacamach. ladan. an dr. iii. mast. dr. i. charyoph: dr. s. cer. flav. dr. iii. S. ol. destill. mast. gut. xv. ment. absinth. an scr. s. Bals. peruv. scr. i. M.

Cataplasma stomachicum pro sistendo vomitu. R. ferment pistor. unc. ii. vel iii. pulv. ment. crisp. nucist: mastich. an dr. i. theriac. androm. dr. ii. acet. ros. q. S. M. pro Catapl.

Aliud stomachicum corroborans. R. panem mel-
lis.

Dr. Lebogetten & pl. coq. in Vin. Hipp. vel multo. s. q. ad
 consist. Catapl. add. mac. cinam. war. mosch. Charyoph. &
 pl. s. s. Magenstärkendes Mischl. warm darauß
 zu legen.

Sacculus Stomachalis. R. Comar. ment. absinth.
 Lavend. an. m. a. mast. nuc. mosch. racemach. an. dr. i. st.
 anth. Lavend. ros. an. m. s. omnia in tra & sp. absinth. &
 sorata includ. saccul. qui gestetur in regione. stomachi.

Alius. R. Menth. absinth. an. m. bacc. laur. unc. s.
 rad. cyper. galang. Charyoph. sort. cit. cinam. mac. an. dr.
 s. mixta & conquis. includ. saccul. ex sindon. rub. s. mo.
 q. coq. & calide applicando.

Alius pro compescendo vomitu. R. Herb. absinth.
 ment. crisp. an. m. rad. torment. unc. i. thur. mast. an.
 unc. s. coriand. dr. ij. ros. rub. nuc. mosch. mac. an. dr. s.
 in is dentur pro saccul. coq. in Vin. & acer. an. p. aq. qui
 calide Ventracula admoveatur.

J. VIII

De Officio Medici in considerandis & prescri- bendis remediis Hepaticis.

Remedia Epatica sunt, quæ respiciendo vel vasa,
 quibus refferissimum est Epax, vel humores & in
 primis bilem, vel villos, tonilnque fibrarum &
 robur acinorum glandosorum eidem amica sunt, ac af-
 fectibus ejus succurrunt. hinc agunt vel vasa obstructa
 aperiendo, eadem extricando, bilisque amurcam, ac
 viscedinem mucilaginosam expediendo, qualia sunt
 amara, aromatica, acria, acida, ac absorbentia sali-
 po: alcalina & martialia, atque horum usus est in
 Ictero, cachexia, hydropo, affectu hypochondriaco &c.
 Vel agunt bilem merrem, aquosam, vel viscidam, aut
 particulis salinis & sulphureis volatilibus haud Instru-
 ctam

Itam aciendo & restaurando, qualia sunt incidentia cum sulphurea, oleosa, atomatica, spiritiosa. Ballamica tum imprimis sale volatili pollentia & acria, tum absorbentia humores austeros, acidos, figentes, atque horum usus est in cachexia hydropo, anasarca, sphyribis, tumoribus puitosis &c. Vel agunt bilem acriorem & copiosam vel nimis mobilem temperando, ac refranando, qualia sunt diluentia, acida, terrea, absorbentia vel tonum roborando & villos firmando, qualia sunt leniter stiptica cum partium tenuitate ac imprimis amara, ubi etiam absorbentia vitriolata & martialia, quæ maximè sunt Epatica lèteri, chlorosis, hydropis, scorbuti, affectus & Melancholix hypochondriacæ unicum & summum remedium, magis tamen in laxis & præ humidis, quam siccis subiectis.

II.

Circa horum usum Not i. non esse aperiendum circa diluentia ac humores fluxiles reddentia, hinc acidula asylum, & extremum plurium morborum sunt remedium, quod vires aperiennes Vitriolicas & martiales plurimo diluente humore habeant immerfas. 2. Acidulas, de quibus jam supra specialiter dictum conducere, ubi salvis pulmonibus, & visceribus diluendi ac temperandi humores præcipuè biliosi, ac laxitas villorum corrigenda, & quidem in habitu corporis magis sicciori & squallido: thermas contra, ubi humores acidi magis exsuperant, & corpus laxiari gaudet habitu. 3. Dulcia exceptis passulis faciliè bilescendo hepar lædere. 4. In affectibus Epatis ita adstringentibus, tonicis utendum esse, ne obstruamus, hinc consultissimum, aperiencia moderati adstringentibus, & vicissim 5. Etiam exterius Hepatica locum habere, quatenus mediantibus poris virtutes interiùs fibrant, licet refractè agant, imprimis in dolore vel ardore dextri Hypochondrii.

Formulæ

Remediorum Hepaticorum.

DEcoct: antiepticum Lindan. R. rad. cich. auz tarax unc. ij. chelidon. m. à dr. vi. ad unc. i. herb. endiv. aut cich mi. s vel m. ij. fragar. mi. s. marrub. m. s. tart. alb. ab unc. s. ad dr. vi. fol senn. dr. vi. coq. in aq. & vin. an S. q. vase clauso hinc. R. lib. ij. pro usu addendo si prestantius volueris cuilibet dos. sp. tart. rectif. scr. i. M. præmilio vomitu saluberrimum est.

Aliud. R. stercor. anser. ras. ebor. an. unc. i. chelidon. cum tot. ling. cerv. fl. hyper. an. unc. m. j. croc. dr. S. vin. alb. aq. font. an lib. i. coq. ad dimid. f. Col. add. sacch. alb. q. S. & Clarif. iv. album. ov. dos. unc. v. bis in die.

Infusum antiepticum Riverij. R. rad. rub. tinct. unc. s. fol. chelidon. m. mi. sumit. absinth. pont. cent. min. an pi. cinam dr. s. croc. scr. s. inf. per noct. in vin. alb. unc. vii. Col: add. sacch: alb. unc. s. M. capiat m. 3. horis ante Pastum hoc p. p. Ictericum recentem plerumque radicitus evellit per 6. vel 7. dies usurpatum.

Decoct: antihydopicum. R. rad. bryon. rec: unc. i. asar. unc. s. sal. tart. dr. ii. infund. in S. q. aq. s. stent in loco tepido per noctem manè add. rad. vincetox. dr. ii. sumit. abstnt. mi. fl. bellid. m. s. bacc: juniper dr. iii. incis. & contus. confund. simul ac coq. in aq. s. q. de Col. R. lib. i. s. add. sp. sal. armon: dr. ii. de hoc decocto capiat ter in die bonum haustum.

Mixtura antihypochondriaca. R. mixtur: s. unc. s. Essent. cent. min. cochlear an dr. iii. trifol. fibr. dr. ii. tinct. mart. dr. i. S. M. S. Eröffnend: Essenz / darvon 15. Tropffen auß einer Brühē oder Wein zu nehmen.

Vinum anticachecticum. R. chalyb. prep. dr. vi. rad. ennul. rec. unc. ii. fol. absinth. utriusque an mi. passul. corinth. dr. vi. fol. senn. unc. ii. vin. alb. lib. iv. infund. frigide per 24. horas. dos. unc. iv. m.

Cere-

Cerevisia medicata anticachectica & antihypochondriaca. R^z. rad. cich. rec. lib. s. ennul. rec. unc. ii. herb. scolopend. lib. s. card. b. m. iii. bacc. Juniper lib. iii. incis. & contus. dentur ad. saccul. pro 60. mensur. cerevisie, qui in liquore relinquendus, donec eius peracta fermentatione fiat transvasatio.

Alia Butleri. R^z. beton. salu. agrim. Cochlear. absinth. Rox. an. miii. rad. ennul. raph. rust. an. unc. iv. M. f. saecul. pro cerevis. cong. viii. mutatis mutandis etiam ex his vina alterantia fieri possunt.

Brodium aperitivum. R^z. rad. cich. fanic. petrosel. an. unc. s. passul. exacin. unc. i. croc. scr. s. mac. scr. s. incid. & ventri Gallinae abscissis alis, collo & pedibus indantur, coq. in s. q. aq. donec. caro ab ossibus separetur, servetur inscutum pro pulv. aperitivis in eo exhibendis.

Electuar. Epaticum. R^z. conf. ros. tichor. cochlear. an. unc. i. spec. diatrionsant. diarrhod. abb. an. dr. i. arom. ros. dr. s. condit. rad. cich. unc. s. nuc. ind. dr. ii. jyr. capill. ven. q. s. M.

Aliud. R^z. conf. fl. absinth. capill. ven. tamarisc. an. unc. i. condit. rad. ennul. cort. cit. an. unc. s. myrob. condit. N. 1. nuc. mosch. condit. dr. iii. confect. alk. dr. ii. spec. diarrhod. abb. dr. i. sal. absinth. tamarisc. an. scr. ii. croc. scr. i. amb. gris. scr. s. cum s. r. de Cort. cit. M. f. opiat. cuius dos. magnitudo Castan per 15. dies.

Aliud. R^z. passul. corinth. mund. lib. s. coq. in vin. vet. ad consist. pult. per setacum traiectis add. conf. anth. cort. cit. condit. an. unc. i. cinam. acut. spec. arom. ros. diatrionsant. an. scr. ii. aloës odorif. scr. i. croc. scr. s. M. Leber- stärke- und Lattwergen.

Pulvis aperitivus & digestivus. R^z. sal. absinth. cent. min. card. b. magist. ocul. cant. tart. vitriolat. an. scr. ii. M. f. pulv. s. Digestiv- Pulver / darvon 2- oder 3. Messer- Spiz voll zu nehmen, auff einer Brühe

Alius.

Alius. R. *Croc. mart. apert. scr. s. pulv. Epac. rub.*
fol. absinth. chelidon. mai. cens. min. an. scr. s. deoid. in & iij.
p. aq. sumendas exbrodio aperterbo Pulveres Cachectici
videantur superius de Chalybeatis.

Pulvis antielectricus expertus Timzi. R. *Semin.*
aquileg. dr. vi. croc. oriental. dr. i. tart. vitriolat. dr. s. M.
F. pulv. divid. in 7. p. aq. sumendas ex vino calido per 7.
dies continuos.

Pulvis præcipitans absorbens. R. *Ocul. canc. præp.*
corall. rub. præp. an. dr. ii. matr. perl. præp. cc. ust. præp.
an. dr. i. fol. aur. N. & M. F. pulv. dos. scr. ij. Scl. dr. s.

Alius Specificus. R. *Ocul. canc. præp. corall. rub.*
præp. unicorn. Ger. an. dr. i. antihæc poter. dr. i. s. cinab.
nat. cinab. antim. an. scr. s. extr. castor. scr. i. M. F. pulv.
Scl. cum solutione tragac. Pilul. potest prorenata etiam ali-
quid addi de laud. op. Scl. theriac. calest.

Tragra Epatica. R. *Spec. diarrhod. abb. scr. s.*
diatrion. sant. arom. ros. an. scr. ii. sacch. ros. tab. unc. i. s.
sacch. cand. alb. unc. ij. ol. destill. anis gut. xv. M. S. Le-
ber starkendes Trivech.

Alia viscera abdominis roborans. R. *Spec. diarr-*
hod. abb. diatrion. sant. an. scr. ij. diacurcum. dialace an.
scr. i. cinam. opt. dr. ii. nuc. mosch. dr. i. mac. Charyoph.
cubeb. cardam. an. scr. s. Corall. rub. præp. dr. i. fol. aur.
N. ij. sacch. albiss. unc. viii. M. F. trag.

Epithema Epaticum frigidum. R. *Aq. endiv. ros.*
portul. nymph. aceros. an. unc. i. s. acet. ros. unc. i. pulv.
ros. sant. rub. spic. ind. an. scr. s. spec. diarrhod. abb. dia-
trionsant. an. dr. s. M. S. Leberüberschlag.

Vng. deoppilativum. R. *Vng. deoppilat. unc. i. s. ol. de-*
still. carv. scr. ii. M. Vel R. Vng. deoppil. carmin. an. unc.
i. s. ol. dest. Charyoph. gut. & mac. gut. iii. lig. Rhod. gut.
ii. M. Vel R. Vng. suntal. dr. x. deoppil. dr. & ol. dest.
lig. Rhod. scr. s. ol. absinth. q. s. M. S. LeberSalben.

Aliud. R. *axung. malendinar. peng. Capon. an. unc.*
i. ol. Capp. nat. absinth. an. dr. ij. ung. de alch. popul. an.
unc. s. cer. parum. M. S. DmcrwarSalben.

Pulvis

Unguentum Hepaticum frigidum. R. *Cerat. santal.* *unc. i.* *succ. cichor. rec. expr. unc. ij.* *bull. ad succ. consumpt. add. ol. ros. de Capp. an. unc. s.* *acet. ros. dr. ij.* *M.* *Vel.* R. *Succ. endiv. cich. portul. an. unc. s.* *mass. cerat. santal. unc. ij.* *coq. ad succ. consumpt. add. ol. ros. nymph. sing. infigid. Galen. an. unc. s.* *M. S. Ruchlende. Leber. Galben.*

Emplast. Hepaticum. R. *Vng. santal. dr. vi.* *puls. ros. dr. i. s.* *sol. dest. lig. Rhod. gut. xlv.* *camph. gr. lv.* *the. reb. & cerap. parum M. F.* *Emplast. inducendum corio cooper. sind. rub. S. Leber. Pflaster.*

Plura de Hepaticis vide de præparantibus & Martialibus quæ omnia huc spectant, & de quibus supra.

§. IX.

De Officio Medici in Considerandis remediis spleneticeis antiscorbuticis & Nephriticis.

I.

Medicamenta splenetica sunt, quæ licet familiaria affectibus illius succurrunt, & quidem vel motum sanguinis & feri incolatorio hoc suo retardatum tollendo, ac humores ponticos, acidos & austeros sanguinis partes volatiles figentes corrigendo, qualia sunt aquæ, diluentia & temperantia, leniter amara & aromatica, alcalina fixa & volatilia, alcalina terrea & præcipuè Martialia, quæ merito hypochondriacorum & scorbuticorum panacea sunt ac dicuntur, atque hæc profunt in obstructionibus viscerum, initio hydropis, cachexia, palpitatione cordis, doloribus & tumoribus hypochondriorum; Immo cum hypochondria sint fomes quasi omnium morborum, hæc ipsa quoque ad affectus capitis & nervorum sympathicos spectant, vel agunt feri statum volatiliorem seu ejus acrimoniam & lixiviositatem respiciendo, unde phlogos

goses, ebullitiones, & rarefactio sanguinis major; dolores Arthritici, scorbutici vagi, sudores colliquativi Nocturni vigilæ, inquietudines pavores &c. quibus medentur tum aqua diluentia, tum acidula, austeriuscula, stiptica, terrea vel respiciendo obstructions, ac recrementa pituitosa, tartarea limosa sero immersa & facile in sabulum cænosum, arenulas vel calculum ipsum fatiscencia, qualia sunt aperientia generosiora, ut acida, alcalina & crassa, aromatica, abstergentia, diuretica & Nephritica.

II.

Circa usum remediorum Splenicorum Not. 1. uti jam supra dictum acidulas & thermas unicuique sæpe esse Splenicorum remedium. 2. Martialia hypochondriacorum panacæam esse & dici. 3. a præcipitantibus hypochondriacos & scorbuticos haud exiguum quoque accipere levamen. 4. Variare Splenetica pro vario & diverso ægrorum Splenicorum statu. Nam sicuti volatilia tam salina quam spirituosissima aromatica nocent in affectu lienis calido, ita prosunt in frigido. 5. Acida subinde etiam inter Splenetica numerari posse præsertim vi incisoria in humorum fixitate, vel fixatoria in nimia eorum rarefactione. 6. Diluentia uti aperientium ita & Splenicorum actionem adjuvare præsertim ubi serum non abundat vel stagnat. 7. Lienem volatilioribus, & magis activis gaudere Medicamentis, quam Epar. 8. Dulcia etiam Spleni minus amica esse eo quod vi fermentativa potius exsuscitent fervidos, salios & acres humores adjecta simul bile, quæ in omnibus Melancholicis simul peccat, unde hysterica, epileptica & similia symptomata facile si non excitant, saltem exasperant.

III.

AD Medicamenta splenica reducuntur etiam remedia
antiscorbutica scorbuto præcipue dicata, quæ salē
 volatili abundantia fermentationes corrigunt, crassos
 & crudos humores penetrant, eosque subtiles & tenues
 reddunt, acidum vitiosum destruiunt, obstructions res-
 serant, humoresque peccantes hinc inde discutunt, &
 Per urinas evacuant. Circa usum horum Not: 1. cali-
 dioribus & actionibus cautè utendum esse præsertim
 in corporibus rarioris texturæ, & calidioris tempera-
 menti vel saltem temperatis & blandè acidis miscenda
 ut v. g. Cichor. acetos. succ. cit. vel quod optimum
 sero lactis. 2. Dulcia non facilè exhibenda, ac præ-
 cipue à saccharo nimio abstinendum esse. 3. Simpli-
 cia antiscorbutica recentia & eorum succos aut conser-
 vas præferenda esse compositis artefactis & præcipue
 decoctis vel extractis, cum sal volatile eorum facilè
 dissipetur & evanescat. 4. In eorum usu per 14. dies
 & ulterius insistendum esse & 5. vel 6. die lenitivum ex-
 hibendum.

Formula

Remediorum splenetorum, & anti- scorbuticorum.

Remedia splenetica eadem ferè, quæ Epatica, mar-
 tialia & præparantia aperitiva, hinc suis locis vi-
 deantur.

Vinum antiscorbuticum. ℞. rad. armorac. rec. tes-
 salatim incis. unc. iv. sem. cruc. conquass. unc. i. affund.
 vin. Rhen. une. iv. stent in infus. per triduum hinc Cola-
 dein. ℞. fol. ret. cochlear. nasturt. becabung. anmii. in-
 cid. & teratur in mortar. marmor. affund. colat. superio-
 rem, stent per diem & noct. hinc. exprim. sub prelo fortif-
 sine & col. per Chart. empores. addendo tantillum saccha-
 pro delicatioribus.

Aliud

Aliud R. herb. rec cochlear nasturt. aquat. an nig.
becabung. acetos. an mij. contund. in mort. marmor. affun-
dendo Vin. Rheman in quo rad. armorac. tessulatim incis.
per triduum macerat. lib. 6 stent in Infus. per diem &
noctem, hinc exprim. fortissime & Colet. add. succ. cit. rec.
unc. 6. sacch. parum M. dos. ab unc. iij ad 6j.

Aliud. R. herb. Coch. rec. nasturt. fumar. an mij. rad.
armorac N. r. annul. unc. 1 passut. dr. 6. Contus. & Can-
guass. includ. nodulo infundendo vino. Vel si phlogosa
exites ferolact. Vel lact.

Cerevisia antiscorbutica. R. Fol. cochlear. Carda-
min becabung. trifol fib. an. m. 6. Epat agrim. ling. co-
ruin. an. mii absinth. Rom mii. rad. raph. rust. unc. iij.
rad. 5. aperient cicbor. an. unc. ii sein carbo. unc. i. s. corr.
exter. limon. N. 6. 6. pass. exacinat lib. ir f. saccul. pro
uonig. 6i cerevis.

Mixtura antiscorbutica. R. Mixtur. s spirit. cochl.
nasturt. bacc. Juniper. Essent. trifol. fib. an. dr. iij. M. S.
Essenz Wider den Scharbock / darvon von 20. bis
30. Tropffen einzunehmen.

Succi antiscorbutici. R. Succ. rec. expr. cochlear. lib.
1. nasturt. aquat. Becabung. an. unc. iij fumar. cicbor.
acetos an unc. ii mixta precipit. cum succ. cit s. Schar-
bocks Caffe / darvon 4. Unzen täglich in einer Be-
he zu nehmen Vel per se cum dr. 1. s. aq. cinam.

Alii. R. Succ. rec. expr. cicb. fum. becabung. nasturt.
aquat. cochlear an. dr. iij. fer. lact. capr unc. 6. M.

Brodium antiscorbuticum. R. Becabung. nasturt.
aq. Cochlear. acetos. Hispan. an. M. S. raph. mar. unc. 1.
minutissime concis. affund. brod Carn fer. lib. 1 per pan-
nam fortiss. exprim. dos. M. 6. 6. unc. 6. cum gut. 20 Vel
an. Essent. trifol fib.

Electuarium Antiscorbuticum. R. Pom. cit. rec. una-
cum Cort. incis N. iij fol. Coch. rec. mij. nasturt aq. m.
6. acetosell. mi. Contund. in mort. marmor. & cum pauco
sacch. f. Elect. S. Scharbocks Landerger.

Aliud. R. Cons. ros. ansig. unc. ii. fagar. Cochlear.

an. unc. i. s. pulv. troch. de Siper. unc. s. Syr. scelotyrb. fo-
rest. dr. vi. Vel q. s. M. ad ficiat.

Pulvis antispleneticus. R. Crem. tart. Chryst. tart.
an. dr. ii. sal. scolopend. tamarisc. frax. luniper. an. dr. s.
ol. mac. scr. S. M. F. pulv. s. Miltz. eroffnendes dig-
gestiv. Pulver.

Vnguent. Spleneticum. R. Ol. Chamom. laur. cap-
par. absinth. an. dr. ii. ung. Carmin. minf. unc. i. Cerat.
de Cicut. unc. s. M. S. Miltz. Salben.

Emplastrum spleneticum. R. Empl. de bacc. laur.
dr. vi. iacamach. unc. s. Bals. peruv. dr. i. cer. dr. ii. M.
F. Empl. sindone Contegendum Vel R. Empl. splenet.
Cerat. de ammon. an. dr. vi. M. Vel R. Cerat. de Cicut.
santal. de bacc. laur. an. dr. vi. malax. Cumol. Capp. &
F. Empl.

Formulæ.

Remediorum Nephriticorum.

Videantur de diureticis & lithontripticis.

S. X.

De Officio Medici in considerandis & prescri- bendis Hystericis seu uterinis.

I.

Medicamenta Hysterica seu uterina sunt, quæ
utero appropriata affectibus illius succurrunt &
quidem I. vel menses movendo, quatenus vel
vias uteri occlusas referant, vel sanguinis qualitatem vi-
ciosam, pituitosam acidam ad motum ineptam corri-
gunt, ut orgasmum menstruum recipiat, vel sanguinem
fundunt, & archæum uteri excitulant, vel humores
acidos, austeros, stipticos sanguinem nimis fixos &
concentrantes tollunt, ut maxime sunt chalybeati sine
quibus

quibus vix aliquid proficitur, vel uterum immediate abstergunt, ac humores pituitosos tartareos ac mucilaginosos vasa obviscentes expediunt, poros dilatant, & uno verbo vias liberas & patulas, naturamque ad excretionem blandè sollicitant, atque hæc remedia dicuntur *Emenagoga* suntque vel volatilia oleosa, vel salina, volatilia, amara, aromatica ac præsertim martialia, vel 2. Fætus & secundinarum exclusionem promovendo, quatenus vel acrimonia irritante fætum ad calcitrationses & agitationes irritant, aut uterum stimulant, vel naturam roborant, aut vias emolliunt aut spiritus animales majori copia ad fibras uteri proliciunt atque hæc dicuntur *partum facilitantia* suntque vel emollientia vel confortantia Balsamica & nervina, vel stimulentia tum salina, tum sulphurea, vel 3. Agunt fibras uteri nerveas & membranosas roborando per nervina, spiritiosa, aromatica vel 4. Flatus & halitus seu impuritates circa & in utero stabulantes discutendo vel 5. Tandem humores ex travasatos circa uterum stagnantes resolvendo, aut humores, acidos, lancinantes absorbendo ac figendo.

II.

IN usu horum Not. 1. *Emenagoga* Vrgente & aurigante natura non quietâ vel invitâ existente propinanda esse. 2. Eadem etiam esse fætum exturbantia, hinc gravidis nunquam exhibenda. 3. Eadem justo tempore, id est, ante solitum fluxum vel novi lunium in primis data, & sæpius repetita felicissime luvare. 4. Optimum tempus movendorum mensium esse verum, hinc maxime consultum illo tempore 6. vel 8. diebus ante mensium tempus operari. 5. Infætu excludendo naturam malle duci, quam pelli, unde talia medicamenta non propinanda, nisi constet de doloribus aperitivis parturientium & actuali nisu ad excernendum, & sic quo natura magis indiga, eo magis luvanda ut in fætu mortuo, secundinaretenta. 6. Non exhibenda esse partum luvantia.

tia

tia, nisi constet de situ Infantis naturali ad partum. 7. tum puerperis in genere, tum speciatim in secundinis retentis convenire bezoartica, putredini resistantia, & uterum purgantia. 8. Dulcia Hystericis exosa esse, & quidem illis maxime, quibus vel fermentum peregrinum uterum inquinat, vel nervosum genus affectum, vel fermentum peregrinum uterum inquinat, vel nervosum genus affectum, vel vaporosa miasmata infestant, nam iis subinde conferunt, quibus vis fermentativa sanguini inducenda ut in suppressione mensium. 9. Acida pariter vix non omnes lædere hystericas fixatis humoribus & irritatis membranis, licet uterum non omnia lædant. 10. In casu dubio, an menses sint suppressi, vel fœmina gravida vix ultra martialia ascendendum, cum hæc non noceant, sed simul roborent. 11. Clysteres uterino egregie quidem elutriare & abstergere uterum: virginibus verò & gravidis non convenire velut & pessos ac similia topica.

Formulæ

Remediorum Hystericorum & uterinorum.

DEcoctum Emenagogum. R. Rad. Fenic ap. rub. tint. pimpinell. an. unc. s. herb. puleg. arthemis. serpill. calaminth. mont. meliss. an. M. S. fl. cheir. calend. an. p. i. Cic. rub. unc. i. s. bacc. laur. unc. s. sabin. dr. iii. sem. mil. sol. anis. an. dr. iii. Cinam. acut. dr. vi. incis. & conquass. coq. in s. q. aq. s. in Col. lib. i. s. dissolv. syr. de arthemis. unc. iii. mixta Clarif. & filt. add. essent. croc. gut. xxx. M. S. Trand wider die verhaltne Monatzeit darvon Morgens vnb Abends ein Trunct darvon zu thun.

Aliud. R. Arthemis. rub. m. i. s. calaminth. orig. meliss. mentast. puleg. an. M. S. rad. ostrut. fanic. petrosel. pimpinell. cors. arant. an. dr. ii. s. bacc. Juniper. unc. i. sem.

6. sem. fanic. petrosel. genist. hyper. an. dr. iii. coq. in Vin.
alb. s. q. Col. & bibatur m. bono haustu.

Julepus Emenagogus R. Succ. limon. lib. s. cum s.
q. sacch. f. instar Iulapii ad ignem addendo sub finem Croc.
q. s. ad saturatam flovedinem S. Besonder Zeit treis
bendes Julep / darvon 3. Löst. voll 2 mahl im Tag
zunehmen vnd 4. Tag zu continuiren.

Iulapium Hystericum Camphoratum. R. Camph.
dr. ij. incende & sapè extingue in aq. font. lib. i. ad totalem
Camph. consumptionem Col. dentur cochl. 4. Vel 5. sapè in
Paroxysmo Hystero.

Iulapium Hystericum frigidum. R. As. foetid. dr. i.
s. solb. in aq. Ceras. nig. unc. vi. sine calore in mortar, frig.
ut lactescat. sumatur Cochl. i. in initio & sine Paroxysmo.

Iulapium Hystericum moschatum. R. Aq. namph.
unc. vi. mosch. scr. s. sang. drac. scr. i. M. pro 2. dos in Pa-
roxysmo.

Potiuncula ad distokiam vel centies experta. R. Aq.
meliss. arthemis. cinam. hyster. an. unc. i. myrrh. cl. scr. i.
s. succin. alb. prap. scr. i. Croc. scr. s. M. F. potiuncula actu
calidè haurienda & intra 4. horas repetenda, si prima non
fortiatur effectum.

Mixtura Hysterica. R. Aq. meliss. Borrage. an. unc.
ij. s. marg. brap. scr. i. s. Castor. gr. 6. Camph. gr. ii. M. S.
Herg. vnd Mutter. Wasser Löst voll weiß Juge
brauchen.

Alia. R. Aq. Ceras. nig. rut. hysteric. alb. an. unc. ij.
Castor. in nodulo ligat. & in vitro suspens. dr. s. Sacch. q.
s. M. F. In ap. de quo capiat Cochl. 4. Vel 5. in omni lan-
guore in stillando prima dosi, si Paroxysmus urgeat sp. CC.
gut. xx.

Alia. R. Aq. meliss. puleg. fl. Chamom. an. unc. i. s.
vinet. Castor. cum sp. sal. armon. fact. dr. s. spirit. meliss.
scr. i. ol. destill. succin. gut. ij. syr. de ment. Vel Cori. arant.
unc. s. M.

Mixtura in suppressione lochiorum. R. Elis. prop.
P. dr. i. c. Essenz. Castor. dr. i. M. dos. gut. xv. ex vi.

no calido, in quo tantillum Croc. mac. & Cinam eul-
lierit.

Alia. ℞. Aq. arthemis hysteric. mins. an. unc. i. s.
Cinam. unc. s. pulv myrrh. el. scr. i. succin. alb. prep. Ca-
stor. an. scr. s. M. prouna vice & sic pro ceteris.

Potio ad expellendam secundinam. ℞. Troch. de
myrrh. dr. i. Cinam. acut. testicul. eq. prep. an. scr. i. Croc.
orient scr. s. Borrac gr. v. aq. arthemis. unc. ij. M. pro
una dos.

Vinum Emenagogum. ℞. Rad. Curcum. scr. ij. di-
clamn. alb. dr. s. Cast. lig. Cinam. acut. an. scr. iiii. herb.
meliss. puleg. an. mij. Cort. flav. cit. arant. an. scr. iij. Croc.
orient scr. s. M. incisa dentur ad nodul. pro mens. i. Vin.
alb. & mens. s. aq. meliss. destillat. dos. unc. iij. cum gut.
vi. Sel vii rinct Chalyb.

Aliud fortius pro secundina quoque aut fœtum mortuo
eiiciendo utilis. ℞. Fol. sabin. arthemis. dictamn. Cret.
rorism. puleg. an. m. s. rad. aristol. rot. apii. Ireos. rub.
tinct. an. unc. s. bacc. laur. dr. vi. Borrac. Venet. troch. de
myrrh. an. dr. iij. Cast. lign. acutiss. unc. s. Croc. integ. dra
ij. incis & conuas. affunde Vin. generos. q. s. stent. in in-
fus. perpetua in loco calido optimè clausa. detur singulis ma-
tutinis haustus Calidus.

Brodium Emenagogum fit ex decoct. Rad. ennul. pe-
trofel Cic. rub. cum Cinam. Croc. & mac.

Electuarium lochia provocans. ℞. Cons. absinth.
Rom. rut. an. unc. i. troch. de myrrh. dr. ii. Castor. Croc.
sal. Vol. salis armon. as. fatid. an. dr. s. cum s. q. syr. de. v.
rad. M. F. Elect. de quo capiatur magnitudo nuc. mosch.
major: tertia quaque hora superbibendo Cochl. 4. Sel s. (eq.
Iulep. ℞. Aq. rut. meliss. an. unc. iij. sacch. Cand. q. s.

Pilulæ Hystericæ. ℞. Castor. dr. i. sal. Vol succin. dr.
s. cum s. q. Bals. peruv. M. F. Pilul. N. xxiij. capiat tres
singulis noctibus superbibendo Cochl. ij. Sel iij. aq. hyster.

Alia. ℞. Myrrh. el. galban. an. dr. i. s. Castor. gr. xvj.
cum s. q. Bals. peruv. ex dr. i. N: xii. sumat 3. singulis no-
ctibus.

Aliz Camphoratæ. R. Camph. scr. ii. castor. dr. i. as. fatid. scr. iv. sem. dauc. sylv. dr. i. s. syr. de arthemis. q. s. M. F. pilul: 6: ex dr. i. vel R. Pulv: sem. vitic. unc. s. rut. as fatid. camph. an dr. i. castor. dr. ii. ol. succin. gut. xx syr de arthemis q. s. f. mass. dos. à scr. s. ad gr. xv. 3tia quoque hora in Paroxysmo Hysterico, & præserea hora somni extra paroxysmum singulis noctibus.

Pilulæ in mensium diminutione & conjuncto dolore. R. Extract. aloes Croc. myrrh. castor. an. gr. vii. laud. op gr vi. ol. sabin. gut. v M. F. pilul. N. xxviii. dos. N. vii. tribus diebus ante eruptionem mensium sub hora decubitus.

Pulvis Hystericus expertus Timæi. R. Facul. bryan. scr. ii. marg. præp. scr. i. Castor. gr. xxv. ol. dest rut. succin. alb. an gut. v. M. F. pulv. divid. in 3. p. aq. & repetitum, si opus fuerit, ori infundatur cum vino calido, in quo tantillam mac. & Croc. bullierit.

Pulvis partum Provocans. R. Myrrh. el. scr. i. succin. alb. Borrac. an scr. s. cinam. gr. viii. M. F. pulv. sumendus ex aqua lil. alb. hyster. & puleg.

Alius. R. Epat. anguill. exsicc. & pulv. vel ag. gropil. aut testic. eq. præp. à dr. s. ad dr. i. Borrac. venet. scr. i. M. detur ex aq. puleg. meliss & hyster.

Pulvis Emenagogus. R. Bacc. laur. massa panis circumduct. & inclib. coct. unc. s. sumit. cent. min. myrrh. rub. croc. an scr. i. Cinam. sabin. aristol. rot dictamn. alb. an gr xxiv M. F. pulv. dos. à dr. s. ad scr. ii.

Alius. R. Rhab. el. dr. ii. puleg. absinth. Sabin. bacc. laur. an. dr. i. mac. dr. s. Croc. scr. i. M. F. pulv.

Alius. R. Rad dictamn. alb. dr. iii. zeduar. Calam. arom. cinam. mac. Croc. cort. cit. an. dr. i. troch. de myrrh. borrac. venet. an scr. iv sem. nigell. dr. ii. fanic. tumin. anis. bacc. laur. an. dr. i. M. F. pulv. cuius dos. dr. i.

Alius. R. Crem. tart. Chryst. tart. an. dr. ii. sal. arthemis. absinth. puleg. meliss. spirit. sal. coagul. an. dr. s.

dr. s. pulv. agar. rad. asar. Gial. an. dr. ii. Rhab. ver. dr. i. Croc. orient. scr. i. troch. de myrrh. dr. i. s. ol. mac. sabin. an. scr. s. M. F: pulv. subtiliss. cujus dos. dr. i. ex. aq. meliss. puleg. &c.

Tragæa Emenagoga. R. Spec. dianth. diarrhod. abb. an. dr. i. pulv. asar. Rad: lr. cyclam. distamn. alb. aristol. rot. Cyper. gentian. xeduar. an. scr. ii. succin. alb. myrrh. cinam. an: dr. s. sem. sesel. dauc. an. scr. i. Essent. cit. saccharin. ad pondus omnium f: trag.

Edulvium in suppressione mensium. R: Herb. arthem. meliss. puleg. rorism. an. mi. s. fl. Chamora. Calendul. an. mi. bacc. laur. unc. i. s. M. incis. & contus. ad Chart. s. species. Zum Suesß Wasser.

Emplastrum matricale. R. Empl. matric. august. vel Gumm. carann. unc. i. extend. super alut. vel. R. Galb. tacamach. an. unc. s. dissolv: & extend. super alut. ac infra umbilic. applicetur vel R. Galb. in tinct. castor. solut. & Col. dr. iii. tacamach. dr. ii. M.

Suffitus humidus in suppressione mensium vel lochiorum: R. Herb. matricar. puleg. an. mi. Sabin. mi. bacc. laur. juniper. an. unc. i. pom. colocynth. unc. i. incis. grosso modo. dentur ad chart. s. species Zur Bähnung. ebul. in aq. comun. cu. us vapor fervidus excipiasur per infundibulum in sella undique clausa. si citius liquor deferbeat, iniectione silicis vel Chalyb. igniti de novo calefieri potest.

Suffitus siccus in eundem finem R. Sabin: m. s. myrrh. dr. ii. asphalt. troch. alchand. an. dr. i. M. F: pulv. Vel R: Charyoph. cinam. mac. an. dr. ii. bacc. juniper. unc. s. sem. nigell. dr. i. styrac. calam. dr. ii: M. F. pulv. crass.

Odoramentum in passione hysterica R. Castor. as. fetid. an. dr. s. ol. succin. scr. s. M. & in serico involve f. nodul. naribus admo vendus vel R. Galb. as: fetid. an. dr. ii. castor. dr. i. s. sal. vol. succin. dr. s. M. f. nodul. vel sapius ol. faciat sp. sal. armon.

Euema Hystericum. R. Decoct. commun. vel Emoll. unc. x. camph. dr. i. ol. rus. unc. s. mell. mercurial. unc. iii.

M.

V 4

Aliu i

Aliud. *R.* Herb. mercurial. pariet. arthemis. puleg.
rut. Calam an. mi. sem Carv. Cumin. bacc. laur. an. dr.
ij. coq. ad lib. s. in Col. dissolv. hier. pic. benedict. lanas. an.
unc. s. Vel dr. Si. ol. rus unc. ij. Camph. scr. s.

Aliud in Partu difficili. *R.* Herb. mercurial. malv.
arthemis. fl. Chamom. an. mi. fl. lul. alb. pi. rad. alch. Bryon.
Aristol rot. an. dr. ij. coq. in s. q. aq. in Col. unc. Si. dis-
solv. Elect. lenit. dr. Si. ol. lul. alb. amygd. d. an. dr. Si. Si.
tell. ovi. N. s. Borrac. Venet. dr. s. M.

S. XI.

De Officio Medici in Considerandis & prescri- bendis Remediis Arthriticis.

L.

Medicamenta Arthritica seu articularia sunt, quæ
articulis appropriata affectibus eorum succur-
runt tum respiciendo serum quod vel exsiccant,
ejusque quantitatem absumunt, ut v. g. china, sala-
pbras &c. Vel qualitatem ejus aciem diluunt & tem-
perant, ut lac, Emuls. &c. Aut invertunt & absor-
bent, ut martialia, antiscorbut. &c. Vel resolvunt, le-
vique fluxibilitatem facerantur ut cinnabarina, tum
respiciendo nervos, membranas, tendines & ligamen-
ta per robora, qualia sunt, quæ sulphure Ballami-
co oleoso suavi & roscido pollent, tum respiciendo do-
lorem ipsum urgentem a tensione & vellicatione mem-
branarum oriundum tum intus per Emuls. cinnabarina,
tum extrinsecus per Paregorica ac nervina, spirituosæ
sulphurea & urinoza ac præsertim è lumbricis & formi-
cis parata.

II.

Circumspectum horum Not. i. sæpè optimum Medicamen-
tum topicum arthriticum esse non uti topico, cum
sanè

sanè præstet internis tollere causam morbificam, roburare genus nervosum, & acrimoniam demulcere, quam externis inhære. 2. Cavendum esse, ne, dum per externa juvare intendimus, articulorum tonum destruiamus, vel serum nimis exhauriendo, vel nimis laxando ut magis insinuat, vel ad partes principales repellendo. 3. Dextro oculo corpus: sinistro articulos respiciendos esse, nisi malum fuerit à causa externa. Videndum igitur, ne ipsi negligantur articuli, neque etiam ipsa viscera & massa sanguinea. 4. Topica, dum blandiuntur sensui, sæpè infidiosa esse: motui adeoque ita sensui tristi medendum esse, ne motum cum sensu auferamus. 5. Non Constantem æquè effectum expectari posse à quocunque topico, cum localia sæpè ex asperent dolores & morbum, ac quæ una vice prosunt, altera noceant, atque ex his seligenda in primis defensiva & roborantia. 6. Quæcunque magis impingunt & figunt humores, præ ceteris nociva esse articulis ut repellentia. 7. Ungtuosa quoque, pinguita & emplastica minùs competere certum est in arthriticis hinc frequens docet experientia, unguenta, Emplastra & similia plùs damni dedisse podagricis: immò plures ex arthritide vaga hoc modo fixam sibi accercivisse plurimos etiam topicos adeo ut tales podagrici contracti & consummati revera captivi fiant ex Intempestivo topicorum Emplastrorum, aliorumque usu. Distinguenda igitur sunt articularia Medicamenta pro distinctionem morborum, quibus obidentur articuli.

Formulae.

Remediorum Arthriticorum.

Vinum Arthriticum Purgans. *℞. Chin. sarsapar. an. unc. ij. polyp. querc. unc. ij. Rhah: senn. an. unc. i. Gial: dr. vi. charyoph. dr. i. Sin. alb. lib. vi. inf. s. a & Col dos. unc. xv. quotidie per dies viii. Vere & autumno vel etiam imminente Paroxysmo.*

Vinum Arthriticum alterans. R. Sarsapar. quai-
 ac. an unc. i. visc. querc. dr. vi. fol. sicca chamad. chama-
 pyth. salu. an. unc. iii. fl. primul. ver. vorism. lil. guall.
 an. unc. s. hyper. dr. vi. vin. alb. lib. x. inf. per dies 3. f.
 col. dos. unc. ii. bis in die per dies 30. vel 40. post usum vi-
 ni prioris.

Vinum antipodagricum Paracelsi. R. Rad. cha-
 ryophyllat. acor. an. unc. i. fol. majoran. m. iv. fl. sambuc.
 p. iv. infund. in vin. lib. iii. stent in infus. per viii. dies
 sumatur ex hoc m. & v. haustus.

Aliud. R. Sarsapar. rad. chin. lig. sasaph. an. dr. i. s.
 rad. Peon. irid. flor. an. dr. ii. Charyoph. dr. i. herb. cha-
 med. dr. ii. beton. salu. an. dr. i. fl. hyper. primul. ver.
 an. dr. s. mac. dr. s. sem. coriand. prep. scr. iv. incid. &
 contund. pro vin. alb. mens. iii. s. detur primus haustus
 ad pastum.

Electuarium amarum Antipodagricum Sydenhaimb.
 R. Rad. angel. calam. aromat. imperat. ennul. fol. ab-
 sinth. vulg. cent. min. marrub. alb. chamad. chamapyth.
 scord. calamin. hyper. virg. aur. serpill. ment. salu. rut.
 card. b. puleg. abrot. fl. cham. tanacet. lil. conuall. croc.
 sem. Thlasph. cochlear. carv. bacc. Iuniper. an. q. pl. mell.
 despum. & vin. canariens. q. s. M. F. Elect. dos. dr. ii.
 M. & v.

Aliud R. Sarsapar. unc. iv. sem. hyper. fol. chama-
 pyth. camed. an. unc. iii. aristol. rot. dr. vi. angel. cinam.
 an. dr. ii. charyoph. scr. iv. croc. scr. ii. omnia intenuissi-
 mum pulverem redacta incorpor. cum s. q. mell. Hispan.
 coct. f. opiat. q. n. utatur ager per integrum annum sumen-
 do quotidiè diebus veris, hyemis & autumnii. dr. i. s. a sto-
 re dr. i. diebus canicularibus omnino abstineat.

Pilulæ antipodagricæ. R. Rad. aristol. rotund. long.
 an. unc. s. polyp. querc. dr. ii. cc. phil. prep. sal. vol. lum-
 bric. terrestr. an. dr. s. cran. hum. prep. dr. s. cum Gelat. cc.
 M. f. pilul. ex dr. i. N. xxx. asperg. pulv. sant. cit. suman-

tur N. vii. m. & v. per integrum annum, si affectus, radicans.

Al. R. Pulv. castor. opt. unc. s. succin. alb. chamad. chamap. th. an. dr. vi. sal. succin. ceruss. antim. Bals. zolut. an. unc. i. rad. peta sit. dr. iii. thereb. venet. unc. ii. Bals. sulph. thereb. q. s. M. F. massa pilularis dos. dr. s. bis in die per menses duos vel tres bibendo proposum decoct. sarsapar. chin. rad. peta sit cum uv. pass.

Pulvis antipodagricus. R. Pulv. fol. chamad. chamap. th. cent. min. major. salu. beton. rad. gent. aristol. rot. an. unc. i. sacch. lib. i. M. f. pulv. Vel R. Pulv. fol. salu. vel chamap. th. lib. s. ocul. cane. sacch. an. unc. ii. M. F. pulv. alii etiam addunt ossa humana ped. calcinat.

Pulvis Arthriticus Wepferi. R. Lumbric. terrestr. præp. unc. s. cc. phil. præp. ungu. alc. præp. an. dr. ii. ol. unc. mosch. expr. gut. iv. sacch. albiss. unc. i. s. M. dos. M. dr. i. & v. dr. s.

Alius ejusdem. R. Antim. diaphoret. cum triplonie. daton. dr. i. s. sal. vol. lumbric. vel viper. scr. ii. cinab. antim. ter. cum cinab. nat. sublimat. scr. i. cc. phil. præp. dr. i. s. ol. cinam. gut. ii. M. F. pulv.

Pediluvium podagricum. R. Rorism. hyper. puleg. Laur. arthemis. an. miii. sal. nig. lib. i. sal. armon. unc. ii. furs. mac. unc. vi. coq. in aq. cong. ii. add. sapon. venet. unc. ii. sp. vin. lib. ii. M.

Aliud ad firmandos articulos podagrâ debilitatos, ac simul à crebriore recidiva præservans. R. Bacc. luniper. lib. s. herb. rorism. m. vi. serpill. salu. an. mii. M. S. species zum Guesß. Baad. coq. in s. q. lixivii commun. non adeo acris. decocto decantato cum vel sine Col. immittuntur pedes coercendo halitus integumento vasi super imposito conservando æstus vel novo decocto vel silice candefacto immisso.

Aliud. R. Salu. rorism. chamom. arthemis. hyper. absinth. vulg. an. m. vi. sal. nig. m. iii. coq. in aq. cong. iii. ad. ii. f. col. pro footu. Fomen-

Fomentum in doloribus Arthriticis frigidioribus. R. aq. Arthrit. vel anhalt. unc. ij. spirit. Juniper. unc. ℥. s. spirit. Vin. opt. lib. s. M. vel R. Spirit. Juniper. unc. iij. ro-
 risum laGend an. unc. i. alum. crud. dr. iij. M. S. Glidero
Brandenwein.

Aliud in dolore dorsi. R. Aq. Vit. unc. vi. quibus
 infund fl. ro-
 risum. sal. laGend. maioran. an. pui. cardam.
 dr. i. castor. scr. i. stent. in Vitro probe clauso in digestionem
 Vitrum quotidie agitando, de hac aqua. R. Vnc. ij. aq.
 sal. destill. unc. s. ol. destill. spic. scr. i. M. manus im-
 buatur hoc liquore & f. frictio supra dorsum.

Aliud expertum in dolore Ischiatico. R. Bacc. Jun-
 per unc. s. piper. nig. mast. el. an. dr. s. M. F. pulv. gross.
 indendus Vitro angust. orificii superaffund. spirit. Vin. alco-
 lis. unc. ℥. s. sp. Juniper. unc. ij. stent. in digest. per hor. 4.
 vel 6. postea in Col. in mortar. frig. dissolv. sapon. Venet.
 dr. ij.

Fomentum in dolore Podagrico. R. Lapid prun dr.
 iij. medicamentos. Croll. dr. v. alum. dr. ii. sal. comm. dr.
 i. sulph. scr. ij. castor. mum. an. scr. i. myrrh. scr. ℥. Croc.
 gr. xii. infund per hor. xii. in loco calido in aq. spermat.
 ran. unc. viii. Verbas. unc. iij. Vin. alb. unc. ℥. acet. squill.
 unc. i. s. add. mell. despum. unc. i. bull. parum in duplici
 vase. Col. add. sp. tartar. scr. ℥.

Aliud. R. Tinct. croc. cum spirit. Vin. parat. unc. ℥. s.
 camph. op. an. dr. i. digger. loco calido ad dissolut.

Aliud. R. Spirit. Vin. rectif. unc. viii. sp. sal. armon.
 dr. iii. camph. dr. s. tinct. op. castor. an. scr. ii. M. vel seq.
 Wepferi. R. Butyr. antimon. dr. i. sp. Vin. lib. s. M. vel
 seq. Grulingii, quod intra 2. horas dolorem sedare dici-
 tur. R. Caput. mort. Vitriol. acet. destill. an. unc. s. opio.
 thebaic. dr. i. aq. chelidon. mas fl. sambuc. an. unc. viii.
 M.

Unguentum antiparalyticum. R. Ol. lumbric. unc.
 ii. philosoph. unc. s. Gulp laur. rutac. an. unc. i. ol. dest. suc-
 cin. scr. i. major. sal. ro-
 risum. an. gut. xv. pingued. castor.
 dr. ii.

dr. ii. M. inung. spira & latus paralyticum bis in die praemissis frictionibus.

Vnguentum Nervinum. R. Vng. nerv. unc. i. s. ol. laur. unc. s. lumbric. dr. iii. Sel R. Ol. Juniper. petrol. an. unc. s. succin. dr. ii. Sel R. Vng. nerv. unc. ii. ol. thereb. chamom. aneth. an. dr. ii. Juniper. philosoph. petro. an. dr. i. sem. urtic. scr. s. M.

Emplastrum Antipodagricum. R. Op. sapon. Venet. an. unc. s. Emplast. diacalcith. unc. ii. M. S. s. Sel R. Sacch. saturn. rub. unc. ix. oleis lib. i. sapon. alb. unc. ii. cer. unc. s. coq. s. a.

Emplastrum Ischiaticum. R. Gumm. carann. Sel apud Vulgares pic. naval. unc. s. s. extend. super allut. Sel R. pic. naval. unc. ii. sulph. commun. subtilis. trit. dr. iii. mast. dr. i. thereb. unc. s. M. posset etiam addi castor. Sel etiam Gumm. ammon. aceto dissol.

Aliud. R. Emplast. de melior. diapalm. an. unc. s. Sel Empl. diapalm. diaphoret. mins. an. unc. s. sal armon. scr. ii. malax cum ol. chamom. & lumbric.

Cataplasma anodynum antipod. R. Medull. pan. alb. unc. iii. macerentur in lact. ebull. ac coque parum, tunc adde Vitell. ovi. N. ii. pulv. fl. chamom. dr. i. croc. scr. i. M.

Aliud domesticum. R. Das riebene Kraut/ trucke solches anß von dem Wasser/ riste es in der Pfannen vnd lege es warm auff.

Suffitus in doloribus Articulorum. R. Succin. cit. unc. i. s. lign. Juniper. unc. s. thur. dr. ii. myrrh. dr. iii. M. incis. & contus. dentur ad scatul. Sel R. Succin. flav. unc. ii. mast. el. unc. s. sumit. roris. la vend. fl. calend. an. dr. vi. bacc. Juniper. unc. s. M. F. pulv. gross. cujus suffitus interea molis aliquoties complicato excipitur ac applicetur.

C A P U T. X.

D E

Officio Medici in affectibus indicantibus adstringentia, stegnotica, hypnotica, anodyna & vulneraria.

§. I.

De Officio Medici in considerandis & præscribendis remediis adstringentibus & sanguinem sistentibus.

I.

Medicamenta adstringentia sunt, quæ quidquid laxum est adstringunt uti-
lia præsertim in vomitu, diarrhæa, tien-
teria, dysenteria, Gonorrhæa, fluore
albo, aliisque similibus affectibus, vim
suam exercent vel villos seu fibras molliores, flaccidas &
expansas cogendo, roborando, contorquendo & unien-
do vel poros cutis, vasorum, meatuum & viarum cor-
rugando, crispando, colligando, incuneando, con-
trahendo, obliniendo, replendo, ac obstruendo, quo
etiam spectant *condensantia* & *Emplastica* vel humores
efferratos, fluxiles, tenues & impetuosè motos in impetu
suo coercent, ipsosque incrassando, inviscando, con-
centrando, cohibendo & refrænando. Inter adstring-
entia sunt tum terrea exsiccantia, & absorbentia, tum
acerba & austera, tum acida humores fluxiles coagu-
lantia & quasi figentia, tum emplastica, tum narcoti-
ca, martialia, tum etiam Escharotica non quidem pro-
priè,

priè , sed quatenus & humorem fluentem absumunt , &
 crustam inducunt partibus propugnaculi loco , ac etiam
 adstrictionem post se relinquunt. Huc etiam refero
 Medicamenta Ischema , seu stegnotica & sanguinem si-
 stentia , ut intra alveos suos commoretur nec extravase-
 tur , qualia itidem sunt vel respicientia sanguinis or-
 gasmus , rarefactionem , & ebullitionem ejus sistentia
 ut præcipitantia , terrea , temperantia aquea , refrigeran-
 tia acida , vel respicientia sanguinem ferosiores , fluxi-
 liorem & acriorem , ut incrassantia , adstringentia , opi-
 ata , vel vasorum oscula aperta , ut consolidantia , glut-
 tinantia , sanguinem imbibentia , coagulantia , & san-
 guinem in crustam quasi redigentia , cauterizantia ,
 quæ torrefaciendo sanguinem & vasa crispando ac oc-
 cludendo sanguinem sistunt.

II.

In usu horum omnium Not. 1. adstringentia debere esse
 convenientia tum partibus , quibus debentur , tum hu-
 moribus & causæ sic ventriculo magis conveniunt ad-
 stringentia aromatica vel acida : in affectibus pulmonū
 miscenda resolventia : in affectibus Epatis penetrantia aci-
 da , in affectibus capitis Balsamica si materia fluxilis &
 acris , magis mucilaginosa , si maligna , quæ sinul bezoar-
 tica. 2. Nunquam nimis adstringendum esse ne subsidant
 nimis pori , & hinc vix relaxari queant præsertim etiam ,
 cum subinde fluxus moderari potius quam fisti perant.
 3. In affectibus pectoris in genere parèe adstringentibus
 utendum esse tum quia tonus pulmonum laxitate gau-
 det , tum quia facile vitiosa materia ob viciniam ad cor
 repelli potest. 4. In usu adstringentium semper ratio-
 nem habendam esse ventriculi , ne fermentum ejus de-
 struatur. 5. Adstringentium vim augere anodyna vel
 opiata , ac moderari resolventia , perpetuo miscenda
 in sputo ac vomitu cruento , casu ab alto &c. 6. Vm
 ad-

adstringentium, ubi paulò post remittit, novis dosibus
lucandam esse.

III.

PRæterea. 7. Not. adstringentibus liquidis vel parti-
culas laxiores habentibus minùs fidendum esse. ut v. g.
dulcibus, syrupis, clysteribus, fomentis, Balneis, un-
guentis &c. 8. Adstringentia non commodè dari cum
cibis. 9. Fluxus sanguinis oriundos vel ab obstructione
valorum & ordinario denegato spatio vel humorum or-
gasmò & copia minùs prodesse adstringentia : plus ve-
rò v. g. purgantia, aperientia & inprimis acida. 10. Ad-
stringentia alimentosa in ventriculum debiliorem ha-
bentibus ante cibos reliquos assumpta adstringere : Post
assumpta alvum laxare. Fibris nempe superioribus con-
strictis, & inferioribus laxatis. 11. Adstringentia ex-
terna actu frigida applicari v. g. ubi repellendum ubi san-
guinis rarefactio, impetus & effusio sistenda v. g. adhi-
bita testibus, hypochondriacis, & inprimis fronti, unde
anacollemata, & frontalia ex adstringentibus actu fri-
gidis confici & adhiberi solent, cum cerebro nocere ne-
queant obstante ossium vallo : minùs frigida locum ha-
bent in Thoracis, ventriculi, Epatis & uteri affectibus.
12. Adstringentia uti & opiata in dysenteria intra 6 Vel
7. horas efficaciam suam deperdere, hinc reperenda
neque ab eorum usu cessandum. 13. Adstringentia lon-
gè efficacius adhiberi in forma sicca ut pulv. trochisc. pi-
lul, quàm humida utpote citius defluente : extrinsecus
etiam in forma Emplast. cerat. frontal. quàm foment.
Baln. clyst. unguent. &c. 14. Adstringentia non debe-
re esse in usu, quibus alvus siccior, quibus menses fluxu-
ri sunt, observandum tamen in hoc casu, quid magis
Urgeat. 15. Aromatica adstringentia ut v. g. nucem
mosch. mastich. terreis mixta diarrhæis, dysenteris &
vomitibus maximè amica esse. 16. Topica sanguinem
sistentia illis locis applicanda esse, ubi vel immediate
ad opus est, vel sanguinis magis refrigerari potest, sic
appli-

applicantur breginati, fronti, sub lingua, nuchæ, naribus, collo, hypochondriis, testibus, plantis pedum, sub axillis &c. 17. Ligaturas leniores extremorum proremorando sanguine non esse inutiles, quo nomine quoque frigida ut lapides & similia præter effluvia, quas præstant, arctius manu vel subaxillis detenta commendantur, in quibus tamen non excedendum præsertim, si impetuosus sanguinis motus conjunctus: 18. Caustica & corrosiva ad Hæmmorrhagias sistendas non æquè semper tutas esse. Nam licet initio venas adstringant ob partes stipticas, corrodingo tamen postmodum, & irritando, gravia symptomata inducere valent, hinc ignis actualis melior.

Formulæ,

Remediorum adstringentium & sanguinem sistentium,

DEcoctum Timæi comprobatissimum ad hæmophysim & reliquos fluxus sanguinis. *R.* Rad. *symph. mai. unc. i. s. plantag. pimpinell. an. dr. ij. tormentill. unc. s. alth. liq. an. dr. iiii. herb. burs. past. prunell. polyg. charesfol. consolid. med. sanic. an. mi. fl. ros. rub. hype. bellid. cum tot. an. m. s. sem. hyper. dr. iiii. incis. grosso modo inf. per noct. in s. q. aq. mane coq. de colat. cum album. ov. clarif. *R.* Lib. ii. s. add. syr. de symph. unc. iiii. de alth. unc. ij. oxymel. s. unc. i. s. M. S. Bluet stölsb. auß. haisendes Trand 3. mahl den Tag darvon zu trincken.*

Aliud. *R.* Rad. *symph. torment. glych. an. unc. s. herb. Geron. centinod. sanic. mille fol. alchimill. agrim. an. m. s. fl. ros. balaust. bellid. msn. an. pii nuc. pin. unc. i. santal. rub. unc. s. coq. in s. q. aq. font. de Colat. *R.* Lib. ii. dissolv. syr. de ros. sicc. de symph. fernel. an. unc. i. M.*

Julepus in Hæmmorrhagiis. *R.* *Aq. frag. unc. vi. burs. past. endiv. cich. ros. an. unc. iiii. syr. corall. unc. iiii. frag. papav. Errat. an. unc. i. s. succ. cit. acid. unc. ii. M. Gel.*

R. Tinct. ros. cum s. q. sp. vitriol. lib. ii. vel **R.** Syr. pro
tinct. ros. parat. unc. iii. aq. font. lib. ii. sp. vitriol. q. s. M.
Mixture stegnotica sylvii. **R.** Aq. plantag. unc. iii.
cinam. dr. iii. acet. vin. dr. iii. corall. rub. prep. terr.
fig. vel sang. drac. an. scr. i. laud. op. gr. iii. syr. myrt.
dr. iii. M. Capiat Cochleatim.

Alia. **R.** Aq. plantag. fol. querc. burs. pastor. centi-
nod. an. unc. i. s. lapid. hemat. prep. corall. rub. prep.
carneol. prep. an. scr. i. sperniol. Croll. scr. s. syr. Corall.
papa. Errat. an. unc. s. M.

Emulsio adstringens in fluxibus sanguinis. **R.** Sem. pa-
pau. alb. dr. iii. 4 Frig. m. excort. an. dr. i. amygd. d. unc.
s. aq. plantag. portul. ros. an. unc. i. s. M. F. Emuls. add.
pulv. stegnot. Guttman. scr. i. corall. rub. prep. scr. s. ro-
tul. man. Christ. perl. dr. i. spirit. frag. gut. xi. M. S. Bluet
stillende Schlass-Milch vor den Schlass zu nehmen.

Alia. **R.** Amygd. d. rec. unc. s. sem. melon. excort.
dr. ii. papau. alb. dr. i. s. plantag. dr. s. aq. fol. querc.
plantag. burs. past. an. unc. i. s. M. F. Emuls. add. lap.
hemat. prep. corall. rub. prep. an. scr. i. vellap. chrysolit.
sang. drac. nit. perl. scr. s. sacch. perlat. dr. ii. M.

Alia anti dysenterica. **R.** Amygd. d. non rancid. unc.
i. s. aq. dysenter. dorncreul. unc. iii. ros. fel. querc. an.
unc. ii. M. F. Emuls. cui add. cc. ust. prep. dr. i. marg.
prep. Corall. rub. prep. an. scr. i. spirit. rub. id. rosar.
an. scr. i. rotul. man. Christ. dr. i. s. M. S. Stoll-Milch.

Alia R. Amygd. d. excort. unc. i. s. aq. in qua aur. ignit.
ter. extinct. vel decies chalybeat. lib. i. s. M. F. Emuls. add.
man. Christ. perl. dr. vi. m. vel **R.** Amygd. d. unc. i. sem.
melon. dr. vi. papau. alb. dr. ii. cc. ust. prep. scr. ii. aq.
plantag. lib. i. M. F. Emuls. add. lul. ros. unc. i. M.

Brodiu anti dysentericum. **R.** Pimpinell. sangu. sorb.
fol. cichor. mille fol. plantag. an. m. fl. ros. rub. p. i. cum
frusto carnis f. Inscul. cui add. Rhab. tost. dr. s. vel scr. ii. m.

Electuarium in Hæmophyti longo usu probatum.
R. Conserv. ros. vetust. ss. unc. iii. s. pulv. rad. conso-
lid.

lid. utriusque sem. portulac. mastich. bol armen. tragac.
an. scr. i. s. cum syr. de symph. F. Elect. molle.

Aliud. R. Cons. ros. rub. unc. iii. symphit. unc. i. pulv.
sem. hyosc. papau. alb. an. dr. i. spec. diatrag. frig. dr. i.
s. lap. hamat. præp. carneol. præp. corall rub præp. croc;
mart adstrict. an. dr. s. vel bol. armen. terr. sig. sang.
drac. &c. Syr. papau. errat. q. s. M. F. Elect.

Electuar. adstringens in diarrhæa. R. Cons. ros. rub. vet.
unc. iii. diacydon. cum spec. unc. i. condit. cort cit: unc. s.
spec. arom. ros. dr. i. corall. rub. præp. scr. ii. lig. aloes scr. s.
terr. sigill. scr. i. myv. cydon q. s. m f Elect. possent etiã add.
nux mosch. cc. ust. pulv. rad. torment. rub. pannon. &c.

Electuarium prosistendo vomitu. R. Cons. ros. vet.
unc. i. s. ment. unc. s. cort. cit. condit. unc. i. rad. acor.
condit. unc. s. rob. rib. unc. i. diacydon. cum spec. dr. vi.
corall rub. præp. dr. ii. nuc. mosch. cinam. an. dr. s. ol.
destill. charyoph. gut. ii. syr. acetos cit q. s. M.

Electuarium anti dysentericum. R. Cons. ros. vet. unc.
ii. carn. cydon. condit. unc. s. condit. fl. cit. arant. an.
unc. s. Bol. armen. terr. sigill. an. dr. i. tragac. dr. s. cor-
rall. rub. præp. marg. præp. an. scr. i. smaragd. præp. scr.
s. cum s. q. vin. granat. M. F. Elect. s. Stöll latwergen.

Aliud comprobatissimum. R. Cons. ros. vet. unc. i.
rheriac. vet. diascord. an. dr. i. terr. sig. corall rub. præp.
sem. plantag. an. scr. i. s. cc. phil. præp. scr. i. lap. bez.
occid. gr. vi. laud. cp. gr. iv. cum syr. de ros. sicc. s. q. M.
f. Elect. s. Stöll. latwergen / darvon jede 4 Stundt
einer Muscat Nussen groß zunehmen.

Electuarium adstringens in Gornorrhæa. R. Cons. ros.
rub. vet. unc. iv. carn. cydon. condit. dr. vi. nuc. ind. condit.
unc. s. nedull. nuc. ind. condit. dr. ii. pulv. torment.
balauß. an. scr. ii. terr. sig. corall. rub. præp. an. scr. i. te-
ust. præp. scr. i. s. cum s. q. syr. gran. acid. M. F. Elect.

Aliud contra abortum. R. Cons. ros. unc. ii. cort cit.
condit. dr. vi. pulp. dactyl. myrob. condit. an. unc. s. cor-
all. rub. præp. marg. præp. rasur. chor. an. dr. i. cum syr.
cydon. s. q. M. F. Elect.

Electuarium in initio mensium fluxu. R. Cons. ros. sicc. unc. ii. troch. de terr. sig. dr. s. s. rad. torment. corall. rub. præp. an. scr. ii. lap. hamas. sang. drac. Bol. arm. an. scr. s. cum s. q. syr. corall. M. F. Elect. de quo sumatur magnitudo nuc. mosch. majoris m. \mathcal{E} & superbibendo Cochlearia 3 Vel 4. aq. bux. past. Vel f. q. lulapst. \mathcal{Q} . Aq. fol. querc. plantag. an. unc. iss. Cinam. Cydoniat. (syr. de ros. sicc. an. unc. i. sp. Surriol. q. s. ad gratam aciditatem.

Aliud. R. Cons. ros. rub. Ver. unc. \mathcal{E} & condit. cydon. unc. i. s. spec. aromat. ros. diarrhod. abb. an. dr. i. Gree. math. adst. dr. iii. Corall. rub. præp. scr. \mathcal{E} marg. præp. smaragd. præp. an. scr. s. bo. armen. terr. sigill. an. scr. ii. syr. Corall. q. s. M. F. Elect.

Tabulæ Corallinæ Timæi in omnibus fluxibus sanguinis utiles. R. Corall. rub. præp. dr. ii. marg. præp. dr. i. extr. symph. scr. \mathcal{E} torment. ros. an. scr. s. s. troch. de terr. sigill. an. dr. s. Carneol. præp. scr. s. s. smaragd. præp. scr. i. Carn. Cydon. Condit. unc. i. Cons. ros. rub. dr. \mathcal{E} sacch. albiss. in succ. berber. \mathcal{E} aq. hamoph. Dornereül. sol. q. s. m. F. mors.

Tabulæ contra abortum. R. Sem. Coriand. præp. dr. ii. rad. bistort. rasur. ebor. Corall. rub. an. dr. s. succin. Chrysall. præp. an. scr. s. cocc. infect. scr. s. sacch. in aq. ros. sol. unc. \mathcal{E} f. tab. pond. dr. i. Capiatur. una alternis diebus mane.

Pilulæ adstrictivæ pro sistenda gonorrhœa. R. Therieb. Genet. aq. ros. lot. \mathcal{E} Coel. unc. i. Bals. per \mathcal{E} dr. s. pulv. rad. Consolid. m. torment. an. dr. i. ocul. Canc. præp. mercur. dulc. an. dr. s. M. F. mass. pulul. dos. scr. s. m. \mathcal{E} & pro valetudine plena restituenda in fine gonorrhœæ.

Pulvis contra abortum. R. Gr. Kerm. scr. s. sant. rub. dr. s. Charyoph. nœ. morth. an. f. r. i. fol. aur. N. iii. M. F. pulv.

Alius. R. Pulv. contra abort. August. dr. ij. mag. Corall. ebor. s. igne præp. mast. an. scr. ii. pellicul. Ventic. Gallen. scr. s. M. F. pulv. Vel R. Corall. rub. præp. scr. \mathcal{E} santal. omnium lig. alo. an. dr. i. spodis ex eboro. magist. ungu. alc. an. scr. ij. GC. ast. præp. dr. ij. magist. mat. perl. Succin. præp. an. dr. i. nuc. mosch. pulv. dr. i. s. lapid. \mathcal{E} precios.

an scr. i. spirit. sal. guttatum affus. scr. i. Sacch. ros. tabul.
ad pondus omnium, fol. aur N. Smi. M. F. pulv.

Pulvis specificus contra fluorem album. R. Magist.
osteo, Coll. dr. ij. Carneol. prap. dr. i. s. Corall. rub. prap.
marg. prap. terr. sig. mastich. gum. arab. torment. an. scr.
i. talcol. porc. prap. dr. ij. M. F. pulv. cujus dos. scr. ss. ex
vino rubro.

Alius R. Chalyb. cum acet. prap. dr. x. Cass. lig. Ver.
dr. iii. sant. rub. spoda ex ebor. succin. alb. prap. an dr. i.
facut. lbyron scr. ss. Croc. scr. s. Camph. gr. ss. sacch. fin.
unc. ii. ol. Cinnamon. ss. M. F. pulv. cujus dos. scr. ss.

Pulvis contra diarrhoeam. R. Pulv. gr. alb. Corall.
rub. prap. terr. sigill. rub. CC. ust. prap. an. scr. ss. M. F.
pulv. divid. in 4. praq. Vel R. Corall. rub. prap. dr. i. rad.
torment. nuc. mosch. an. dr. ii. CC. ust. prap. dr. i. s. M.
dos. dr. i. Vel scr. ij. bis in die cum vino rub. Vel Vin. Cy-
don.

Pulvis antidyentericus. R. Corall. rub. prap. gr.
xxss. CC. ust. prap. gr. xss. Croc. mart. adstr. dr. s.
terr. sig. rad. bistort. gum. tragac. nuc. mosch. an dr. s. M.
F. pulv. pro 3. dos. ex ovo sorbils sumendis vel R. Corall.
rub. prap. dr. i. CC. ust. prap. rad. torment. troch. de Carab.
sem. plantag. nuc. mosch. an. dr. s. terr. sig. Croc. mart.
adstr. an. dr. i. M. F. pulv. cujus dos. à dr. s. ad dr. i.

Pulvis specificus Americanus ad dysenteriam. R. Ipe-
cacuanha pulv. à dr. s. ad dr. i. detur ad Chart. sumatur
ex uno Vel altero Cochleari Brodis Vel Vin. lymph. jejuno
stomacho, Vel si necessitas exigat, 2. horis à Pastu. detur per
3. dies Continuos. Viros habet per superiora & inferiora pur-
gandi & detergendi, ac simul roborandi & malignitati re-
sistendi. Curare dicitur omnem diarrhoeam & dysenteriam,
nisi jam ad sit Gangrana Vel diarrhoea ptystica aut hydro-
pica.

Pulvis vomitum sistens. R. Sal. absinth. dr. i. Vel
scr. ii. detur cum Cochl. i. succ. Limon. Vel R. xyloal. dr.
i. nuc. mosch. mast. an. scr. ii. magist. Corall. scr. i. galang.
scr. i. M. F. pulv.

Pulvis stegnoticus in nimio fluxu mentium. R. Croc. mart ad str dr s: bol armen. lap. hemat. sang. drac. an. gr. xxv. mag. Corral. scr. i sem plantag. rad: torment. à gr. xv. M. F. pulv. subtiliss. dos. dr. i. ex aq. sequenti. R. Aq torment. unc. ii. saburs pastor. plantag: an. unc. i. s. f. vitriol. gut. vi. M.

Alius R. Corral. rub. præp. scr. i v. lap. Chrysol. præp. Carneol. præp. marg. orient. præp: an. scr. ii. pulv. rad. torment. gr. Kerm. an. dr. s. M. F. pulv. divid. in 6. p. aq.

Tragæa in vomitu gravidarum. R. Spec. diarrhod. abb. diatrionsant. an. scr. ii. cinam. opt. dr. ii. nuc. mosch. dr: i. mac. Charvoph. cubeb. cardam. an. scr. s. lig. alo. scr. i. Corral. rub. præp. marg. præp. an. scr. i. s. satch. albiss. unc. i v. fol. aur. N. iii. M. F. trag. cum pane vino madido sumenda.

Unguentum in diarrhæa & Dysenteria. R. Ung. comitiss. unc. ii. ol. laur. unc. s. nuc. mosch. expr. dr. ii. cerat. santal. unc. s. ol. mast. q. s.

Unguentum contra abortum. R. Ung. Comitiss. dr. vi. theriac. androm. dr. ii. vel iii. terr. sigill. dr. ii. cerat. pan. M. F. Emplast. umbilico applicandum vel R. Theriac. terr. sigill. an. unc. i. M. pro Empl. Venti imponendo vel R. Empl. de crust. pan. unc. i. ung. comitiss. dr. i. ol. nuc. mosch. dr. iii. mastib. q. s. vel R. Empl. diaphan. talid. de Crust. pan. an. dr. vi. malax. cum ol. mastich.

Emplastrum præsens in vomitu. R. Pic. unc. ii. ol. Cydon. unc. s. liquifiant simul & f. dropax.

Emplastrum contra abortum. R. Rad. bistort. sem. ebriand. an. dr. ii. nuc. cupress. santal. rub. hypocist. an. dr. i. ladan. mastich. an. unc. s. thur. bdell. an. dr. ii. Corral. Succin. an. dr. i. pulveris. excip. ol. mast. & cnm. s. q. cer. & thereb. F. Empl. applicandum Regioni, lumborum.

Cataplasma abortum impediens. R. Thur. mascul. unc. ii. albam. ov. N. v. agitentur simul super prunas sem-

semper movendo, ne concrescant causam dolorem efficien-
cipiatur stupp: & calidissime umbilicando per narcotica,
per triduum.

Aliud R. Pulv. gr: act unc. ii. corim suam exserunt
lib. s. mast. thur an unc i F pulv. in mōsta foverur
vin. cydon. vel vino rubro F Catapl. cujus pat. relaxatur,
indutatur linteo, & apponatur ventri inferiori. vel qui-

Cataplasma influxu Immodico mensium. R. Pulv vi
bol. armen. vel fulig. camin q pl album ou. & acet. acer-
rimi q. s. pro Catapl. ad lumbos & osacrum applic.

Cataplasma adstringens in diarrhæa & dysenteria.
R. Pan. secalin. unc. iii. cydoniat. unc i. coq. in vin.
rub. vel acct. ad consist. Catapl. add pulv. torment. rad.
consolid. m. an. dr. vi. terr. sigill. unc. s. nonnulli addunt
mast. nuc. mosch. mac. fl ros &c.

Aliud. R. Bol. arm. unc. i. alum. unc. s. farin. fab.
unc. i. s. album. ov. N. i. acet. vin. q. s. M. F. Catapl.
ventri applicandum.

Cataplasma pro vomitu sistendo. R. Ferment. acerr.
unc. iii. ment. pulv. dr. ii. Charyoph. mast. an. dr. i. M.
pro Catapl.

Nasale in Hæmmorrhagia narium. R. Lacc. pictor.
alum. anp. aq. vel stercor. porc dr. iii. pulv. ros. rub. dr.
s. excip. cum album. ov. & cum gossyp. f. turund. vel
R. thur. alo. sang. drac. farin. vol. tel. aran. pil. lepor.
minutim incis. à dr. s. vel R. Lanug. Cydon. tragac.
mast. sang. drac. bol. arm. lap. hemat. alo. farin. vol. an.
scr. i. M. F. pulv. excip. cum album ov. & gossyp.

Anacollemma seu Frontale in Hæmmorrhagia narium.
R. Aq. plantag. sperm. ran. equiset. nymph. vel ros an.
unc. i. acet. fortiss unc. iii. album. ov. conquass N ii.
cret. Coloniens. vel bol. arm. nac. s. vel terr. sig bol arm.
lap. hemat. an dr. i s. M. F. frontale frigidè applic.

Aliud. R. Croc. mart. adstrict. bol. arm. sang. drac.
terr. sig. an. dr. i. decoct. Gallar. & cum mi. mille fol. ad
unc. vi. vel aq. ros. plantag. an. unc. iii. acet. ros. unc. i.
s. nit. prap. dr. s. M.

C A P U T. X.

D E

Officio Medici in affectibus indicantibus adstringentia , stegnotica, hypnotica, anodyna & vulneraria.

§. I.

De Officio Medici in considerandis & prescribendis remediis adstringentibus & sanguinem sistentibus.

I.



Medicamenta adstringentia sunt, quæ quidquid laxum est adstringunt uti-
lia præsertim in vomitu, diarrhæa, tien-
teria, dysenteria, Gonorrhæa, fluore
albo, aliisque similibus affectibus, vim
suam exercent vel villos seu fibras molliores, flaccidas &
expansas cogendo, roborando, contorquendo & unien-
do vel poros cutis, vasorum, meatuum & viarum cor-
rugando, crispando, colligando, incuneando, con-
trahendo, obliniendo, replendo, ac obstruendo, quo-
eriam spectant *condensantia* & *Emplastica* vel humores
efferratos, fluxiles, tenues & impetuosè motos in impetu
suo coercendo, ipsosque incrassando, inviscando, con-
cenprando, cohibendo & refrænando. Inter adstring-
gentia sunt tum terrea exsiccantia, & absorbentia, tum
acerba & austera, tum acida humores fluxiles coagu-
lantia & quasi figentia, tum emplastica, tum narcoti-
ca, martialia, tum etiam Escharotica non quidem pro-
priè,

prie, sed quatenus & humorem fluentem absumunt, & crustam inducunt partibus propugnaculi loco, ac etiam adstrictionem post se relinquunt. Huc etiam refero Medicamenta Ischema, seu stegnotica & sanguinem sistentia, ut intra alveos suos commoretur nec extravasetur, qualia itidem sunt vel respicientia sanguinis orgasmum, rarefactionem, & ebullitionem ejus sistentia ut præcipitantia, terrea, temperantia aquea, refrigerantia acida, vel respicientia sanguinem serosiores, fluxiliorem & acriorem, ut incrassantia, adstringentia, opiata, vel vasorum oscula aperta, ut consolidantia, glutinantia, sanguinem imbibentia, coagulantia, & sanguinem in crustam quasi redigentia, cauterizantia, quæ torrefaciendo sanguinem & vasa crispando ac occludendo sanguinem sistunt.

11.

In usu horum omnium Not. 1. adstringentia debere esse convenientia tum partibus, quibus debentur, tum humoribus & causæ sic ventriculo magis conveniunt adstringentia aromatica vel acida: in affectibus pulmonum miscenda solventia: in affectibus Epatis penetrantia acida, in affectibus capitis Balsamica si materia fluxilis & acris, magis mucilaginosa, si maligna, quæ simul bezoartica. 2. Nunquam nimis adstringendum esse ne subsidant nimis pori, & hinc vix relaxari queant præsertim etiam, cum subinde fluxus moderari potius quam fisti perant. 3. In affectibus pectoris in genere parèe adstringentibus utendum esse tum quia tonus pulmonum laxitate gaudet, tum quia facile vitiosa materia ob viciniam ad cor repelli potest. 4. In usu adstringentium semper rationem habendam esse ventriculi, ne fermentum ejus destruat. 5. Adstringentium vim augere anodyna vel opiata, ac moderari solventia, perpetuo miscenda in spuito ac vomitu cruento, casu ab alto &c. 6. Vini

adstringentium, ubi paulò post remittit, novis dosibus
 iuvandam esse.

III.

PRæterea. 7. Not. adstringentibus liquidis vel parti-
 culas laxiores habentibus minùs fidendum esse ut v. g.
 dulcibus, syrupis, clysteribus, fomentis, Balneis, un-
 guentis &c. 8. Adstringentia non commodè dari cum
 cibis. 9. Fluxus sanguinis oriundos vel ab obstructione
 vasorum & ordinario denegato spatio vel humorum or-
 gasmo & copia minùs prodesse adstringentia : plus ve-
 rò v. g. purgantia, aperientia & inprimis acida. 10. Ad-
 stringentia alimentosa in ventriculum debiliorem ha-
 bentibus ante cibos reliquos assumpta adstringere : Post
 assumpta alvum laxare. Fibris nempe superioribus con-
 strictis, & inferioribus laxatis. 11. Adstringentia ex-
 terna actu frigida applicari v. g. ubi repellendum ubi san-
 guinis rarefactio, impetus & effusio sistenda v. g. adhi-
 bita testibus, hypochondriacis, & inprimis fronti, unde
 anacollemata, & frontalia ex adstringentibus actu fri-
 gidis confici & adhiberi solent, cum cerebrum nocere ne-
 queant obstante ossium vallo : minùs frigida locum ha-
 bent in Thoracis, ventriculi, Epatis & uteri affectibus.
 12. Adstringentia uti & opiata in dysenteria intra 6 Vel
 7. horas efficaciam suam deperdere, hinc reperenda
 neque ab eorum usu cessandum. 13. Adstringentia lon-
 gè efficacius adhiberi in forma sicca ut pulv. trochisc. pi-
 lul, quàm humida utpote citius defluente : extrinsecus
 etiam in forma Emplast. cerat. frontal. quàm foment.
 Baln. clyst. unguent. &c. 14. Adstringentia non debe-
 re esse in usu, quibus alvus siccior, quibus menses fluxu-
 ri sunt, observandum tamen in hoc casu, quid magis
 Urgeat. 15. Aromatica adstringentia ut v. g. nucem
 mosch. mastich. terreis mixta diarrhæis, dysenteris &
 vomitibus maximè amica esse. 16. Topica sanguinem
 sistentia illis locis applicanda esse, ubi vel immediate
 ad opus est, vel sanguinis magis refrigerari potest, sic
 appli.

applicantur bregmati, fronti, sub lingua, nuchæ, naribus, collo, hypochondriis, testibus, plantis pedum, sub axillis &c. 17. Ligaturas leniores extremorum proremorando sanguine non esse inutiles, quo nomine quoque frigida ut lapides & similia præter effluvia, quas præstant, arctius manu vel sub axillis detenta commendantur, in quibus tamen non excedendum præsertim, si impetuosus sanguinis motus conjunctus: 18. Caustica & corrosiva ad Hæmmorrhagias sistendas non æquè semper tutas esse. Nam licet initio venas adstringant ob partes stipticas, corrodingo tamen postmodum, & irritando, gravia symptomata inducere valent, hinc ignis actualis melior.

Formulæ,

Remediorum adstringentium & sanguinem sistentium,

DEcoctum Timæi comprobatissimum ad hæmophyisim & reliquos fluxus sanguinis. R. Rad. symph. mai. unc. i. s. plantag. pimpinell. an. dr. ij. tormentill. unc. i. alch. liq. an. dr. iiii. herb. burs. past. prunell. polyg. charesfol. consolid. med. sanic. an. m. fl. ros. rub. hype. bellid. cum tor. an. m. s. sem. hyper. dr. iiii. incis. grosso modo inf. per noct. in s. q. aq. manè coq. de colat. cum alhum. o. clarif. R. Lib. ii. s. add. syr. de symph. unc. iiii. de alch. unc. ij. oxymel. s. unc. i. s. M. S. Bluet stöllvud anß haisendes Tranck 3. mahl den Tag darvon zu trincken.

Aliud. R. Rad. symph. torment. glych. an. unc. s. herb. Seron. centinod. sanic. mille fol. alchimill. agrim. an. m. s. fl. ros. balauft. bellid. msn. an. pii nuc. pin. unc. i. santal. rub. unc. s. coq. in s. q. aq. font. de Colat. R. Lib. ii. dissolv. syr. de ros. sic. de symph. fernel. an. unc. i. M.

Julepus in Hæmorrhagiis. R. Aq. frag. unc. vi. burs. past. endiv. cich. ros. an. unc. iiii. syr. corall. unc. iiii. frag. papav. Errat. an. unc. i. s. succ. cit. acid. unc. ii. M. Et.

R. Tinct. ros. cum s. q. sp. vitriol. lib. ii. vel **R.** Syr. pro
tinct. ros. parat. unc. iii. aq. font. lib. ii. sp. vitriol. q. s. M.

Mixtura stegnotica sylvii. **R.** Aq. plantag. unc. iii.
cinam. dr. iii. acet. vin. dr. iii. corall. rub. prep. terr.
fig. vel sang. drac. an. scr. i. laud. op. gr. iii. syr. myrt.
dr. iii. M. Capiat Cochleatim.

Alia. **R.** Aq. plantag. fol. querc. burs. pastor. centi-
nod. an. unc. i. s. lapid. hemat. prep. corall. rub. prep.
carneol. prep. an. scr. i. spermiol. Croll. scr. s. syr. Corall.
papa. Errat. an. unc. s. M.

Emulsio adstringens in fluxibus sanguinis. **R.** Sem. pa-
pau. alb. dr. iii. 4 Frig. m. excort. an. dr. i. amygd. d. unc.
s. aq. plantag. portul. ros. an. unc. i. s. M. F. Emuls. add.
pulv. stegnot. Guttman. scr. i. corall. rub. prep. scr. s. ro-
tul. man. Christ. perl. dr. i. spirit. frag. gut. xi. M. S. Bluet
stillende Schlaf-Milch vor den Schlaf zu nehmen.

Alia. **R.** Amygd. d. rec. unc. s. sem. melon. excort.
dr. ii. papau. alb. dr. i. s. plantag. dr. s. aq. fol. querc.
plantag. burs. past. an. unc. i. s. M. F. Emuls. add. lap.
hemat. prep. corall. rub. prep. an. scr. i. vel lap. chrysolit.
sang. drac. nit. perl. scr. s. sacch. perlat. dr. ii. M.

Alia anti dysenterica. **R.** Amygd. d. non rancid. unc.
i. s. aq. dysenter. dorncreul. unc. iii. ros. fol. querc. an.
unc. ii. M. F. Emuls. cui add. cc. ust. prep. dr. i. marg.
prep. Corall. rub. prep. an. scr. i. spirit. rub. id. rosar.
an. scr. i. rotul. man. Christ. dr. i. s. M. S. Stöhl-Milch.

Alia **R.** Amygd. d. excort. unc. i. s. aq. in qua aur. ignit.
ter. extinct. vel decies chalybeat. lib. i. s. M. F. Emuls. add.
man. Christ. perl. dr. vi. m. vel **R.** Amygd. d. unc. i. sem.
melon. dr. vi. papau. alb. dr. ii. cc. ust. prep. scr. ii. aq.
plantag. lib. i. M. F. Emuls. add. lul. ros. unc. i. M.

Brodius anti dysentericus. **R.** Pimpinell. sangui. forb.
fol. cichor. mille fol. plantag. an. m. fl. ros. rub. p. i. cum
frusto carnis f. Insul. cui add. Rhab. tost. dr. s. vel scr. ii. m.

Electuarium in Hæmophthysi longo usu probatum.
R. Conseru. ros. verust. ss. unc. iii. s. pulv. rad. cons-
olid.

lid. utriusque sem. portulac. mastich. bol. armen. tragac.
an. scr. i. s. cum syr. de symph. F. Elect. molle.

Aliud. R. Cons. ros. rub. unc. iii. symphit. unc. i. pulv.
sem. hyosc. papau. alb. an. dr. i. spec. diatrag. frig. dr. i.
s. lap. hamat. prap. carneol. prap. corall rub. prap. croc;
mart adstrict. an. dr. s. vel bol. armen. terr. sig. sang.
drac. &c. Syr. papau. errat. q. s. M. F. Elect.

Electuar, adstringens in diarrhæa. R. Cons. ros. rub. vet.
unc. iii. diacydon. cum spec. unc. i. condit. cort. cit. unc. s.
spec. arom. ros. dr. i. corall. rub. prap. scr. ii. lig. aloes scr. s.
terr. sigill. scr. i. myr. cydon. q. s. m. f. Elect. possent etiã add.
nux. mosch. cc. ust. pulv. rad. torment. rub. pannon. &c.

Electuarium prosistendo vomitu. R. Cons. ros. vet.
unc. i. s. ment. unc. s. cort. cit. condit. unc. i. rad. acor.
condit. unc. s. rob. rib. unc. i. diacydon. cum spec. dr. vi.
corall. rub. prap. dr. ii. nuc. mosch. cinam. an. dr. s. ol.
destill. charyoph. gut. ii. syr. acetos. cit. q. s. M.

Electuarium anti dysentericum. R. Cons. ros. vet. unc.
ii. carn. cydon. condit. unc. s. condit. fl. cit. arant. an.
unc. s. Bol. armen. terr. sigill. an. dr. i. tragac. dr. s. cor-
rall. rub. prap. marg. prap. an. scr. i. smaragd. prap. scr.
s. cum s. q. vin. granat. M. F. Elect. s. Stöll. & atwergen.

Aliud comprobatissimum. R. Cons. ros. vet. unc. i.
theriac. vet. diascord. an. dr. i. terr. sig. corall. rub. prap.
sem. plantag. an. scr. i. s. cc. phil. prap. scr. i. lap. bez.
occid. gr. vi. laud. op. gr. iv. cum syr. de ros. sicc. s. q. M.
f. Elect. s. Stöll. & atwergen / darvon jede 4 Stundt
einer Muscat Nussen groß zunehmen.

Electuarium adstringens in Gonorrhæa. R. Cons. ros.
rub. vet. unc. iv. carn. cydon. condit. dr. vi. nuc. ind. con-
dit. unc. s. nedull. nuc. ind. condit. dr. ii. pulv. torment.
balaust. an. scr. ii. terr. sig. corall. rub. prap. an. scr. i. ce-
ust. prap. scr. i. s. cum s. q. syr. gran. acid. M. F. Elect.

Aliud contra abortum. R. Cons. ros. unc. ii. cort. cit.
condit. dr. vi. pulp. dactyl. myrob. condit. an. unc. s. cor-
all. rub. prap. marg. prap. rasur. chor. an. dr. i. cum syr.
cydon. s. q. M. F. Elect.

Electuarium in Inimio mensium fluxu. ℞. Cons. ros
sicc. unc. ii. troch. de terr. sig. dr. s. s. rad. torment. corral.
rub. prap. an. scr. ii. lap. hamat. sang. drac. Bol. arm. an.
scr. s. cum s. q. syr. corral. M. F. Elect. de quo sumatur mag-
nitude nuc. mosch majoris m. ℥ss & superbibendo Cochlearia
3 Vel 4. aq. burs. past. & c. f. q. lulapst. ℞. Aq. fol. querc.
plantag. an. unc. iss Cinam. Cydoniat. (syr. de ros. sicc. an
unc. i. ss. & striol. q. s. ad gratam aciditatem.

Aliud. ℞. Cons. ros. rub. & c. unc. ℥ss. condit. cydon. unc.
i. s. spec. aromat. ros. diarrhod. abb. an. dr. i. Groc. matt.
adst. dr. iii. Corral. rub. prap. scr. ℥ss marg. prap. smaragd.
prap. an. scr. i. bo. armen. terr. sigill. an. scr. ii. syr. Corral.
q. s. M. F. Elect.

Tabulæ Coralline Timæi in omnibus fluxibus san-
guinis utiles. ℞. Corral. rub. prap. dr. vi. marg. prap. dr. i.
extr. symph. scr. ℥ss torment. ros. an. scr. i. s. troch. de cerab.
de terr. sigill. an. dr. i. Carneol. prap. scr. i. s. smaragd. prap.
scr. i. Carn. Cydon. Condit. unc. i. Cons. ros. rub. dr. vi.
facch. albiß. in succ. berber. & aq. hamoph. Dornereul. sol.
q. s. m. F. mors.

Tabulæ contra abortum. ℞. Sem. Coriand. prap. dr. ii.
rad. bistort. rasur. ebor. Corral. rub. an. dr. i. succin. Chry-
stall. prap. an. scr. i. cocc. infect. scr. s. facch. in aq. ros. sol. unc.
℥ss. f. tab. pond. dr. i. Capiatur. una alternis diebus mane.

Pilulæ adstrictivæ pro sistenda gonorrhæa. ℞. Thereb.
Venet. aq. ros. lot. & Coct. unc. i. Bals. per & dr. s. pulv. rad.
Consolid. m. torment. an. dr. i. ocul. Canc. prap. mercur.
dulc. an. dr. s. M. F. mass. pulul. dos. scr. s. m. & pro sa-
litudine plena restituenda in fine gonorrhææ.

Pulvis contra abortum. ℞. Gr. Kerm. scr. s. sant. rub. dr.
s. Charyoph. nat. mosth. an. scr. i. fol. aur. N. iii. M. F. pulv.

Alius. ℞. Pulv. contra abort. August. dr. ij. mag. Corral.
ebor. s. igne prap. mast. an. scr. ii. pellicul. Ventric. Gallin.
scr. s. M. F. pulv. Vel ℞. Corral. rub. prap. scr. ℥ss. santal.
omnium lig. alo. an. dr. i. spodis ex eboro magist. unguil. alc.
an. scr. q. CC. nst. prap. dr. ij. magist. mat. perl. Succin.
prap. an. dr. s. nuc. mosch. pulv. dr. i. s. lapid. & pressor.

an scr. i. spirit. sal. guttatum affus. scr. i. Sacch. ros. tabul.
ad pondus omnium, fol. aur N. Sm. M. F. pulv.

Pulvis specificus contra fluorem album. ℞. Magist.
osseo, Coll. dr. ij. Carneol. prap. dr. i. s. Corall. rub. prap.
marg. prap. terr. sig. mastich. gum. arab. torment. an. scr.
i. talcol. porc. prap. dr. ij. M. F. pulv. cujus dos. scr. ii. ex
Vino rubro.

Alius ℞. Chalyb. cum acet. prap. dr. x. Cass. lig. Ver.
dr. ii. tant. rub. spodaex. ebor. succin. alb. prap. an dr. s.
facul. ibryon scr. s. Croc. scr. s. Camph. gr. iii. sacch. fin.
unc. ii. ol. Cinam. gut s. M. F. pulv. cujus dos. scr. s.

Pulvis contra diarrhæam. ℞. Pulv. gr. ass. Corall.
rub. prap. terr. sigill. rub. CC. ust. prap. an. scr. s. M. F.
pulv. divid. in 4. praq. Vel ℞. Corall. rub. prap. dr. i. rad.
torment. nuc. mosch. an. dr. ii CC. ust. prap. dr. i. s. M.
dos dr. i. Vel scr. ij. bis in die cum Vino rub. Vel Vin. Cy-
don.

Pulvis antidyentericus. ℞. Corall. rub. prap. gr.
xxiij. CC. ust. prap. gr. xviij. Croc. mart. adstric. dr. s.
terr. sig. rad. bistort. gum. tragac. nuc. mosch. an dr. s. M.
F. pulv. pro 3. dos. ex ovo sorbils sumendis vel ℞. Corall.
rub. prap. dr. i. CC. ust. prap. rad. torment. troch. de Carab.
sem plantag. nuc. mosch. an. dr. s. terr. sig. Croc. mart.
adstr. an. dr. s. M. F. pulv. cujus dos. à dr. s. ad dr. i.

Pulvis specificus Americanus ad dysenteriam. ℞. Ipe-
cacuanha pulv. à dr. s. ad dr. i. detur ad Chart. sumatur
ex uno Vel altero Cochleari Brodis Vel Vin. lymph. jejuno
stomacho, Vel si necessitas exigat, 2. horis à Pastu. detur per
3. dies Continuos. Vires habet per superiora & inferiora pur-
gandi & detergendi, ac simul roborandi & malignitati re-
sistendi. Curare dicitur omnem diarrhæam & dysenteriam,
nisi jam ad sit Gangrana Vel diarrhæa phytica aut hydro-
pica.

Pulvis vomitum sistens. ℞. Sal. absinth. dr. s. Vel
scr. ii. detur cum Cochl. i. succ. Limon. Vel ℞. xyloal. dr.
s. nuc. mosch. mast. an. scr. ii. magist. Corall. scr. i. galang.
scr. s. M. F. pulv.

Pulvis stegnoticus in nimio fluxu mentium. **R.** Croc. mart ad fr dr s: bol armen. lap. hemat. sang. drac. an. gr. xxv. mag. Corral. scr. i sem plantag. rad: torment. à gr. xv. M. F. pulv. subtiliss. dos. dr. i. ex aq. sequenti. **R.** Aq torment. unc ii. saburs pastor. plantag: an. unc. i. s. s. vitriol. gut. vi. M.

Alius **R.** Corral. rub. præp. scr. iv. lap. Chrysol. præp. Carneol. præp. marg. orient. præp: an. scr. ii. pulv. rad. torment gr. Kerm an. dr. s. M. F. pulv. divid. in 6. p. aq.

Tragæa in vomitu gravidarum. **R.** Spec. diarrhod. abb. diatriionsant. an. scr. ii cinam. opt. dr. ii. nuc. mosch. dr: i. mac. Charyoph. cubeb. cardam. an. scr. s. lig. alo. scr. i. Corral. rub. præp. marg. præpar. an. scr. i. s. sacch. alb. ff. unc. iv. fol. aur. N. iii. M. F. trag. cum pane vino madido sumenda.

Vnguentum in diarrhæa & Dysenteria. **R.** Vng. comitiff. unc. ii. ol. laur. unc. s. nuc. mosch. expr. dr. ii. cerat. santal. unc. s. ol. mast. q. s.

Vnguentum contra abortum. **R.** Vng. Comitiff. dr. vi. theriac. androm. dr. ii. vel iii. terr. sigill. dr. ii. ceræparum M. F. Emplast. umbilico applicandum vel **R.** Theriac. terr. sigill. an. unc. i. M. pro Empl. Ventr. imponendo vel **R.** Empl. de crust. pan. unc. i. ung. comitiff. dr. i. ol. nuc. mosch. dr. iii. mastib. q. s. vel **R.** Empl. diaphani talid. de Crustapan. an. dr. vi. malax. cum ol. mastich.

Emplastrum præsens in vomitu. **R.** Pic. unc. ii. ol. Cydon. unc. s. liquifiant simul & f. dropax.

Emplastrum contra abortum. **R.** Rad. bistort. sem. cobrian. an. dr. ii. nuc. cupress. santal. rub. hypocist. an. dr. i. ladan. mastich. an. unc. s. thur. bdell. an. dr. ii. Corral. Succin. an. dr. i. pulveris: excip: ol. mast. & cinn. s. q. cer. & thereb. F. Empl. applicandum Regioni, lumborum.

Cataplasma abortum impediens. **R.** Thur. mascul. unc. ii. album. ov. N. v. agitentur simul super prunas sem.

semper movendo, ne concrecant addendo theriacinth. excipiat stupp. & calidissime umbilico applicetur bis in die per triduum.

Aliud R. Pulv. gr. act unc. ii. cort. pan. nig. tost. lib. s. mast. thur. an unc. i. F. pulv. in mortar. & cum vin. cydon. vel vino rubro F. Catapl. cujus pars dimidia inducatur linteo, & apponatur ventri inferiori.

Cataplasma influxu immodico mensium. R. Pulv. bol. armen. vel fulig. camin q. pl. album ou. & acet. acerrimi q. s. pro Catapl. ad lumbos & osacrum applic.

Cataplasma adstringens in diarrhæa & dysenteria. R. Pan. secalin. unc. iii. cydoniat. unc. i. coq. in vin. rub. vel acet. ad consist. Catapl. add pulv. torment. rad. consolid. m. an. dr. vi. terr. sigill. unc. s. nonnulli addunt mast. nuc. mosch. mac. fl. ros &c.

Aliud. R. Bol. arm. unc. i. alum. unc. s. farin. fab. unc. i. s. album. ov. N. i. acet. vin. q. s. M. F. Catapl. ventri applicandum.

Cataplasma pro vomitu sistendo. R. Ferment. acerr. unc. iii. ment. pulv. dr. ii. Charyoph. mast. an. dr. i. M. pro Catapl.

Nasale in Hæmmorrhagia narium. R. Lacc. pictor. alum. anp. aq. vel stercor. porc dr. iii. pulv. ros. rub. dr. s. excip. cum album. ov. & cum gossyp. f. turund. vel R. thur. alo. sang. drac. farin. vol. tel. aran. pil. lepor. minutim incis. à dr. s. vel R. Lanug. Cydon. tragac. mast. sang. drac. bol. arm. lap. hemat. alo. farin. vol. an. scr. i. M. F. pulv. excip. cum album. ov. & gossyp.

Anacollema seu Frontale in Hæmmorrhagia narium. R. Aq. plantag. sperm. ran. equiset. nymph. vel ros an. unc. i. acet. fortiss. unc. iii. album. ov. conquass. N. ii. cret. Coloniens. vel bol. arm. uac. s. vel terr. sig. bol. arm. lap. hemat. an. dr. i. s. M. F. frontale frigide applic.

Aliud. R. Croc. mart. adstrict. bol. arm. sang. drac. terr. sig. an. dr. i. decoct. Gallar. & cum mi. mille fol. ad unc. vi. vel aq. ros. plantag. an. unc. iii. acet. ros. unc. i. s. nit. prap. dr. s. M.

Suffitus in diarrhœa. *R.* Succin. thur. mast. an. scr. *℞.* fl. lavend p. ii. ros. pi. therib. colb. ad pondus omnium confracta dentur ad scat. pro suffit. potest etiam addi lig. alo. stor. ix, fl. Verbas. &c.

Encina adstringens & consolidans. in dysenteria. *R.* Rad. consolid. m. torment. an. unc. s. herb. polyg. plantag. sansc. an. mi fl. Verbas. ros. balaustr. an pi sem plant dr. s. s. coq. ex lact. chalyb s. q. in Col. unc. x. dissolv. seu birc. dr. Si. ol. ros. cydon. an unc. s. bol. arm. terr. sig. an. dr. s. M. possit etiam dissolv. thetiac. androm. ad dr. ii. Vel pilul. de cynogloss. scr. s. s. prius autem pramittantur Clyst. detergentes ex decoct. hord. cum mell. ros.

J. II.

De Officio Medici in considerandis & præscribendis remediis Hypnoticis & Anodynis.

I.

Medicamenta Hypnotica sunt, quæ somnum conciliant, quod præstare videntur vel suaviter humectando, ac serum deficiens supplendo, vel æquosa frigidaque humiditate sua aut crassitie spiritus gravando, vel fibrillosam cerebri compagem relaxando vel sulphure vaporoso, blando, ac resolubili cerebrum replendo, vel spirituum vias ac nervorum initia non, nihil opplendo vel vi peculiari ac volatili sulphurea visciditate spiritus. ũgendo ad se invicem conglomerando, ligando ac quasi torpidos reddendo quæ posteriora proprie sunt, & dicuntur narcotica, inter quæ principalissimum est laud. opiat. de quo superius peculiari §. abunde dictum.

II.

Medicamenta anodyna, seu Paregorica sunt, quæ dolorem mitigant. Cum autem dolor tribus modis sedari

sedari solet, & quidem vel causam dolorem efficien-
tem auferendo, vel sensum stupefaciendo per narcotica,
de quibus supra, vel causâ & morbo manentibus ex parte
saltem cum leniendo per ea, quæ vel vim suam exerunt
blando & moderato calore, quo pars affecta fovetur,
& ad quandam æqualitatem reducitur, cutis relaxatur,
fiaræ plûs iusto tensæ & contortæ demulcentur, vel qui-
bus humores dolori fici discutiuntur, & resolvuntur vi
digerendi, discutiendi & carminativa præditis, vel quæ
repellunt & affluxum humorum prohibent atque ita sen-
sum partis nonnihil obtundunt.

Formulæ.

Remediorum Hypnoticorum & Anodyno- rum.

IUleps Hypnoticus. R. Syr. de papau s. unc. i. Vel dr.
Ss. aq. nymph unc. ii. hypnot. lang. unc. i. M. F. Iulep.
s. Schlaf-Zulep.

Emulsio Hypnotica. R. Sem. papau. alb. dr. iii. sem.
melon. ex cort. unc. s. Vel sem. 4. f m. an dr. s. aq. nymph.
Viol solan. an. unc. i. s. M. F. Emuls. add. magist. perl. scr.
i. sp. ros. gut. Ss. man. Christ. perl. dr. i. M. S. Schlaf-
Willk.

Alia. R. Sem. melon. ex cort. unc. s. aq. frag. nymph.
rub. id. an. unc. i. M. F. Emuls. add. man. Christ. perl. dr.
ii. sal. nit. perl. scr. s. cc. phil. prap. scr. i. s. M.

Alia. R. Amygd. d. ex cort. dr. iii. sem. 4. frig. m. an.
dr. ii. papau. alb. dr. s. s. aq. Violar. unc. ij. Borrage. nymph.
an. unc. i. S. M. F. Emuls. add. jul. ros. unc. s. man. Christ.
perl. dr. iii. M.

Pediluvium Hypnoticum. R. Fol. lactuc. salic. Vit.
malk. Violar. fl. nymph. an. m. sumit. aneth. M. S. Capis.
papau. alb. N. xvi. cort. rad. mandrag. dr. iii. coq. in s.
q. aq. pro pedilv.

Aliud. R. Capis. papau. cum semin. contus. N. vii. fl. ros.
rub. m. ii. chamom. m. i. herb. beton. sal. com. an. m. i. s. m.
incis. dentur ad chart. s. siuct. zum. fueß. Wasser: vel R. ca.
pis: papau. alb: N: xx: sem. papau: alb: unc: ii. fol: lactuc:
m: xv. fl. nymph. m: vi: violar. m. i. s. bull. in aq: s: q.

Vnguentum somniferum. R: Vngt. popul: unc: i. ala.
bast: ol. viol. papau: an. unc: s: op: i. heb. acet. fl. sambuc:
sol. gr. xv: ol. nuc. mosch. expr. scr. i. Croc. gr. viii. cera
parum. M. F. linim. quo inung. tempora, naves & pulsus
manuum vel R. Vng. alabast. refriger. Gal. popul. an. unc. s.
ol. nucist. dr. i. nymph. papau: an. dr. ii. mandrag. dr. s. m.

Oleum anodynum intus exhibendum. R: Ol. amygd.
d. rec. express. unc. i. s. spermat. cet. dr. s. vel scr. ii. M.
detur cum Brod. calid. vel cum vin. malvat. unc. s.

Epithema cephalicum in dolore capitis febrili. R.
Nucl. persic. exossat. N. xi. sem. papau. alb. dr. ii. 4. frig.
rai. an. dr. i. aq. fl. nymph. viol. an. unc. iii. fl. samb. ii. unc.
acet. rutac. fl. sambuc. an. unc. i. M. F. Emuls. add. camph.
scr. i. croc. orient. syr. ii. M.

Aliud. R. Nucl. persic: unc: i: amygd: am: unc. s: sem: can.
nab: dr. iii. aq. verben: beton. ros: an. unc. iii. M. F. Emuls.
add. acet. ros: fl. sambuc. an. unc. i. camph. croc. an. gr: v. M.

Oxyrrhodium. R. album: ov: conuass: No. ij:
aq. ros. lavend: an. unc. iii. acet. ros. vel fl. sambuc. dr.
vi. ol. ros: vel nymph. unc. i. camph: scr. ii: croc. gr. vi. M.

Unguent: pro dolore capitis. R. ung. alabast. popul: an.
dr. iii. op. gr. viii. croc. scr. i: ol. destill. aneth: gut. ii. M.

Vnguent: in dolore dorsi & renum. R. ung. infrig. gal. ro.
sat. Mes. anodyn. an. dr: vi. ol. scorp: succ. lim: an. unc. s. m.

Liniment: in doloribus suræ. R. ol: hyosc. laur: de
later. chamom. an. unc. s. m.

Aliud in dolore Ischiatico: R. ol: juniper. petrol:
an. unc. i. succin. dr. ii. m.

Vnguent: in dolore hæmorrhoidum. R. ung. de li.
nar. unc. i. deliq. unc. s. ol. ov. mast: an. dr: i. s. m.

Aliud in eorum inflammatione. R. mucilag. sem:
P. 51.

psyl. cydon. aq. sperm. ran. extr. an unc. i. sacch. sat. dr. i. camph. scr. s. m.

Emplastrum in doloribus ortis ex defluxione Cattarrhosa. R. *gummi carann. p. i. tacemach. p. ii. cum pauca thereb. dissol. extend: super allut.* Vel R. *oxycroc. Empl. diapalyn: an dr. vi. malax. cnm ol. Iuniper. & f. Empl. applic: alii etiam addunt empl. diaph. Minsicht,*

Cataplasma seu pulmentum in dolore capitis. R. *fol. verben. rec. mi. contnnd. in mortar. add. ferment. acerr. unc. ii. ol. ros. q. s. m. applicetur tepide fronti.*

Aliud. R. *bacc. Iuniper. unc. i. nucl. persic. No. xx. sem: papav. alb. dr. ii. thur. scr. ii. s. contund. cum aq. fl. sambuc: & verben. ac f. Pulment.*

Cataplasma probatissimum ad dolorem Hæmmorrhoidalem R. *Porrorum cnm tot. m. iv. v. mic. pan. lib. s. coq. in lact. capr. ad putrilag. contnnd. in mortar. addendo sub finem croc. austriac. dr. s. vel q. s. ad intensam flaved. quod teste sorbaith miraculi instar tollit dolores.*



Aliud expert. Grulingti. R. *Fic. in mortar. ad pulp. consist. contus. N. iv. vel v. mell. ros. unc. i. s. M. Illinatur parvo linteo & applicetur.*

Cataplasma anodynum generale præsertim in tumoribus & bascessibus. R. *Mic. pan. albiss. q. pl. coq. cum lact. s. q. ad consist. Catapl. ad ol. ros. vel simul etiam lil. alb. chamom. lumbric. &c. unc. i. vel i. s. croc. scr. s. vel scr. i. subinde & vitell. ov.*

Sacculus anodynus in Colica. R. *Spec. dec oët. emoll. carminat. an. m. iii. sumit. orig. serpill. an. mi. fl. chamom. Rom. m. iii. sem. caru. unc. i. incif. grosso modo & saccul. inclus coq. in lact. & applic.*

Alius in Pleuritide. R. *Violar. malv. fl. chamom. an. m. ii. fl. papau. errat. mi. sem. lin. fanug. an. unc. i. fol. hyosc. m. s. M. F. saccul.*

Alius in Nephritide. R. *Herb. malv. alth. pariet. saxifrag. fl. cham. melil. aneth. an m. iv. rad. alth. unc. iv. herb. arthemif. m. i. s. chærefol. m. s. sem. lin. fanug. an.*



*an unc. i. anis. dr. ii. f. ii. faccul. in aq. de coq. & alterna-
tim calidè applic.*

*Clyster anodynus. R. Laß. Sacem. unc. x. sacch.
rub. unc. ii. ol. sem. lin. unc. vi. sal. dr. s. M. loco. olei etiam
sumi potest butyr. Gel ung. de cynogloss.*

*Enema oleosum in Colica & Calculo egregium. R.
Ol. lin. unc. iii. chamom. aneth an; unc. ii. scorp. rusac. an.
unc. a. ol. therebinth. scr. s. M.*

J. III

De Officio Medici in considerandis & prescri- bendis remediis vulnerariis atque ad ea spectantibus.

I.

Medicamenta traumatica seu vulneraria sunt vel
externa vel interna. Interna sunt, quæ calorē in-
natū roborant vi sua Balsamicā, & tale suo vola-
tilioleoso, quæ putredini resistunt, materiam probam pro
generatione carnis suppeditant, sanguinis nimiam hu-
miditatem absumunt, ejus tonum conseruant, stagna-
tionem, vappescentiam ac acescentiam, serique icho-
rescentiam corrigunt & absorbent, affluxumque ad par-
tem vulneratam moderata adstrictione inhibent. Ex-
terna vel sunt *suppurantia* seu *digestiva* in vulneribus &
ulceribus usalia, quæ sanguinem extravasatum, ac in
poris hærentem in pus convertunt, vel *glutinantia*, quæ
viscositate sua emplastica vel adstrictoria labiorum pa-
rietes firman, & feri nativam coagulationem promo-
vent, vel sunt *sarcotica* seu carnem generantia, quæ mo-
deratè exsiccando ac superfluum humiditatem ablu-
mendo sordes blandè & citra acrimoniam detergant,
ac absorbent, lenitèrque adstringendo ac roborando
carnem firman, sicque etiam partium calorem con-
servant, vel sunt *Epulotica*, quæ cicatricem inducunt
efficaciter desiccando, servum in superficie absumendo,
& in

& in pelliculam coagulando , cutemque contrahendo ,
 densando & indurando , vel sunt *Porotica* quæ callum
 generant , ac ossium alimentum vi siccandi & adstrin-
 gendi in callum & similitudinem ossilem convertunt.
 Hæc quoque spectant remedia contra *ambusta* , quæ
 agunt extrahendo empyreuma , poros aperiendo , sero-
 sas & acres humiditates evocando , vel inflammationem
 sedando , vel calorem & ardorem leniendo ac denul-
 cendo vel exulceratas partes moderatè siccando & ad sa-
 nitatem perducendo.



II.

Hæc brevitatiscausa etiam ea refero , quæ ad affectus
 externos in usu sunt , qualia sunt. 1. *Grumos resol-
 ventia* , quæ sanguinem & serum in vasibus suis vel poris
 internis aut externis subsistentem in motum cient , &
 coagulum ejus futurum impediunt , vel etiam factum
 dissolviunt , & resolvunt. 2. *Repellentia* , reprimentia,
 & repercutientia , quæ extrinsecus applicata materiam
 ad huc fluxilem mobilem , volatilem , & ad partem
 fluentem nondum tamen eidem impactam , vel extrava-
 satam alio repellunt , vel leviter saltem hærentem in al-
 veum suum redire faciunt. Horum alia sunt frigida ,
 terrea , ac adstringentia : alia actû & Potentia frigida ,
 aquæ , mucilaginosa , viscosa. 3. *Abstergentia* , quæ
 duris , asperis & acutis suis particulis , vel vi nitrosa ,
 falsa , & saponariâ abrasunt , & everrunt sordes , hu-
 morèsque viriosos in meatibus hærentes , uti etiam ab-
 scessuum ruptorum , vel ulcerum sordidorum saniem ,
 pus , aliâque excrementa abstergunt. 4. *Emollientia* ,
 quæ emolliunt tum humectando & laxando tam fibras
 nerveas tensas & irritatas tum poros adstrictos & angu-
 statos , tum congelata & concreta resolvendo , funden-
 do ac per halitum digerendo. Talia sunt moderatè
 calida & humida. Humida , ut corrigatur siccitas , laxetur
 densum & diluatur concretum. Calida , ut calor
 natus roboretur , ac materia quasi coquatur. 5. *Dre-*

cutientia seu rarefacientia, quæ emollientibus calidiora, ac tenuioris substantiæ, unde facile penetrant, cutis poros dilatant, humores attenuant, & in vapores convertunt, ut per insensibilem transpirationem seu diaphoresim evacuentur. 6. Tandem *attrahentia*, quæ destinata sunt vel ex alto evocandis humoribus, vel à parte affecta avocandis & aliorum ducendis, vel advocandis utilibus.

III.

In usu horum omnium Not. i. vulneraria interna semper ea eligenda esse, quæ peculiarem cognationem habent cum parte affecta 2. ea intrinsecus præcipuè convenire, cum vulnera vel ulcera ob vitiosam partis constitutionem non facile curam suscipiunt synoviæque infestat. 3. Non usurpanda hæc in principio, & ubi externa satisfaciunt, vel ubi adest febris; & inflammatio. 4. Respiciendum sinuisse ad ventriculum, ne exinde lædatur. 5. Suppurantia convenire præcipuè tumoribus sanguineis, quæ discutientibus & resolyentibus non cedunt. 6. In ulceribus suppurantia non debere esse nimis humida, ne ulcera reddantur sordida. 7. Traumatica alcalinæ esse naturæ, & occultum alcali & quidem volatile in se continere acidum vulnerum vel ulcerum perimens. Item Emplastra vulneraria ferè omnia in hoc convenire, quod vulnera ab aëre defendant, ac vi Balsamica & modicè siccante partem læsam demulceant. 8. In corporibus duris & siccis, & ubi caro durior generanda convenire magis pulveres farcoticos, uti etiam ubicunque ulcera superflua luxuriant humiditate. Item in vulneribus capitis: e contra in corporibus mollioribus forma linimenti vel unguentæ. 9. Epulotica usurpanda esse ulcere carne non omnino repleto, nec cicatrix fiat eminentior. 10. In Applicatione remediorum ad ambusta actu frigida esse cavenda



venda , cum ob contrarietatem major oriatur ardor , fluxusque, & dolor augeatur , hinc topica tepide sunt applicanda. 12. Vnguenta pro ambustis adhibenda non debere esse dura , ne maiorem dolorem excitent : interius quoque in ambustis ardorem restringendum ut v. g. nitro ac maxime partem affectam respiciendam.

IV.

PRæterea. 13. Notandum , res solventia stipticis & traumaticis jungenda esse , eisque interius succenturiari universalia ut v. g. purgantia , diaphoretica ; Exterius emollientia & Paregorica. 14. Repellentia alia propria talia esse , quæ ipsis partibus affectis applicantur : Alia *Intercipientia* dicta seu *defensiva* quæ viis , per quas humor defluit , applicata, facultate frigida , sicca , terrea , adstringente humoribus adiutum intercludunt. 15. Repellentia non competere in omnibus fluxionibus non enim adhibenda. 1. In partibus nobilibus. 2. Quando fluxio parti principi vicina est. 3. Partibus nimis profundo loco sitis. 4. Si materia maligna & venenata. 5. Vbi animalis venenati ictu vel morsu vulnus inflictum. 6. Si natura rectè agens criticè materiam in partem aliquam propellat. 7. Si humor sit multus , & corpus adhuc plenum. 8. Si humor jam parti impactus. 9. Si dolor adsit vehemens. 16. Not. tempus adhibendi repellentia esse principium fluxionis : Eodem versus augmentum tendente diggerentia admiscenda , hinc sola res solventia usurpanda. 17. Repellentia frigida & humida convenire cum humore tenuis & paucus , aut superficiem corporis occupat , aut cum fluxiones accidunt ob nimium partis calorem aut dolorem : Frigida verò sicca & adstringentia , cum dolor non ita urget , & fluxiones fiunt ob partium debilitatem. 18. In Erysipelate sub hoc Climate unctuosas , oleosas , immo omnia humida vitanda esse , cum turiora sint in forma sicca applicata. 19. In-

19. Intercipientibus fortioribus utendum in habitu corporis duriore, ubi vasa ampliora, & influentis humoris major portio. 20. Repellentia apprimè convenire in cancro non omittis universalibus.

V.

PRAETEREA not. 21. Impropiè ad repellentia pertinere, quæ poros obstruunt, & fluentem materiam vitiosam cum sanguinis massa reduniunt, & sic retrocedere faciunt ut v. g. Mercurialia in scabie. 22. Repellentia subinde sensum dolorificum obtundere ac convenire etiam dorso applicata in sudoribus colliquativis. 23. Inter emollientia imprimis conducere Cataplasmata & Emplastra illa magis ad suppurationem: hæc ad discussionem inserviunt, illisque meliora, cum Cataplasmata faciliè frigeant, & hinc materiam repellant. 24. Emollientia non convenire in tumoribus atrabiliarijs v. g. canceris & scirrhis malignis, quæ acrimonia gaudent salina instar Mercurij sublimati, magis enim per emollientia dilatantur Pori, ut & affluxus humorum præcuretur, & acrimonia corrosiva in centro decens & coarctata latius expandatur.

Formulae

Remediorum vulnerariorum, atque ad ea spectantium.

DEcoctum ad Casum. ℞. rad. symph. maj. unc. 1. plantag. alth. pimpinell. an dr. iij. herb. Seron. sanct. charcfol. prunell. beder. arbor. bellid. cam. ros. an m. s. rad. liquoris. dr. iij. sic. No. Sy. coq. ex aq. & Vin. rub. an lib 1. s. Colas. clarif. add. syr. de symphis. de alth. an unc. ij. oxy. mel. s. unc. 1. s. m.

DEcoctum vulnerarium. ℞. Rad. symph. unc. 1. rub. sincl. aristol. ros. an. unc. 1. herb. millefol. Seron. pyrol. saxicul. alchismill. agrimonia an. m. s. fl. bellid. min. sumit. Virg. aut.

(Faint handwritten notes at the bottom of the page)

[illegible]

Species pro decocto Tamariscis. R. C. aff. 17
 hord. integ. unc. i. herb. agrum. sem. alumin. com.
 pi. rad. consol. mai. lig. an. unc. i. per. pro. 17
 ral. unc. i. s. ann. sem. an. fr. i. 17
 5 Species. Tern. Tamar. Tamar. unc. i. 17
 oder and enthält 17 17 Wasser 17 17
 Sieden.
 Decoctum ad Hemorrhoides
 Epas. 17

Decoctum ad Herniam.

*Epar. nob. polyg. plantag. ar. m. = Eryd. = m.
m. una s. bardan. dr. m. rorismar. p. m. m.
perfoliat. dr. iii. coriand. m. dr. s. m. m.
Chalyb. ad lib. in colat. f. l. l.
Pulvis.*

Pulvis ad catenam. R. Pulvis
detur ex aqua chalybeata.

Pulvis ad catenam. R. Pulvis catenae ad
detur ex aq. charrefed vel ex Cereb. Cereb. Cereb.
ret. antim. diapb. fong. hinc fong. m. m.
M. F. pulv. cypri det. h. a.
Pulvis ad Erythema.

Pulvis ad Erysipell curand.

F. pulv. subtile, qui deinde
 applicetur. Vel si
 idem Sales forte hinc
 Fomentum ut
 Carap.

Fomentum in stomato
Cataplasma vulvae
raph. Zedner

fol. Brasiliensis, etc.

2. **Помощь в получении**

eriones, exulcerationes humidas, merum Gangræne &c.
R. Lytharg. lib. s. fl. ros. rub. mis. olib. myrrh. mast. an.
 unc. s. decoct. seu aq. Calc. viv. res. lib. iv. acet. lib. i.
 coq. simul, usque dum lytharg. solut. add. in fine camph.
 unc. s. Cal. s. Umschlag warm mit Pauschen oder zu-
 sammen gelegten Luchern 2. 3. mal oder öftters den Tag
 aufzulegen.

Aliud contra Gangrænam & sphacelum aqua fusta di-
 ctum. **R.** Herb. rut. absinth. salu. sabin. fol. querc. an.
 m. s. rad. aristol. ros. dr. iii. ennucl. dr. ii. vitriol. Rom.
 unc. i. sal. armon. dr. i. s. Gallar. unc. s. bucc. laur. unc.
 s. olib. mast. an. dr. ii. ceruss. lytharg. alum. crud. an. an.
 iii. Bol. armen. ups. s. cort. virid. nuc. Jugl. dr. vi. camph.
 dr. s. **M.** de his speciebus Cachl. i. cum vin. alb. lib. ii. coq.
 & cum intinctis splenis vel linteis triplicatis vel quadru-
 plicatis calidè applicetur.

Fomentum pro membro fracto, luxato vel distorto
 ante vel post repositionem. **R.** Herb. beton. Chamom.
 vorism. an. mi. sumit hyper. cum fl. m. i. s. rad. aristol. ros.
 dr. vi. symph. mai. dr. s. sem. 4. calid. m. an. dr. i. s. coq.
 in aq. s. q. Colat. lib. i. s. add. vin. infus. fl. hyper. lib. s.
 s. Glieder Babung.

Fomentum pro membris à Gelu sideratis. **R.** Spirit.
 vin. opt. rectif. lib. i. pulv. sal. armon. unc. i. camph. fer.
 s. **M.** ad vit. s. überschlag zum Steffen.

Aliud pro rubedine, tumore & dolore pedum. **R.**
 Bol. arm. alb. dr. iii. lytharg. unc. i. mast. myrrh. an.
 unc. s. olib. dr. vi. aq. plantag. sperm. ran. fl. sambuc. ad.
 unc. viii. coq. & Col. servetur ad usum.

Fomentum in tumore pedum ædematoso. **R.** Spirit.
 vin. opt. rectif. mensur. i. sal. armon. unc. iii. **M.** incing.
 linteis: ne sub horam decubitis in lecto pedibus, rapidè cir-
 cumvolvuntur optima etiam est aq. calc. viv. sic parat.
 da. **R.** Frustul. calc. viv. ad magnitud. nuc. Jugland.
 immittatur in aq. ferventem donec dissolv. hinc calidè cum
 aq. agitur, & postea residere sinatur, hinc clavior aqua
 per

per inclinationem in aliud vas transfunditur. applica-
cum intinctis linteis vel spongia nova.

Aliud. R. Herb. ab sint. salu. rut. hyper. orig. roz-
rum. lavend. ma. or. an. mi. rad. ebul. irid. cort. med.
sambuc. an. dr. ii. fl. cham. samb. spic. stach. ros. melil. an.
m. s. bacc. laur. Juniper. an. unc. s. M. Concis. coq. cum aq.
font. s. q. pro foment. pedum bis in die usurpando.

Aliud in Tumore manuum & Pedum. R. Lytharg.
unc. vi. bol. arm. unc. i. sulph. viv. unc. i. s. alum. crud.
dr. ii. gallar. unc. i. myrrh. el. unc. i. s. M. F. pulv. de
qua 2. vel 3. Cochl. cum vin. alb. unc. xx. acet. vin. acer-
rimi unc. x. coq. ac. cum intinctis linteis 2. plicat vel 3.
plicat sepius calide applicentur.

Unguentum diggestivum chyrgorum. R. Thereb.
cum vin. vel aq. ros. ad albed. lot. unc. i. seu cerv. unc.
s. ol. ros. dr. ii. cer. alb. olib. mast. an. ser. ii. camph. scr.
s. M. vel R. Thereb. unc. ii. vitell. ov. N. i. myrrh. alo.
an. dr. s. ol. cer. gut. x. M. in partibus nervis additur
etiam Bals. peruv. Vel R. Thereb. unc. i. vitell. ov.
N. i. mell. ros. unc. s. ol. hyper. dr. i.

Liqumentum ad ambusta. R. Ol. oliv. vel lin. part.
i. album. ov. conquass. part. ii. M. Illip. cum pluma Gal.
lin. vel R. Butyr. rec. p. liquefact. & lot. in aq. sperm.
ran. unc. vi. ol. de vitell. ov. unc. ii. M.

Unguent. ad ambusta Fabricii. R. Butyr. rec. sing.
sale aq. ros. lot. unc. iii. ol. viol. de vitell. ov. amygd. d.
an. unc. i. Croc. scr. i. mucilag. sem. cydon. unc. i. cer. q. s.
M.

Unguentum ad scabiem expertissimum. R. Pingued.
suill. antiq. unc. vi. liquefiant ad ignem. Col. add. sulph.
viv. subtiliss. pulv. bacc. laur. eodem modo pulv. an. dr.
s. s. Charyoph. arom. dr. i. pulv. lapas. acut. dr. s.
M.

Aliud certissimum & Infallibile in scabie humida.
R. Pulv. cors. laur. sulph. cit. an. unc. iv. ennucl. unc. ii.
nitriol. alb. unc. i. s. styrac. liquid. q. s. M. F. ung.

Aliud in scabie sicca & Pruriginosa. *R.* Succ. lapath. acut. plantag. an. unc ii. solan. unc. i. s. citri unc. i. ceruss. unc ii. lyrbarg. unc. s. fl. sulph. dr. i. sol. ros. Viol. an. unc. ii. s. butyr. salit. unc. i. s. thereb. cer. an dr. *Si. M. F. ung.* add. ol. dest. lig. Rhod. gut. xxv. alipt. mosch scr ii. *M.*

Aliud in scabie vulgarissimum. *R.* Thereb. Vulg. Vitell. ov. dissol unc. i. fl. sulph. dr. *Si. butyr. rec. unc. xv. M.*

Emplastrum infallibile in clavis pedum. *R.* Galban. gum ammon. acet. solut. an. unc. s. sal. armon scr i. Empl. diachyl. magn. unc. i. s. *M.* vel *R.* pic. naval unc. i. Galb. in acet. dissol. unc. s. sal. armon. scr i. Empl. diachyl. magn. dr. s. *M.* cum panno super clavas ponatur ac tertio vel quarto die mutetur.

Emplast. pro tumore pedum. *R.* Empl. diaph. mins. unc. i. s. oxyroc. unc. s. malax. cum ol. chamom.

Emplastrum diasulphur Ruland. *R.* Bals. sulph unc. iiii. Cer. unc s. Coloph. dr. iiii. liquot. add. myrrh. opt. pulv. unc iiii. s. coq. s. a.

Emplastrum Mamillare in omnibus mammarum tumoribus utilissimum. *R.* Spermat cet. unc. i. cer alb. unc. ii. galban. acet. sol. unc. s. ol. sambuc. q. s.

Balsamus sulph. Rueland. *R.* fl. sulph. unc. i. ol. nuc. Gel rap. unc. *Si. Vin. generos. unc. ii. macerentur per dies 8. aliquoties agitando coq. leniter ad Vin. consumpt.*

Balsamus sclopetarius. *R.* Ol. lin. thereb. an. lib. i. arug. ar. unc. s. coq. parum s. a.

Cataplasma suppurativum. *R.* Rad. alth. lil. alb. an. unc. ii. herb. malv. alth. pariet. an m s. sem lin. fanug. an. unc. s. coq. in s. q. aq. ad mollit. per Cribrum traject. add. farin. sem. lin. fabar. an dr *Si. ol. Viol. axung. porc. an. dr. & M. F. Catapl. s. Maturier Nießlauffein durch zu streichen vnd warmb überzulegen.*

Aliud. *R.* Herb. malv. cum ros. mic. pan. alb. an. p. aq. coq. in lact. Caprin. s. q. ad consist. Catapl. add. Vitell. ov. Troc & ol. ros. Seletiam ol. lil. alb. Chamom. amygd.

Injectio in ulcera cava mundificans, siccans, adstringens, putredinem arcens & consolidans. *R.* Herb. cent.

*min. scord. ros. rub. an. m. s. fl. balauft. dr. ii. pulv. mastich.
myroh. oliv. aloes an. dr. s. rad. lr. flor. aristol. rot. torment.
an. dr. s. Concis. coq. cum unc. xx. aq. font. & x. vin. rub.
in olla bene tecta, in Col. dissolv. mell. ros. Col. unc. i. addi
etiam potest Bals. pers.*

Plura non addo. cum magis spectent ad Chyrurgiam.

C A P U T. XI.

D. E

De Officio Medici in præscri- benda debita Diæta.

§. I.

De Officio Medici in Consideranda Diæta in genere.

I.

DEr Diætam hic aliud non intelligi-
tur, quam debita victus ratio, vel po-
tius Methodicus usus sex rerum non na-
turalium. hæc non minimum est funda-
mentum sanitatis tum conservandæ tum
restituendæ. Si enim utilitatem ejus brevibus descrip-
tam verbis desideres, hæc illa est, quæ morbos pellit,
corpus agile sanum, purum à fælore ac fæditate alien-
um præstat, longævitatē inducit, somnos lucundos
& placidos conciliat, epulas communes suaves & gra-
tas efficit, sensibus incolumitatem, memoriæ vigorem,
ingenio perspicaciam & claritatem confert, passiones
sedat, Iracundiam & mærorem pellit, libidinis impe-
tum frangit, denique corpus & animam maximis bonis
replet,

an unc. i. anis. dr. ii. f. ii. saccul. in aq. de coq. & alterna-
tim calidè applic.

Clyster anodynus. R. LaB. Sacem. unc. x. sacch.
rub. unc. ii. ol. sem. lin. unc. s. sal. dr. s. M. loco. olei etiam
sumi potest butyr. Gel ung. de cynogloss.

Enema oleosum in Colica & Calculo egregium. R.
Ol. lin. unc. iii. chamom. aneth an; unc. ii. scorp. rutac. an.
unc. s. ol. therebinth. scr. s. M.

S. III

*De Officio Medici in considerandis & prescri-
bendis remediis vulnerariis atque ad ea
spectantibus.*

I.

Medicamenta traumatica seu vulneraria sunt vel
externa vel interna. Interna sunt, quæ calorē in-
natū roborant vi sua Balsamicā, & tale suo vola-
tilioleoso, quæ putredini resistunt, materiam probam pro
generatione carnis suppeditant, sanguinis nimiam hu-
miditatem absumunt, ejus tonum conseruant, stagna-
tionem, vappescientiam ac acescientiam, serique icho-
rescentiam corrigunt & absorbent, affluxumque ad par-
tem vulneratam moderata adstrictione inhibent. Ex-
terna vel sunt *suppurantia* seu *digestiva* in vulneribus &
ulceribus usualia, quæ sanguinem extravasatum, ac in
poris hærentem in pus convertunt, vel *glutinantia*, quæ
viscositate sua emplastica vel adstrictoria labiorum pa-
rietes firmant, & serinativam coagulationem promo-
vent, vel sunt *sarcotica* seu carnem generantia, quæ mo-
deratè exsiccando ac superfluum humiditatem ablu-
mendo sordes blandè & citra acrimoniam detergunt,
ac absorbent, lenitèrque adstringendo ac roborando
carnem firmant, sicque etiam partium calorem con-
servant, vel sunt *Epulotica*, quæ cicatricem inducunt
efficaciter desiccando, serum in superficie absumendo,
& in

& in pelliculam coagulando, cutemque contrahendo, densando & indurando, vel sunt *Porotica* quæ callum generant, ac ossium alimentum vi siccandi & adstringendi in callum & similitudinem osseam convertunt. Hæc quoque spectant remedia contra *ambusta*, quæ agunt extrahendo empyreuma, poros aperiendo, serosas & acres humiditates evocando, vel inflammationem sedando, vel calorem & ardorem leniendo ac densulcendo vel exulceratas partes moderatè siccando & ad sanitatem perducendo.

II.

Hæc brevitatis causa etiam ea refero, quæ ad affectus externos in usu sunt, qualia sunt. 1. *Grumos resolversa*, quæ sanguinem & serum in vasis suis vel poris internis aut externis subsistentem in motum cient, & coagulum ejus futurum impediunt, vel etiam factum dissolviunt, & resolvunt. 2. *Repellentia*, reprimentia, & repercutientia, quæ extrinsecus applicata materiam ad huc fluxilem mobilem, volatilem, & ad partem fluentem nondum tamen eidem impactam, vel extravasatam alio repellunt, vel leviter saltem hærentem in alveum suum redire faciunt. Horum alia sunt frigida, terrea, ac adstringentia: alia actu & Potentia frigida, aquæ, mucilaginosæ, viscosæ. 3. *Abstergentia*, quæ duris, asperis & acutis suis particulis, vel vi nitrosa, salsa, & saponaria abradunt, & everrunt sordes, humoresque vitiosos in meatibus hærentes, uti etiam abscessuum ruptorum, vel ulcerum sordidorum saniem, pus, aliæque excrementa abstergunt. 4. *Emollientia*, quæ emolliunt tum humectando & laxando tam fibras nervæas tensas & irritatas tum poros adstrictos & angustatos, tum congelata & concreta resolvendo, fundendo ac per halitum digerendo. Talia sunt moderatè calida & humida. Humida, ut corrigatur siccitas, laxetur densum & diluatur concretum. Calida, ut calor nativus roboretur, ac materia quasi coquatur. 5. *Dre-*

cutientia seu rarefacientia, quæ emollientibus calidiora, ac tenuioris substantiæ, unde facile penetrant, cutis poros dilatant, humores attenuant, & in vapores convertunt, ut per insensibilem transpirationem seu diaphoresim evacuentur. 6. Tandem *attrahentia*, quæ destinata sunt vel ex alto evocandis humoribus, vel à parte affecta avocandis & aliorum ducendis, vel advocandis utilibus.

III.

In usu hominum omnium Not. i. vulneraria interna semper ea eligenda esse, quæ peculiarem cognationem habent cum parte affecta 2. ea intrinsecus præcipuè convenire, cum vulnera vel ulcera ob vitiosam partis constitutionem non facile curam suscipiunt synoviæque infestat. 3. Non usurpanda hæc in principio, & ubi externa satisfaciunt, vel ubi adest febris; & inflammatio. 4. Respicendum sinuisse ad ventriculum, ne exinde lædatur. 5. Suppurantia convenire præcipuè tumoribus sanguineis, quæ discutientibus & resolventibus non cedunt. 6. In ulceribus suppurantia non debere esse nimis humida, ne ulcera reddantur sordida. 7. Traumatica alcalinæ esse naturæ, & occultum alcali & quidem volatile in se continere acidum vulnerum vel ulcerum perimens. Item Emplastra vulneraria ferè omnia in hoc convenire, quod vulnera ab aëre defendant, ac vi Balsamica & modicè siccante partem læsam demulceant. 8. In corporibus duris & siccis, & ubi caro durior generanda convenire magis pulveres farcoticos, uti etiam ubicunque ulcera superflua luxuriant humiditate. Item in vulneribus capitis: e contra in corporibus mollioribus forma linimenti vel unguentæ. 9. Epulotica usurpanda esse ulcere carne non omnino repleto, nec cicatrix fiat eminentior. 10. In Applicatione remediorum ad ambusta actu frigida esse cavenda

venda, cum ob contrarietatem major oriatur ardor, fluxusque, & dolor augeatur, hinc topica tepide sunt applicanda. 12. Unguenta pro ambustis adhibenda non debere esse dura, ne maiorem dolorem excitent: interius quoque in ambustis ardorem restringendum ut v. g. nitro ac maxime partem affectam respiciendam.

IV.

PRæterea. 13. Notandum, res solventia stipticis & traumaticis jungenda esse, eisque interius succenturiari universalia ut v. g. purgantia, diaphoretica: Exterius emollientia & Paregorica. 14. Repellentia alia proprie talia esse, quæ ipsis partibus affectis applicantur: Alia *Interceptientia* dicta seu *defensiva* quæ viis, per quas humor defluit, applicata, facultate frigida, sicca, terrea, adstringente humoribus aditum intercludunt. 15. Repellentia non competere in omnibus fluxionibus non enim adhibenda. 1. In partibus nobilibus. 2. Quando fluxio parti principi vicina est. 3. Partibus nimis profundo loco sitis. 4. Si materia maligna & venenata. 5. Vbi animalis venenati ictu vel morsu vulnus inflictum. 6. Si natura recte agens criticè materiam in partem aliquam propel- lat. 7. Si humor sit multus, & corpus adhuc plenum. 8. Si humor jam parti impactus. 9. Si dolor adsit vehemens. 16. Not. tempus adhibendi repellentia esse principium fluxionis: Eodem versus augmentum tendente diggerentia admiscenda, hinc sola res solventia usurpanda. 17. Repellentia frigida & humida convenire cum humor tenuis & paucus, aut superficiem corporis occupat, aut cum fluxiones accidunt ob nimium partis calorem aut dolorem: Frigida verò sicca & adstringentia, cum dolor non ita urget, & fluxiones fiunt ob partium debilitatem. 18. In Erysipelate sub hoc Climate unctiosa, oleosa, immo omnia humida vitanda esse, cum tutiora sint in forma sicca applicata. 19. In

19. Intercipientibus fortioribus utendum in habitu corporis durioris, ubi vasa ampliora, & influentis humoris major portio. 20. Repellentia apprimè convenire in cancro non omittis universalibus.

V.


PRETEREA not. 21. Impropiè ad repellentia pertinere, quæ poros obstruunt, & fluentem materiam vitiosam cum sanguinis massa reduniunt, & sic retrocedere faciunt ut v. g. Mercurialia in scabie. 22. Repellentia subinde sensum dolorificum obtundere ac convenire etiam dorso applicata in sudoribus colliquativis. 23. Inter emollientia inprimis conducere Cataplasmata & Emplastra illa magis ad suppurationem; hæc ad discussionem inserviunt, illisque meliora, cum Cataplasmata faciliè frigesiant, & hinc materiam repellant. 24. Emollientia non convenire in tumoribus atra bilarijs v. g. canceris & scirrhis malignis, quæ acrimonia gaudent salina instar Mercurij sublimati, magis enim per emollientia dilatantur Pori, ut & affluxus humorum præcuratur, & acrimonia corrosiva in centro decens & contracta latius expandatur.

Formulæ

Remediorum vulnerariorum, atque ad ea spectantium.

DEcoctum ad Casum. ℞. rad. symph. maj. unc. 1. plantag. albh. pimpinell. an dr. ij. herb. Seron. sancte. charcfol. prunell. beder. arbor. bellid. cum rot. an m. s. rad. liquirit. dr. ij. fic. No. & j. coq. ex aq. & Sim. rub. an lib 1. s. Colat. clarif. add. syr. de symphis. de albh. an unc. ij. oxy. mel. s. unc. 1. s. m.

DEcoctum vulnerarium. ℞. Rad. symph. unc. 1. rub. sim. aristol. rot. an. unc. 1. herb. millefol. Seron. pyr. ol. sancte. alchimill. agrimonia an. m. s. fl. bellid. m. s. sumit. Virg. aur.



aur. an pi. ocul. canc. unc s. nuc. mosch. dr. ii coq. in s. q. aq. font. in Col. lib. iij. dissolv. syr. de symph. fernel. unc. iij. M. dos. unc. xv. s. **Heilendes Wundt. Tract 2.** mahl den Tag 3. Grundt vor dem Essen zu nehmen.

Aliud. R. Scob. lign. sasaph. rad. chin: symph. mai. an. unc. s. herb. Veron. agrim. pilosell. consolid. saracen. sanic. alchimill. an. m. s. cinam. liq. an. dr. y sic. N & passul. min. unc. ii. sem. anis. fanic. an. unc. s. M. incis. coq. cum aq. font. lib. vi. & Vin. alb. odorif. lib. ii. ad 3. de quo m. & s. bibantur unc. &.

Species pro decocto Traumatico. R. CC. ust. unc. s. hord. integ. unc. i s. herb. agrim. Veron. alchimill. sanic. an. pi. rad. consolid. mai. liq. an. unc. s. spec. pro decoct. pectoral. unc. i s. anis. fanic. an. scr. s. M. incis. dentur ad chart. s. species. Zum Wundt. Tract mit 2 Maß Wasser/ oder anderthalb Maß Wasser vnd 1. halbe Wein zu kochen.

Decoctum ad Herniam. R. Herb. sanic. salt. herniar. Epat. nob. polyg. plantag. an. m. s. pyrol. p. ni. rad. symph. m. unc. s. bardan. dr. vi. torment. Pentaph. an. dr. ij. sem. perfoliat. dr. iii. coriand. prep. dr. i. coq. in s. q. Vin. & aq. Chalyb. ad lib. ii. colat. dulcoretur succh. albiss. ad gratiam.

Pulvis ad casum. R. Pulv. contra casum August. dr. i. detur ex aq. charesfol. vel R. Ocul. Canc. prep. Rhab. sperm. cet. antim. diaph. sang. hirc. prep. an. dr. s. mum. scr. i. M. F. pulv. cuius dos. dr. i.

Pulvis ad Erysipel. mins. R. Farin. Sol. unc. vi. plumb. ust. bol. rub. an. unc. ii. mastich. oliv. ceruss. an. unc. i. M. F. pulv. subtiliss. qui charta cerulea inspersus parti affecta applicetur. Vel R. Bol. arm. unc. ij. camph. unc. s. m. ad idem valet farin. hord. cum bol. pulv. Glych. camph. & c.

Fomentum in ulceribus contumacibus usuale aqua Catapultorum vulgo dicta. R. Rad. aristol. ros. gent. raph. Zeduar. an. unc. i. coq. in Vin. alb. lib. iij. ad mediet. dissolv. sacch. alb. unc. xv. foveatur hoc ulcus & imponatur fol. Brassica rub. hoc madefactum.

Fomentum Polychrestum ad Erysipelata , inflamma-

tiones



esiones, exulcerationes humidæ, metum Gangræne &c.
 ℞. Lytharg. lib. s. fl. ros. rub. mis. olib. myrrh. mast. an.
 unc. s. decoct. seu aq. Calc. viv. res. lib. iv. acet. lib. i.
 coq. simul, usque dum lytharg. solus. add. in fine camph.
 unc. s. Cal. s. Umschlag warm mit Pauschen oder zu-
 sammen gelegten Luchern 2. 3. mal oder öftters den Tag
 aufzulegen.

Aliud contra Gangrænam & sphacelum aqua fusca di-
 ctum. ℞. Herb. rut. absinth. salv. sabin. fol. querc. an.
 m. s. rad. aristol. rot. dr. iii. ennat. dr. ii. vitriol. Rom.
 unc. i. sal. armon. dr. i. s. Gallar. unc. s. bacc. laur. unc.
 s. olib. mast. an. dr. ii. ceruss. lytharg. alun. crud. an. an.
 iii. Bol. armen. ups. s. cori. virid. nuc. Jugl. dr. vi. camph.
 dr. s. M. de his speciebus. Cachl. i. cum vin. alb. lib. i. coq.
 & cum intinctis splenis vel linteis triplicatis vel quadru-
 plicatis calidè applicetur.

Fomentum pro membro fracto, luxato vel distorto
 ante vel post repositionem. ℞. Herb. beton. Chamom.
 vorism. an. mi. sumit hyper. cum fl. m. i. s. rad. aristol. rot.
 dr. vi. symph. mai. dr. s. sem. 4. calid. m. an. dr. i. s. coq.
 in aq. s. q. Colat. lib. i. s. add. vin. rosus. fl. hyper. lib. s.
 s. Ulteber Wabung.

Fomentum pro membris à Gelu sideratis. ℞. Spirit.
 vin. opt. rectif. lib. i. pulv. sal. armon. unc. i. camph. fer.
 s. M. ad vit. s. überschlag zum Stessen.

Aliud pro rubedine, tumore & dolore pedum. ℞.
 Bol. arm. alb. dr. iii. lytharg. unc. i. mast. myrrh. an.
 unc. s. olib. dr. vi. aq. plantag. sperm. ran. fl. sambuc. an.
 unc. viii. coq. & Col. servetur ad usum.

Fomentum in tumore pedum ædematoso. ℞. Spirit.
 vin. opt. rectif. mensur. i. sal. armon. unc. iii. ac. tincing.
 linteæ, ac sub horam decubitus in lecto pedibus, repidè cir-
 cumvolvuntur optima etiam est aq. calc. viv. sic parat.
 da. ℞. Frustul. calc. viv. ad magnitud. nuc. Jugland.
 immittatur in aq. ferventem donec dissolv. hinc calid. cum
 aq. agitur, & postea residere sinitur, hinc clarius aqua
 per

per inclinationem in aliud vas transfunditur. applicum intinctis linteis vel spongia nova.

Aliud. R. Herb. ab sinth. salu. rut. hyper. orig. roz. rism. la vend. major. an. mi: rad. ebul, irid. cort. med. sambuc. an. dr. ii. fl. cham. samb. spic. stach. ros. melil. an. m. s. bacc. laur. Iuniper. an. unc. s. M. Concis. coq: cum aq. font. s. q. pro foment. pedum bis in die usurpando.

Aliud in Tumore manuum & Pedum. R. Lytharg. unc. vi. bol. arm. unc. i. sulph. viru. unc. i. s. alum. crud. dr. ii. gallar. unc. i. myrrh. el. unc. i. s. M. F. pulv. de qua 2. vel 3. Coch. cum vin. alb. unc. xx. acet. vin. acerrimi unc. x. coq. ac. cum intinctis linteis 2. plicat vel 3. plicat sepius calida applicentur.

Vnguentum diggestivum chyrurgorum. R. Thereb. cum vin. vel aq. ros. ad albed. lot. unc. i. seu cerv. unc. s. ol. ros. dr. ii. cer. alb. olib. mast. an. ser. ii. camph. scr. s. M. vel R. Thereb. unc. ii. vitell. ov. N. i. myrrh. alo. an. dr. s. ol. cer. gut. x. M. in partibus nervosis additur etiam Bals. peruv. Vel R. Thereb. unc. i. vitell. ov. N. i. mell. ros. unc. s. ol. hyper. dr. i.

Liqumentum ad ambusta. R. Ol. oliv. vel lin. part. s. album. ov. conquass. part. ii. M. Illin. cum pluma Gal. lin. vel R. Butyr. rec. 9. liquefact. & lot. in aq. sperm. ran. unc. vi. ol. de vitell. ov. unc. ii. M.

Vnguent. ad ambusta Fabricii. R. Butyr. rec. sine sale aq. ros. lot. unc. i. ol. viol. de vitell. ov. amygd. d. an. unc. i. Croc. scr. i. mucilag. sem. cydon. unc. i. cer. q. s. M.

Vnguentum ad scabiem expertissimum. R. Pingued. suill. antiq. unc. vi. liquefiant ad ignem. Col. add. sulph. viru. subtiliss. pulv. bacc. laur. eodem modo pulv. an. dr. ii. s. Charyoph. aram. dr. i. pulv. lapas. acut. dr. s. M.

Aliud certissimum & Infallibile in scabie humida. R. Pulv. cors. laur. sulph. cit. an. unc. iv. ennul. unc. ii. vitriol. alb. unc. i. s. styrac. liquid. q. s. M. F. ung.

Aliud in scabie sicca & Pruriginosa. *R.* Succ. lapath. acut. plantag. an. unc ii. solan. unc. i s. citri unc. i. ceruss. unc ii. lytharg. unc. s. fl. sulph. dr. i. sol. ros. Viol. an. unc. ii. s. butyr. salit. unc. i. s. thereb. cer. an. dr. *Vi. M. F. ung.* add. ol. dest. lig. Rhod. gut. xxv. alipt. mosch ser ii. *M.*

Aliud in scabie vulgarissimum. *R.* Thereb. Vulg. Vitell. ov. dissol unc. i fl. sulph. dr. *Vi. butyr. rec. unc. xv. M.*

Emplastrum infallibile in clavis pedum. *R.* Galban. gum ammon. acet. solut. an. unc. s. sal. armon ser i. Empl. diachyl. magn. unc. i. s. *M.* vel *R.* pic. naval unc. i. Galb. in acet. dissol. unc. s. sal. armon. ser i. Empl. diachyl. magn. dr. s. *M.* cum panno super clavos ponatur ac tertio vel quarto die mutetur.

Emplast. pro tumore pedum. *R.* Empl. diaph. mins. unc. i. s. oxycroc. unc. s. malax. cum ol. chamom.

Emplastrum diasulphur Ruland. *R.* Bals. sulph unc. iii. Cer. unc s. Coloph. dr. iii. liquot. add. myrrh. opt. pulv. unc iii. s. coq. s. a.

Emplastrum Mammillare in omnibus mammarum tumoribus utilissimum. *R.* Spermat cet. unc. i. cer alb. unc. ii. galban. acet. sol. unc. s. ol. sambuc. q. s.

Balsamus sulph. Rueland. *R.* fl. sulph. unc. i: ol. nuc. Vel rap. unc. *Vi. Vin. generos. unc. ii. macerentur per dies 8. aliquoties agitando coq. leniter ad Vinum consumpt.*

Balsamus sclopetarius. *R.* Ol. lin. thereb. an. lib. i. arug. ar. unc. s. coq. parum s. a.

Cataplasma suppurativum. *R.* Rad. alsh. lil. alb. an. unc. ii. herb. malv. alsh. pariet. an in s. sem lin. fanug. an. unc. s. coq. in s. q: aq. ad mollit. per Cribrum traject. add. farin. sem. lin. fabar. an. dr *Vi. ol. Viol. axung: porc. an. dr. & M. F. Catapl. s. Maturier Dießlauff ein durch zu streichen vnd warm überzulegen.*

Aliud. *R.* Herb. malv. cum tot. mic. pan. alb. an. p. aq. coq. in lact. Caprin. s. q. ad consist. Catapl. add. Vitell. ov. Troc. & ol. ros. Seletiam ol. lil alb. Chamom. amygd.

Injectio in ulcera cava mundificans, siccans, adstringens, putredinem arcens & consolidans. *R.* Herb. cent.

min. scord. ros. rub. an. m. s. fl. balauft. dr. ii. pulv. mastich.
 myroh. olib. aloes an. dr. s. rad. lr. flor. aristol. rot. torment.
 an. dr. i. Concis. coq. cum unc. xx. aq. font. & x. sin. rub.
 in olla bene testā, in Col. dissolv. mell. ros. Col. unc. i. addi
 etiam potest Bals. peruv.

Plura non addo. cum magis spectent ad Chyrurgiam.

C A P U T. XI.


D. E

De Officio Medici in præscri- benda debita Diætā.

§. I.

De Officio Medici in Consideranda Diætā in genere.

I.


Er Diætā hic aliud non intelligi-
 tur, quā debita victūs ratio, vel po-
 tius Methodicus usus sex rerum non na-
 turalium. hæc non minimum est funda-
 mentum sanitatis tum conservandæ tum
 restituendæ. Si enim utilitatem ejus brevibus descrip-
 tam verbis desideres, hæc illa est, quæ morbos pellit,
 corpus agile sanū, purum à fæcore ac fæditate alien-
 um præstat, longævitatē inducit, somnos lucundos
 & placidos conciliat, epulas communes suaves & gra-
 tas efficit, sensibus incolumitatem, memoriæ vigorem,
 ingenio perspicaciam & claritatem confert, passiōes
 sedat, Iracundiam & mæorem pellit, libidinis impe-
 tum frangit, denique corpus & animā maximis bonis
 replet.

replet, ut merito mater trium. S. sanitatis nempe, sapientiae & sanitatis lure merito dici possit.

II.

Dietā alia spectat ad sanos: Alia ad ægrotos. Illa in his præcipue consistit Regulis. 1. ut vitentur, quantum fieri potest acris in qualitatibus vehementiores excessus & anomaliz. 2. Ut in quanto non excedatur, quod cognoscas, si ad satietatem non commedas, si post cibum nullum sentias torporem, gravitatem & lassitudinem corporis, cum antea esses multo agilior, si post cibum etiam aptus sis actionibus mentis, si nulla appareant signa repletionis, qualia sunt v. g. capitis dolor & gravitas, somni longiores vel perturbati, in somnia turbulenta, somnus diurnus, segnities totius corporis, appetitus dejectio, cruditates, ructus, alvi stipticitas vel profluvium, copia flatuum, destillationes frequentes, multa narium emunctio & Exipuitio matutina &c. 3. Ut vitetur varietas ciborum præsertim inter se valde contrariorum in uno pastu quæ est fons morborum uberrimus. 4. Ut cæna prandio sit parcior. 5. Ut casu aliquo extraordinario ut v. g. in convivio lautiori excessum faciens sequentem pastum præscindat, aut unico haustu vini diluti vel tantillo cibo absolvat. 6. Ut vinum diluatur præsertim meracum. 7. Ut debita fiat corporis exercitatio & motus moderatus, qui ad sanitatis conservationem excepta sobrietate maxime principalis est: immo etiam à Galeno ciborum parsimonia anteponitur. 8. Ut graviora vitentur animi Parhemata. 9. Ut somnus sit moderatus, ac alius debite respondeat.


III.

Dietā ægrotorum, de qua potissimum hic sermo, varia est, ejusque diversitas desumitur à vicibus formæ, quantitate, qualitate, utendi occasione seu opportunitate

tate, & exhibendi modo *formam* victus quod attinet, ea desumitur a modo substantiæ, estque pro varia virium conservatione triplex apud medicos. *Crassa* nimirum, *valens* seu *firma*, quæ concedit alimenta firma solida ac multum nutrientia, ac proinde vires auget. *Tenuis*, quæ alimenta habet infirma, parum nutrientia, ac proinde vires nonnihil diminutas conservat. *Mediocris*, quæ inter victum crassum & tennem media est, ideoque vires conservat. Victus crassus convenit corporibus sanis, robustis, ac bene se exercentibus, victus tenuis morbis acutis. *Mediocris* morbis diuturnis & *Chronicis*. Pro victu tenui moderno tempore conceduntur Brodia carnis Gallinæ, vel sola vel cum ovi luteo permixta eaque ut plurimum tertia vel ad summum quarta hora, alterata etiam vel succ. cit. arant. gran. acid. vel herb. Endiv. acetos. portul. lactuc &c. Additur subinde paucum consummat item crem. hord. & si morbus minus acutus, panatell. vel pulment. cum ov. luteo vel Carne Gallin. parat. Ein Dotter oder Hennenbratmüßl. bis autter in die, ov. sorbile, contus. ex canc. vel carnibus volatiliū. In morbis longioribus victus nonnihil plenior convenit ex carnibus pullo- rum Gallin. vitul. aliisque cibis exinde paratis. In morbis longis & periculosis gravius est peccare in victu nimis tenui, quam nimis crasso: e contra in morbis acutis gravius est peccare in nimis crasso, quam nimis tenui.

IV.

Quo ad cibi quantitatem in morbis; plenius eger cibari potest in morbi principia, dum utcumque melius se habet, propè statum verò vel in ipso statu valde tenuiter, quo enim natura magis in morbo expug- nando occupata est, eo tenuior diæta Imperanda, & quo minus eo plenior, hinc etiam in quolibet victu tri- plex observatur dos summa nimirum, media & infima.



prima convenit in morbi principio , media in augmento , ac ultima in statu. Interim hoc non perpetuo in omni morbo observandum , quia in initus inflammationum præsertim partium nobiliorum durante adhuc sanguinis ad partem affectam affluxu utile est, tunc minus cibare , ne augeatur fluxio : immo etiam in aliis morbis , si cruditas aliqua in ventriculo vel intestinis lateat , quod rarissimè non accidit , præstat tum parùm cibi assumere , eamque victus parsimoniâ absumere. *Man muß die Krankheit aushungern* , quod Ital. inprimis frequens , qui morbi curationem ut plurimum ab inedia incipiunt. Interim gravius delinqueret , qui morbi initio nimis parum quam nimis multum ederet , quod tamen contrarium est in statu morbi.

V.

Qualitatem victus quod attinet , præscribitur illa ab affectu consuetudine & temperamento. Intelligitur autem hic per qualitatem victus non illa qualitas , quæ victui inest , ut alimento seu merè cibo , ut esse digestionis facilis vel difficilis , succi boni vel mali , crassi vel tenuis &c. Sed quæ inest ipsi , quatenus simul est medicamentosus calidus nempe , frigidus humidus , siccus , laxans , adstringens , incidens , attenuans &c. Prout igitur est affectus , ita victum postulat contrarium , ut affectus calidus & siccus victum frigidum & humidum &c. Ita tamen , ut consuetudinis & temperamentum simul habeatur ratio.

VI.

Occasio seu opportunitas in victus ratione desumitur ex ægri consuetudine tempore sanitatis , ac virium tolerantia. Illo enim tempore debet æger cibari , quomodo a morbo patitur , eaque potissimum horâ , quâ ante morbum cibari consuevit , nisi morbi vehementia in illa hoc prohibeat , unde a sola consuetudine sumitur idoneum tempus in morbis , qui contingenter seu sine

typis

typis affligunt. In morbis verò, qui accessiones, Paroxysmos vel exacerbationes habent, nunquam cibus exhibendus, cum accessiones adsunt vel proximè futurae sunt, sed cum cessant, vel quieverunt, ne natura à pugna, pepasmo & excretionem materiae avocetur, nisi adhuc magna virium iactura, vel accessio longior, vel corpus ægrotantis valdè calidum & siccum, picrocholium, gracile, acraræ texturæ, vel humora æris ventriculū occupet animi deliquium circa initia Paroxysmorum efficiens, in quibus casibus in Paroxysmi initio vel parum ante illum aliquid cibi offerri potest. In intermittentibus subintrantibus vel ubi saltem duæ vel tres horæ inter finem unius & principium alterius Paroxysmi intercedunt, æger cibandus in fine status primi Paroxysmi.

VII.

QVod ad modum cibos exhibendi, hoc est, an Paulatim, an repetitis vicibus? Id deducitur ex viribus & morbo. Vires vel sunt debiles vel mediocres vel validæ. Debiles paucum, mediocres mediocrem, validæ copiosum postulant cibum. Morbus adiunctos habet humores multos vel paucos vel corruptos. Pauci cibum copiosum, multi paucum, corrupti pro eorum correctionem copiosum exigunt cibum hinc ubi in morbis vires validæ & cum humorum copia conjunctæ, raro & parum alendum. Vbi vires validæ cum humorum paucitate, ibi sæpius & multum cibandum, nisi obstat morbi tempora aut Paroxysmi. Vbi vires sunt debiles cum humorum abundantia aut mediocritate, ibi raro & parum alendum, denique ubi vires sunt debiles cum humorum paucitate aut corruptela, ibi parum ac sæpe cibandum. Interim juxta monitum Hippoc. i. aph. 16. aliquid dandum consuetudini, tempori, Regioni & ætati.

§ I I.

De Officio Medici in Consideranda & praescribenda Dieta refrigerante.

MOrbi calidi ut v. g. febres cujuscunque generis, inflammationes, alique ex matetia calida & biliola oriundi dietam exigunt refrigerantem. aer igitur sit naturam frigidus, vel arte talisparetur per aquatum transalationem, pavimenti cubiculi conspersionem cum aqua & aceto, vel herbis refrigerantibus. Sicuti autem convenit aer frigidus inspiratione attractus corporis aestum mitigans, ita nocet corpore denudato exceptus, cum diaphoresim maxime necessariam impediat, & fuligines ac sudores intro repellat. Pabris sic probe coctus & fermentatus. Ex *carnibus* conceduntur carnes Gallin. capon. pull. gallinac. columb. hœdin. vitul. &c. Magis tamen elixæ. Item carnes auium montan, & sylvest. condiri possunt acet. vel succ. citrarant. granat. à *Piscibus* abstinendum, nisi ægris gratificando laxatiles quosdam excipias, ut tundulos, truttas, thymalos &c. Inter *fructus* concedi possunt fraga, poma acida, pyra cocta, mala cirtia, punica, ceratâ acida exsiccata & cocta, pruna cocta &c. Ex *oleribus* lactuca, endivia, cichorium, spinachium, acetosa &c. *Legumina* omnino vitentur, nisi luscula pisorum, uti & *laeticinis* omnia. Prodest maxime Crem hordei, qui sequenti modo optime paratur. R. Hord. mund. q. pl. coque in aq. commun. lento igne, ita ut fervefacta abiciatur, novaque reasfundatur per horas 6. vel 7. donec in pulmentum abeat, postmodum in mortario lapideo teratur, ac cremor per pannum coletur, & exprimatur, hinc in lusculo Gallinæ dissolvitur, ac iterum coquitur ad consistentiam mediocrem instar re-
nuis

nus contusi, aromatizatur subinde pauco macer. vel
Croc. subinde etiam aliquid sacch. additur præsertim
Candi in affectibus pectoris. Hujus Cremoris summa
utilitas in febribus ac affectibus pectoris catharosis &
Hecticis. Potus sit vinum oligophorum, nisi febris
& alia obstant contraindiciantia, aut alius refrigerans,
uti in formulis annexis patet. Vitanda exercitia & af-
fectus animi, somnus sit consueto longior, a calura
quodidie laxa.

Formula

Potuum Ordinariorum refrigerantium.

Vlepus. R. Aq. font. lib. iii. syr. herb. unc. i. rub.
id. unc. ii. acetos cit. unc. i. spirit. vitriol. q. s. M.

Alius. R. decoct. cc. vel aq. font. lib. ii. syr. de rub.
id. unc. iii. spirit. sulph. campan. q. s. vel nit. antimo-
niat. dr. i. M.

Alius. R. Rad. scorz. rec. unc. i. coq. in s. q. aq. s. in
Col. lib. ii. s. dissolv. syr. de rub. id. viol. ceras. acid. an
unc. i. spirit. vitriol. q. s.

Tinctura rolarum. R. Tinct. ros. cum s. q. spirit.
vitriol. acifcat. lib. iii. vel R. syr. pro tinct. ros. parat.
unc. iii. aq. font. lib. ii. sp. vitriol. q. s.

Iulepus Alexandrinus dictus. R. Aq. font. lib. i. aq.
ros. succ. lim. sacch. alb. an. unc. iv. coque lento igne
dum despumaverint.

Alius. R. Aq. font. lib. iv. sacch. alb. unc. iii. santal.
cit. cinam. an. dr. i. coq. lento igne despum. & Col.

Iulapium ficcum. R. Succ. cit. herber. an. unc. ii. s.
sacch. albiss. lib. i. ponderis civilis. M. super marmore per
agitationem donec induat formam Iulapii sicc. De hoc
3. vel 4. Coch. in mensura aq. font. solvantur pro com-
pescenda siti.

Limonada. R. Aq. font. vel decoct. cc. lib. iv. succ.
lim.

lim. unc. iii. sacch. albiß. q. s. M. possent etiam addi nit.
perlas. dr. ii.

Alia. R. Decoct. CC. Vel aq. font. mens. i. s. in banc.
miciantur. 2. Poma citria in talicolas tenues secta, &
cum sacch. fin s. q. dulcorata subinde dissolvi possunt seq.
syrupi. R. Syr. acid. cit. è succ. Viol. an. unc. ii. spirit.
Vitriol. q. s. Vel R. Iulep. ros. syr. acetos. cit. an. unc. ii.
sp. Vitriol. gut. vi. aq. cinam. dr. iii. M.

Decoctum Cornu cervi vix non omnibus morbis com-
petens. R. Limat. C. C. unc. s. Vel dr. vi. coq. in aq.
font. mens. ii. tam. diu, quamdiu ova duriora coqui solent.
post refriger. Col. interdum cort. cit. adduntur, & sacch. sub
finem coct. interdum syrupi dissoluntur.

Decoctum Hordei usuale in febribus, affectibus pe-
toris & renum calidis. R. Hord. crud. m. ii. rad. liq.
dr. vi. aq. font. lib. vi. coq. ad consumpt. lib. ii. addendo in
fine sem fanic parum contus. dr. ii. post refriger. Col. pro potn.

Aliud. R. Hord. integ. m. i. s. passul. min. unc. s. sem.
anis fanic. an. dr. ii. fl. cord. an. p. i. aq. font. pur. lib. xv.
coq. ad hordei crepat. addendo in fine sacch. cand. unc. i.
Col. & cum album o & Clarif.

Aliud. R. Hord. integ. m. ii. coq. in aq. font. mens.
ii ad dimid. add. sacch. alb. unc. i. s. crem. tart. dr. i. s. succ.
lim. & sp. Vitriol. q. s. ad gratum acorem, Vel adde nit.
prap. dr. i. s. sacch. alb. unc. i. s. cinam. in per. lig. dr. i. s.

Decoctum hordei v. g. in Pleuritide. R. Rad. liq. dr.
ij. sem fanic. dr. i. cinam. acut. scr. ii. sacch. cand. unc. ii.
aq. hord. lib. vi. coq. ad 3. in Col. dissolv. Iulep. Viol. unc.
v. s. spirit. sulph. gut. xv. M.

Aliud. R. Rad. liq. dr. ij. passul. min. hord. mund.
spec. decoct. pector. an m i. dentur tertia ad Chart. s. stuch
zum trinct Wasser auff 2. Wasß biß ein halbe einge-
sotten.

Aliud pro angina. R. Hord. mund. & excor. Cochl.
2. passul. min. sacch. an. Cochl. i. Coq. in mens. i. s. aq. ad
remanens. mensura.

Decoct. hordei compositum in febribus ardentibus.

R. Rad.

R. Rad. acetos. scorz. an. unc. s. hord. mund. m. i. c. c. ra.
 sp. unc. i. pom. cit. N. i. ceras. acid. m. s. cinam. dr. i. s. coq.
 ins. q. aq. font. ad lib. ii. in Col. dissolv. si placeat. syr. rib.
 herb. an. unc. s. s. sp. Vitriol. q. s. pro grata aciditate.

Aliud. *R.* CC. rasp. Vel ust. unc. i. hord. integ. unc. i.
 s. anis. fanic. an. dr. s. M. incis. & contus. dentur ad Chart.
 s. species zum ordinari Tract mit 2. Maß Wasser ab-
 kochen.

Decoct. Tart. Crud. *R.* Tart. alb. unc. i. Vel i. s. coq.
 in aq. font. mens. i. Vel i. s. remota subsidencia fit potus lim-
 pidissimus.

Porus in vatriolis. *R.* Limat. CC. Vel ust. prap. dr.
 Si. lent. excort. dr. iii. sem. fanic. coriand. passul. min. an.
 dr. ii. rad. acetos. unc. s. coq. in aq. font. lib. iii. Vel i. s. ad
 consumptionem dimidia.

Potus refrigerans & præcipitans in febribus. *R.* Sal.
 nit. prap. CC. phil. prap. an. unc. s. sacch. albiss. unc. i. M.
 F. pulv. cujus unc. s. misceatur cum mensur. i. aq. font.

Alius. *R.* Decoct. hord. & liq. lib. ii. spirit. sulph. q.
 s. ad gratam aciditatem CC. ad albed. Calcin. unc. s. Vel
 dr. Si. M. utatur pro potu ordinario & usus tempore agi-
 tando.

Alius in febre ardente cum metu Prunellæ. *R.* Sal.
 nit. prap. unc. i. Crem. tart. dr. ij. sulph. alum. crud. an.
 dr. s. sacch. opt. unc. ii. M. F. pulv. de quo Coch. parvum
 cum aq. font. mens. i. misceatur & agitetur.

Alius. *R.* Nit. depur. CC. phil. prap. Vel Ebor. s. igne
 prap. an. dr. s. Vel ser. ii. M. F. pulv. dentur. 4. dos. qu-
 rum una cum aq. font. Vel decoct. hord. aut decoct. limat.
 CC. mensura una misceatur, & transusetur pro potu or-
 dinario. si diarrhæa Vel fluxus sanguinis simul infestet, addi
 Vel sumi potest CC. ust. prap. terr. sigill. Corall. &c.

S. III.

De Officio Medici in consideranda & præscribenda Dieta calida.

MOrbi frigidi exorti à materia viscida, pituitosa & frigida diætam exigunt calidam, quæ in hoc consistit ut aër sit serenus, tenuis, purus, ac calidus, panis probe fermentatus, ac modico sale & semine carvi conditus. Ex carnibus concedantur carnes Gallinæ, capon, pull, Gallinæ, & columbæ, vitulæ, hædin, auium mont. & sylvest. condiri possunt piper, z. mac. rorismar. thym. satur. salv. major. b. ssop. abstinendum à piscibus, nisi saxatilibus, fructibus Horariis, lacticiis, leguminibus. Aromatum usus sit frequentior. Ex oleribus conveniunt Petroselin. Brass. bet, asparag. raphan. nasturt. &c. Potus sit vinum merum, aut modicè dilutum, aut si hoc contraindicetur, unus ex sequentibus, exercitia & vigilæ sint moderatæ, alvus laxa, animi Pathemata præter gaudium videntur.

Formulae**Potuum ordinariorum Calefacientium.**

Aqua cocta fœniculi. R. Sem. fœnic. dr. i. coq. in 2. mens. aq. font. per quadrantem, iniecit inde cinam. opt. parùm incis. unc. s. vel dr. vi. amove ab igne. Vaque elapsum repone, donec frigescat, tandem 2. vel 3. frustula panis siliginæ impone, ibique permiste.
Aqua cocta cinamoni. R. Aq. commun. lib. iv. sacch. alb. dr. x. coq. donec ebull. add. cinam. acut. contus. dr. iij. mox ab igne remove operculoque rege, ac refrigerare sine & cala.

Aqua

Aqua cocta sasaphras. R. Lign. sasaph. crasse. liq.
mat dr. ii. coq. in duplici vase in lib. xii. aq. v. vel vi.
horis ubi refrigerit. Col

Alia ex sasaphras & cinam. R. Aq. font. lib. ix. ci-
nam. op. unc. s. lign. sasaph. rasp. dr. i. indantur in vas
bene clausum, quod dein immergatur aqua calida, in
qua horis 4. vel 5. ebulliat.

Aqua cocta grata. R. Sem. coriand. prep. dr. ii. liq.
ras. dr. iii. sem. anis. scr. s. cinam acut. dr. ii. de coq. in
aq. mens. ii. s. aliquot Ebullit. Col.

Tragæa Potum præbens gratissimum. R. Lign. sa-
saph. dr. x. chin. opt. dr. vi. liq. dr. i. cinam. opt. unc. s.
sem. anis. dr. ii. cc. prep. dr. ii. s. ocul. Canc. prep. dr. i.
M. F. pulv. hujus unc. i. seu Cochl. coq. in lib. iv. aq.
font. post colaturam in cellam reponere, ut refrigeretur.
sic enim subsidentibus speciebus in fundo vasis aqua super-
natat clara & utilis.

Alia. R. Scob. lign. sasaph. rad. chin. an. unc. s. ci-
nam opt. dr. ii. sem. anis. dr. i. cc. prep. ocul. Canc. prep.
an. dr. i. s. M. F. pulv. gross. de quo Cochl. i. mensura
aque fervida statim post affusionem operculo tegenda in-
iciatur. in affectibus Pectoris unc. i. passul. addi potest.

Alia. R. Scob. Rad. chin. unc. i. lign. lentisc. sars.
cit. an. dr. ii. cinam. opt. dr. i. sem. anis. dr. i. cc. ust. ocul.
Canc an. dr. iii. M. F. pulv. gross. de quo Cochl. i. lib.
iv. aq. font. fervid. iniiciatur, ac urens statim clau-
datur.

Potus gustu & colore suavis in Podagricis confirmatis.
R. Sarsapar unc. vi. lig. sasaph. chin. cc. an. unc. ii.
glych. unc. i. coq. in aq. font. cong. ii. per horam dimidiam.
dein stent cooperta in cineribus calidis per horas 12. Po-
stea ebull. ad 3. part. consumpt. cum ab igne amoveretur,
add. anis. unc. s. post 2. horas Col & depur. per resident.
ac liquor clarus reponatur in lagenis vitreis probe clausis
ad usum.

Bocchetum in Arthritide. R. Rad. sarsapar. unc. ii.
liq.

liq. unc. i. cinam. an. unc. s. M. F. pulv. tenuiss. cujus
Cochl. s. misceatur cum mens. i. aq. font. agitetur in 2. & asis-
ter. Vel quater hinc Col.

Aliud. R. Sarsapar. unc. vi. lig. sasaph. Chin. CG. an.
unc. ij. glych. unc. i. sem. anis. unc. s. M. F. pulv. tenuiss.

Decoct. in eundem usum. R. Chin. incis. unc. s. CC.
ust. unc. i. sacch. comm. unc. ij. coq. in aq. mens. ij. s. ad
consumpt. dimidia add. sub finem Cort. cit. rec. demptâ pul-
pâ alba N. i. Cinam. dr. ij. M.

Porus ordinarius in Paralyti. R. Rad. Chin. unc. i. i.
sem. anis. unc. s. coq. in aq. font. mens. i. s. ad consumpt.
3. part. addendo circa finem cinam. el. dr. ij.

Alius in Colica convulsiva. R. Rad. Chin. dr. ij. sem.
anis. Vel fanic. dr. i. passul. mas. exacinat. unc. ss. coq. per
quadrant. hora cum lib. & aq. font. Col.

Species pro potu ordinatio. R. Rad. Chin. unc. i.
sasaph. unc. s. passul. min. unc. ss. CC. ust. unc. s. sem.
anis. fanic. tart. prap. cinam. an. dr. ii. M. incis. &
contus. dentur ad Chart. s. Etuct. zum Trinct. Desser/
Darvon: Handvoll in ein viertel Wasser zussieden/
bis ein halb Maß eingesotten.

Aliz. R. Sant. rub. unc. s. sasaph. Chin. an. dr. ij. sar-
sapar. dr. ij. passul. min. sem. fanic. an. unc. i. s. cinam.
sacch. Cand. rub. sal. nit. prap. an. unc. s. M. incisa dentur
ad Chart.

Aliz. R. Sem. anis fanic. an. unc. ij. Cort. Cit. dr. ij.
sasaph. dr. vi. sarsapar. rad. schin. an. unc. i. santal. rub.
polypod. an. dr. ss. Cinam. dr. vi. dentur incis. & Contus.
ad part.

Aliz. utiles in hydrop. R. Rad. Chin. unc. i. sasaph.
Sant. rub. Citrin. an. unc. s. rad. Glych sem. anis fanic. an.
dr. ij. Cinam. dr. s. passul. min. m. i. de his speciebus su-
manantur Cochl. ij. & coq. cum aq. font. lib. & ad consumpt.
3. part.

Porus ordinarius in urinæ retentione. R. Herb.
agrim. mi. rad. petrosel. unc. i. liq. dr. vi. lacc. Juniper
unc. s. sem. Carv. Vel anis. fanic. an. dr. s. s. coq. in 3. men-
aj. ad. 3.

Porus

Potus Juniperinus das Kraneweth Tract. 2.
*Bacc. Juniper. lib. i. passul min. lib. s. & unc. ij. (alii ho-
 rum loco accipiunt berberes) tartar Venet. ab unc. s. ad unc.
 i. fruct. cynosbat cum arill. m. fruct. acac. cum nucl. m.
 infund. in aq. commun lib. xvi. in vase apto ligneo, &
 pone fornacem vel loco quodam calido fermentare permitta-
 tur, hinc transvasetur, potus hic in Austria familiaris ac
 hypochondriacis inprimis, ac lumborum, renūque Phlo-
 gosi ac astu correptis pro potu ordinario utilis.*

§. IV.

De Officio Medici in considerata & prescri- benda Dieta siccante.

Dieta exsiccante indigent morbi exorti à superflua
 humiditate, item defluxiones Catarrhales, flu-
 xus alvi Immodici, illique inprimis, qui Dieta
 seu cura sudorifera curari solent. Aër igitur sit naturâ
 ficcus, vel arte talis redditus per accensum ignem &
 suffumigium. *Panis* sit biscoctus, sale & semine carv.
 Benè conditus, *Carnes* assæ potius, quàm elixæ maxi-
 mè sylvestres, ut turtur, turdor. Perdici. atragen. uro-
 gall. lepuscul. capreol. damar. &c. à piscibus & carne
 suilla abstinendum olera conveniunt ea, quæ in diæta
 calida proposita. Ex fructibus prosunt amygdal. Tost.
 nuc. avellan. Castan. cydon. ex frugibus oryza. aromata
 utilia, ni quid obstat. vitentur lacticia & multa suscu-
 la, nisi chalybeata sint. Potus sit admodum Parcus.
 utendum vino diluto aquâ chalybear. Vel alio potu
 infra assignando, somnus sit consueti brevior, motus
 & exercitium prosunt, alvus sit laxa.

Formulæ.

Potuum ordinariorum Exsiccantium.

Bocchetum recens. ℞. Chin. opt. salsapar. an. unc. ij. lig. sasaph. rec. unc. i s. rad. liq. ras. unc. i passul. min. unc. ij. aq. font. lib. xxvj. incis. stens per 24. hor. hinc coq. s. a. ad remanent lib. xviii. Col. detur pro potu ordinario.

Aliud non recens. ℞. Resident. decoct primar add. rad. Chin ponderos. scorz. an unc. i. s. cinam. acut. dr. iij. passul. min. unc. ij. sem. fenic. unc. s. coq. in lib. xxvj. aq. s. ad remanent. lib. xvi. Col.

Potus exsiccans in defluxionibus, & affectibus capitis humidis ℞. Rad. Chin. Charyophyllat Paon. an. unc. iij. ras. lign. sasaph unc. s. Cinam. unc. iij. incis grosso modo dentur ad Chart s. species zum ordinari Tract / daran ein gute Handvoll in 2. Maß Wasser kochen / bisß ein halbe eingesotten.

Alius. ℞. Lign. sasaph. rad. Chin. an. unc. i. Cinam. acut. unc. s. CC. prap. ocul. Canc. prap. an. dr. ii. M. ad Chart.

Tragæa pro potu exsiccante. ℞. Scob. lig lentisc. sant. cit. rad. Chin. an. unc. s. Cinam. opt. dr ii. rasur. ebor. unc. s. galang. min. dr. s. ocul. Canc. prap. dr. iij. M. F. pulv. groß aequo Cochl. in urceo cum aq ferventis mensura misceatur.

Potus ordinarius in vulneribus. R. CC. ust. unc. i. hord. integ. unc. i. s. anis. fenic. an. unc. s. M. Gel ℞. CC ust. unc. s. hord. integ. unc i. s. herb. agrim. Veron. alchemill. fenic. an. p. i. rad. consolid. liqvir. an. unc. s. sem. anis fenic. an. dr i. M. incisa dentur ad Chart. possunt etiam addi passul. liq. &c.

potus in dysenteria. ℞. Rad. torment. CC. ust. an. unc. i. coq. in aq. Chatyb. mens. i. s. ad 3. add. Cinam. dr. ii. M.

Alius

Alius in dysenteria maligna. *Rx.* Ras. CC. unc. i. s. rad. torment. acetos an. unc. iiii. aq. puriss. lib. v. coq. ad remanent. lib. iiii. s. in Col. dissolv. Siga. gran. unc. ii. Syr. acetos. est. de rub id Corral. an. dr. vi. M.

Potus in Diarrhæa. *Rx.* CC. ust. rad. torment. carn. cydon succut. an. unc. s. Cinam. opt. dr. iij. sem. fanic. dr. iij. Coriand. dr. ii M incis. dentur ad Chart.

Alius. *Rx.* CC. ust. prap. terr. sig. Vel Bol. arm. spod. an dr. s. Vel ser. ij. M. F. pulv subtiliss. permiscendus mensur. aq. Chalyb. Vel Emuls. amygd. d. cum aq. Chalyb. fact.

Potus gratus in vomitu vel diarrhæa. *Rx.* Mast. el. dr. ii. coq. cum unc. xxx. aq. font in olla benè recta ad 3. cui post Collisionem ad huc ferventis iniciatur flavedo Cort. Cit. rec. & Cinam. integri digitis Confrast. an. dr. i. stent simul cooperta, donec refrigerant.

Huc pertinent formulæ quoque nonnullæ poruum calefacientium supra propositorum.

§. V.

De Officio Medici in ordinanda præscribenda Dieta humectante.

Dietam humectantem exigunt morbi à siccitate, & ac defectu nutrimenti & humidi radicalis oriundi, ut febres Hæcticæ, atrophix &c. In hac aër sit humidior, panis mediæ laxitatis ex Carnibus eligendæ enchymæ, ut Gallin. pull. Gallin. capon. columb. perdic. phasan. attag. aliarum avium sylv. earumque confusa & consummata. Item caro hœdina, vitulina, vervecina Innior. agnima, porcell. lactant. imprimis etiam conducunt ex Cochleis, testudinibus & cancris parata. Elixæ magis profunt quàm massa. Gelatinæ quàm maximè utiles ut v. g. Gelatina Capon. Hunc indum moparata. *Rx.* Capon. ping. deplum. exenterat.

Et mundificat. in eid. cum ossibus minutis indatur
lagen stannea affundendo aliq. aq. font. addendo, parum
mac. & Croc. hinc. lagena clavo Cochleato artissimè
clausa, utroque Philosophico munita in ahena Cuprea fer-
venti repleta per horas. Et ad ignem coq. hinc lagenâ apertâ
brodium per inclinationem in Vase terreum vitreatum effun-
datur, inque locum frigidum vel cellam reponatur Et ad
usum servetur vel sequens Gelatina analeptica R. Carn.
Vitul. lib. i. pedum Vituli N. u. Ictiocoli. dr. ii. hepat. Vi-
tul. lib. s. Cinam. opt. dr. s. i. mac. dr. s. hac omnia Crasso
modo incisa indantur lagen. stann. affundend. aq. font. lib.
ii. ponatur lagena bene obturata in ahenum aquâ plenum,
coq. per hor. s. hinc. f. fort. express. servetur in cella in loco
frigido ad usum vel R. Carn. Vitul. Vel Vervec. mac. lib. i.
Gallin. mundat. dimid. Epat. Vitul. Vel agn. lib. s. Icti-
coll. dr. ii. mac. dr. s. incis. Et lot. inde lagen. stannea addo
pom. cit. in 4. frusta divis. i. N. s. Vin. alb. Ver. lib. s. aq. font.
lib. ii. lagena bene obturata indatur lebeti aquâ pleno coq.
s. Vel 6 hor. Colat. exprim. fortiter. de hac Gelat. quoties
Iusculum contemditur, immisceri poterunt Cochli. iii.
vel iv. sequens sanguinem simul mundificat R. Ras. CC.
unc. ii. s. ras. chor. unc. v. s. aq. font. lib. iii. stent in infus.
per noct. in loco calid. manè add. rad. scorz. rec. Vel siccato.
N. Vi fol. borrag. mi. fl. 4. Cord. an. pi. passul. min. unc. ii.
Coq. ad gelatin. consst. addendo sub finem Coct. Cons. ros.
unc. ii. Et tandem Consect. alk. Compl. dr. i. s. M.

Ex oleribus conveniunt malv. bismalv. Borrag. viol.
nymph. ex fructibus nuc. pineæ, pistach. amygdal. lu-
jub. ficus, passul. poma dulc. prun. dulc. &c. Lactis
tus, ni quid obstat, optimus. item ova sorbilia, Cre-
mor hordei & hordeata v. g. hordeatum. Imperatoris
in Pthyl. R. Hord. Integ. mi iii. coq. in aq. font.
mens. i. s. per 10. horas ad perfectam molliem
semper aliquid. aq. Calid. affundendo, ne aqua evaporet,
Et Consumatur. exprime deinceps Crem. per pannum Et in
Vase mundo ad usum serva. hinc. R. Herb. pilosell. tussil-
lag. enas. an. m. s. rad. scorz. unc. s. Coq. in brodio Gal-
lin.

*lin. infuls. expreme per pannum. in hoc brodio dissolv. Crem.
hord. Cochl. i. Vel alterum. Vel sequens Italici & Gallici
consuetum ad defluxiones tenues sistendas. R. Hord.
mund. sel. q. s. maceretur per 6. horas, coque perfecte, ut
dissolvi possit post R. Amygd. d. excort. unc. iij. sem. cu-
cumb. unc. i. s. melon. unc. i. papav. alb. lactuc. an. unc. s.
contus. omnibus cum aq. hord. eliciatur lac, quod cum lib.
ii. pulp. hord. permixt. coq. parum addendo parum. sacch. vel
seq. refocillans. R. Hord. mund. lib. i. facta ablutione
coq. in s. q. aq. ad formam pult. dein. R. Crem. unc. vi.
sem. melon. ex Cort. amygd. an. unc. i. nucl. pineor. unc. s.
contund. simul f. hordeat. sumat ad vespertas in prin-
cipio mensa solvendo in lure Gall. Cochl. iij. ex Consum-
mat. Capon. & aromati. cum modico Cinam. & elmac.*

Formulæ.

Potuum Humeſtantium.

Decoct. Hordei varia, vid. supra de formulis Potuum refrigerantium.

Aliud in Phrysi & affectibus pectoris. R. Hord. mund. m. iij. passul. min. unc. i. s. Iuiub. N. xx. sem. anis. fanic. an. dr. vi. Cinam. unc. s. incis. & Contus. dentur ad Chart. de his sume ad mensuras aquæ tres totidem manipulos, coq. ad consumpt. 3. part.

Decoct. humectans Pectorale. R. Chin. sel. dr. iij. liquir. dr. ii. passul. min. mund. majorum exacinat. an. unc. s. fic. ping. dactyl. an. N. & Iuiub. sebest. an. N. xii. sem. 4. fr. mat. anis. fan. an. dr. i. Concis. & Conquass. bull. in 3. mens. aq. font. per horam dimid. Cpl.

Aliud. R. Fic. ping. N. vii. Iuiub. N. x. dactyl. s. nucl. N. viii. sem. anis. fanic. an. dr. vi. Vel unc. i. s. species sum ordinari Transf.

Emulsio pro potu. R. Amygd. d. excort. unc. ii. sem. melon. excort. unc. i. subinde etiam pan. alb. tost. unc. i. aq. font. Vel decoct. hord. lib. ij. Vel ij. M. F. Emuls. edulco

randa facieb. s. q. si magis refrigerare animus, add. nitr. perlas. scr. ij. Sel dr. i.

Alia anthectica. R. Chin. sel. unc. i. rasur. ebor. dr. ij. repleatur pullus bene saginatus, coq. in lib. vi. ad debilitatam costuram hinc Col: de Col. R. Lib. ij sem. melon. rec. amygd. ex cort. an. unc. i. nucl. pin. unc. s. M. F. Emuls.

Alia Epiceraistica. R. Sem papau. alb. dr. iij. melon. unc. i s. Contund. in mort. marmor. addendo amygd. ex cort. S per 3 horas in aq. lactuc. infus. N. xxx. Contund. & cum larepull. vel seq decoct. lib. i. s. Sel lib. ij. F. Emuls. R. Rad. liq. dr. iij. sebest. N. i & lujub. N. vii passul. unce s. fl. Viol. Borrage an. ps sem. portul. lactuc. an. dr. i. Coq. in lib. iij. aq. ad Consumpt. 3. part.

Decoct. Pulli vel Carnis Gallinæ. R. Das Heno menbrat. Wasser utile pro restauratione virium, & doloribus Colicis, ubi maxima ventriculi & Intestino- rum sensibilitas. R. Pullum dimidium vel Carnem Gal- linæ. ex alis & pectore dempta omni pinguedine. Coq. cum 4. mens. aq. in duplici vase per 4. hor. Col. subinde pro gra- tia addi potest aliquid de Cort. cit. vel Cinam.

Dixta composita calida & sicca, frigida & hu- mida &c. delumi potest ex simplicibus.

F I N I S.



Index.

C A P I T U M.

- Caput. I. De Officio Medici in genere. pag. 1.
2. De Officio Medici in specie & primo quidem in affectibus requirentibus venæ sectionem. pag. 48.
3. De Officio Medici in affectibus requirentibus arteriotomiam, cucurbitulas, scarificationem, hirudines, vesicatoria & fonticulos. pag. 73.
4. De Officio Medici in affectibus indicantibus Balnea & acidulas. pag. 91.
5. De Officio Medici in affectibus indicantibus purgationem. pag. 115.
6. De Officio Medici in affectibus indicantibus sudorifera, diuretica, salivantia, Errhina, sternutatoria, apophlegmatizantia & expectorantia. 157.
7. De Officio Medici in affectibus exientibus curam lactis, chalybis, usum theæ, capheæ Chocolatæ & laudani opiat. p. 191.
8. De Officio Medici in affectibus exigentibus alexipharmaca, antifebrifuga, antihelminthica carminativa & lithontripica pag. 224.
9. De Officio Medici in considerandis & præscribendis approprietatis & confortantibus. pag. 256.
10. De

10. De Officio Medici in affectibus exigantibus ad stringentia, stegnotica, hypotica, anodyna & vulneraria. pag. 318.
11. De Officio Medici in præscribenda debita Dieta. pag. 341.

Omnia ad Majorem DEI
Gloriam.



